ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE

1,2 CICLOESANDIOLO Urine Fine Turno

COD.	METODO	TAT
2225	gascromatografico	16-17 gg

Urine F.T.

ALTA SPECIALISTICA

ACCETTARE CONTESTUALMENTE AL CODICE 791 CREATININA URINE FINE TURNO

VALORI DI RIFERIMENTO

1,2-Cicloesandiolo Urine\Creatinina F.T.	mg/g creatinina	Soggetti esposti a cicloesano: < 50 mg/ g creatinina (ACGIH 2024) Soggetti esposti a cicloesanolo: non proposti (ACGIH 2024) Soggetti esposti a cicloesanone: < 80 mg/L (ACGIH 2024)
Creatininuria	g/L	0,3 - 3,0
Ut-1,2-Cicloesandiolo Urinario	mg/L	

1,2 CICLOESANDIOLO Urine Inizio Turno

COD.	METODO	TAT
2224	gascromatografico	16-17 gg

Urine I.T.

ALTA SPECIALISTICA

ACCETTARE CONTESTUALMENTE AL CODICE 790 CREATININA URINE INIZIO TURNO

VALORI DI RIFERIMENTO

1,2-Cicloesandiolo Urine\Creatinina I.T.	mg/g creatinina	Soggetti esposti a cicloesano: < 50 mg/ g creatinina (ACGIH 2024) Soggetti esposti a cicloesanolo: non proposti (ACGIH 2024) Soggetti esposti a cicloesanone: < 80 mg/L (ACGIH 2024)
Creatinina Urinaria	g/L	0,3 - 3,0
1,2-Cicloesandiolo Urinario	mg/L	

17 beta Estradiolo

COD.	METODO	TAT
619	CLIA	1-2 gg

Siero

ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

	pg/mL	Maschi: < 39,80	Femmine: Fase follicolare : 19,50 - 144,20 Fase ovulatoria : 63,90 - 356,70 Fase luteinica : 55,80 - 214,20 Post-menopausa : < 32,20

17 Chetosteroidi urinari

COD.	METODO	TAT
627	cromatografico colorimetrico	9-10 gg

Urine 24h

ALTA SPECIALISTICA

La raccolta del campione di urine delle 24 h prevede l' acidificazione delle urine stesse. L' acidificazione viene effettuata versando nel recipiente, prima di iniziare la raccolta, circa 5 ml di HCl 5 M per ogni litro di urina (4 cucchiai di acido muriatico del commercio). Prelevare un'aliquota di circa 10 ml di urina delle 24 h acidificata con l'indicazione della diuresi totale ed inviare in apposito contenitore di trasporto.

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/24h	Maschi: 10 - 25	Femmine: 6 - 14

17 OH Progesterone

COD.	METODO	TAT
6200	CLIA	5 gg

Siero

SPECIALISTICA

Risposta dopo 48 ore

VALORI DI RIFERIMENTO

	ng/mL	Donne non in gravidanza: Menopausa: < 0,910 Fase Ovulatoria: 0,130 - 1,460 Fase Luteinica: 0,270 - 2,410 Fase Follicolare: < 1,050 Gravidanza: 2.24 9.30 Uomini: 0.29-2.06

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
1-IDROSSIPIRENE Urine Fine Turno Urine F.T.	**7380**	**cromatografia liquida**	**10-11 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

1-IDROSSIPIRENE Urinario/Creatinina F.T.	µg/g crea	Esposti: < 2,7 µg/g creatininuria (Lavoro e Medicina 2011/2012 L'esposizione a idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e rischio di patologia neoplastica. A.Bonsignore, M.Masuri, T. Valente - Pagina 25) Non esposti Fumatori: < 0,7µg/g creatininuria (SIVR 2011) Non esposti non fumatori: <0,3 µg/g creatininuria (SIVR 2011)
Creatininuria	g/L	0,3 - 3,0
1 IDROSSIPIRENE Urinario	µg/L	

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
1-IDROSSIPIRENE Urine Inizio Turno Urine I.T.	**738**	**cromatografia liquida**	**10-11 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

1-IDROSSIPIRENE Urinario/Creatinina I.T.	µg/g crea	Esposti: < 2,7 µg/g creatininuria (Lavoro e Medicina 2011/2012 L'esposizione a idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e rischio di patologia neoplastica. A.Bonsignore, M.Masuri, T. Valente - Pagina 25) Non esposti Fumatori: < 0,7µg/g creatininuria (SIVR 2011) Non esposti non fumatori: <0,3 µg/g creatininuria (SIVR 2011)
Creatininuria	g/L	0,3 - 3,0
1-IDROSSIPIRENE Urinario	µg/L	

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
2,5 ESANDIONE LIBERO Urine Fine Turno Urine F.T.	**7174**	**HPLC**	**6 gg**	**TOSSICOLOGIA**

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/L	Soggetti esposti: < 0.5 (ACGIH 2021)

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
2,5 ESANDIONE LIBERO Urine Inizio Turno Urine I.T.	**7173**	**HPLC**	**6 gg**	**TOSSICOLOGIA**

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/L	Soggetti esposti: < 0.5 (ACGIH 2021)

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A. Delta Aminolevulinico Urinario (ALA) Urine F.T. Urine F.T.	**70219**	**CROMATOGRAFIA COLORIMETRICA**	**11-12 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

ACCETTARE CONTESTUALMENTE AL CODICE 791 CREATININA URINE FINE TURNO

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/g crea	< 7

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A. Delta Aminolevulinico Urinario (ALA) Urine I.T. Urine I.T.	**7029**	**CROMATOGRAFIA COLORIMETRICA**	**11-12 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

ACCETTARE CONTESTUALMENTE AL CODICE 790 CREATININA URINE INIZIO TURNO

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/g crea	< 7

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Adenovirus IgA Siero	**11551**	**ELISA**	**7-8 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

Index	< 0,9 Negativo 0,9 - 1,1 Dubbio > 1,1 Positivo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Adenovirus IgG Siero	**1154**	**ELISA**	**7-8 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

Index	< 0,9 Negativo 0,9 - 1,1 Dubbio > 1,1 Positivo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Bartonella Henselae IgG Siero	**1610**	**immunofluorescenza indiretta**	**9-10 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

	Negativo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Bartonella Henselae IgM Siero	**1611**	**immunofluorescenza indiretta**	**9-10 gg**	**ALTA SPECIALISTICA** **SERVICE**

VALORI DI RIFERIMENTO

	Negativo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Beta 2 Glicoproteina IgG Siero	**1520**	**immunoenzimatico**	**7 gg**	**Autoimmunità**

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL	<12 Negativo 12-18 Dubbio >18 Positivo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Beta 2 Glicoproteina IgM Siero	**1521**	**immunoenzimatico**	**7 gg**	**Autoimmunità**

VALORI DI RIFERIMENTO

UA/mL	<12 Negativo 12-18 Dubbio >18 Positivo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti BORRELIA BURGDORFERI IgG Siero	**1460**	**CHEMILUMINESCENZA**	**8-9 gg**	**INFETTIVOLOGIA**

VALORI DI RIFERIMENTO

UA/mL	<10 Negativo 10-15 Dubbio ≥15 Positivo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti BORRELIA BURGDORFERI IgM Siero	**1461**	**CLIA**	**8-9 gg**	**INFETTIVOLOGIA**

VALORI DI RIFERIMENTO

Indice	<0,9 Negativo 0,9-1,1 Dubbio >1,1 Positivo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Brucella IgG (Reazione di Wright) Siero	**151**	**ELISA**	**9-10 gg**	**ALTA SPECIALISTICA** **SERVICE**

Se negativo risposta dopo 24 h.
Se positivo risposta dopo 48 h.

VALORI DI RIFERIMENTO

Index	<0,8 Negativo 0,8 - 1,2 Dubbio >1,2 Positivo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Brucella IgM (Reazione di Wright) Siero	**151M**	**ELISA**	**9-10 gg**	**ALTA SPECIALISTICA** **SERVICE**

VALORI DI RIFERIMENTO

Index	<0,8 Negativo 0,8 - 1,2 Dubbio >1,2 Positivo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Cellule Parietali APCA Siero	**1355**	**fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP**	**4-5 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

Substrato: rene, fegato, stomaco di ratto

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL	<7,0 Negativo 7,0 - 10,0 Dubbio > 10,0 POSITIVO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Chlamydia Pneumoniae IgG Siero	**13200**	**immunoenzimatico**	**8-9 gg**	**SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL	Negativo <20 Dubbio 20-25 Positivo >25

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Chlamydia Pneumoniae IgM Siero	**13201**	**immunoenzimatico**	**8-9 gg**	**SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL	Negativo <20 Dubbio 20-25 Positivo >25

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Citomegalovirus Avidita' IgG + IgG per CMV Siero	**1535**	**CLIA**	**1-2 gg**	**INFETTIVOLOGIA**

VALORI DI RIFERIMENTO

index	< 0.150 Avidità bassa 0.150-0.250 Avidità moderata >0.250 Avidità alta

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Citomegalovirus IgG Abs Quantitativo Siero	1531Q	CLIA	1-2 gg	INFETTIVOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

A.Anti Citomegalovirus IgG Abs	U/ml	Negativi: < 12 Dubbi: 12.0-14.0 Positivi: >= 14

Interpretazione

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Citomegalovirus IgM Abs Quantitativo Siero	1532Q	CLIA	1-2 gg	INFETTIVOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

A.Anti Citomegalovirus IgM Abs	U/ml	Negativi: < 18 Dubbi: 18-22 Positivi: >= 22

Interpretazione

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Clamidia Pneumoniae IgA Siero	13204	ELISA	7-8 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

	U/mL	Negativo <20 Dubbio 20-25 Positivo >25

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Clamidia Trachomatis IgA Siero	1323	CLIA	1-2 gg	INFETTIVOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

	index	< 5.0 Negativi 5.0-6.0 Dubbi > = 6.0 Positivi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Clamidia Trachomatis IgG Siero	1320	CHEMILUMINESCENZA	8 gg	INFETTIVOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

	UA/mL	< 9 Negativo 9-11 Dubbio > 11 Positivo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Clamidia Trachomatis IgM Siero	1319	immunoenzimatico	11-12 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

	U/mL	<20 Negativo 20-25 Dubbio >25 Positivo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Coxsackie Virus A Siero	**12659**	**FC**	**6-7 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

Titolo	< 1:8 Negativo 1:8 - 1:16 Dubbio 1:32 Debole Positivo > 1:32 Positivo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Coxsackie Virus B Siero	**892**	**FC**	**6-7 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

Titolo	< 1:8 Negativo 1:8 - 1:16 Dubbio 1:32 Debole Positivo > 1:32 Positivo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Cute Siero	**134**	**immunofluorescenza indiretta**	**8-9 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

Substrato: esofago di primate regione prossimale

VALORI DI RIFERIMENTO

Anti-Sostanza Intercellulare	< 1:20
Anti-Lamina Basale	< 1:20

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Difterite IgG Siero	**13209**	**ELISA**	**20-21 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

mIU/mL	< 10 si raccomanda vaccinazione 10-100 si raccomanda vaccinazione di richiamo > 100 protezione

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Endomisio IgA (EMA) Siero	**154**	**IMMUNOFLUORESCENZA INDIRETTA**	**5-6 gg**	**GENETICA**

Substrato: esofago di primate regione distale

VALORI DI RIFERIMENTO

Titolo	Negativi < 1:10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Endomisio IgG Siero	**1541**	**IMMUNOFLUORESCENZA INDIRETTA**	**4 gg**	**GENETICA**

Substrato: esofago di primate regione distale

VALORI DI RIFERIMENTO

Titolo	Negativi < 1:10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Epstein Barr (EBNA) IgG Siero	**10701Q**	**CLIA**	**1 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL	< 5,0 Negativo 5,0 - 20,0 Dubbio > 20,0 Positivo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE

A.Anti Epstein Barr VCA IgG | **1071Q** | **CLIA** | **1 gg**

Siero

ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL
<= 20,0 Negativo
> 20,0 Positivo

A.Anti Epstein Barr VCA IgM | **10710Q** | **CLIA** | **1 gg**

Siero

ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL
< 20,0 Neagtivo
20,0 - 40,0 Dubbio
> 40,0 Positivo

A.Anti Epstein Barr VIRUS EA Abs Early IgG | **1072** | **CLIA** | **1-2 gg**

Siero

INFETTIVOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL
< 10,0 Negativo
10,0 - 40,0 Positivo debole
> 40,0 Positivo

A.Anti Fattore Intrinseco | **1242** | **CHEMILUMINESCENZA** | **14 gg**

Siero

Autoimmunità

In caso di consegna tardiva al laboratorio il campione può essere conservato in un luogo fresco (2 - 8 °C) per un massimo di 14 giorni.
Per conservazioni maggiori ai 14 giorni congelare il campione a -20°C

VALORI DI RIFERIMENTO

Indice
<20 Negativo

A.Anti GAD 65 | **158** | **CLIA** | **8 gg**

Siero

SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

IU/ml
< 10,0

A.Anti HAV IgM | **608** | **CMIA** | **1-2 gg**

Siero

ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

HAV IgM
S/CO
< 0,80 Non reattivo
0,80 - 1,20 Reattivo in zona grigia
> 1,20 Reattivo

HAV Interpretazione

A.Anti HAV Totali | **606** | **CMIA** | **3-4 gg**

Siero

ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

HAV Totali
mUi/mL
< 20,00 Non reattivo
≥ 20,00 Reattivo

HAV Totali Interpretativo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti HBcAb (Markers Epatite B) Siero	604	elettrochemiluminescenza	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

ANTICORPI ANTI-CORE VIRUS B (HBcAb Totali)	Index	< 1,0 Non reattivo ≥ 1,0 Reattivo

HbcAb Interpretazione

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti HBeAb (Markers Epatite B) Siero	603	CMIA	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

		< 1,00 Non Reattivo >= 1,00 Reattivo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti HBsAb Quantitativo Siero	6011	CMIA	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

	mUI/mL	< 10,0 Negativo ≥ 10,0 Positivo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti HCV (Markers Epatite C) Siero	605	CMIA	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

HCV INDICE		< 0,80 Non reattivo da 0,80 a 0,99 Dubbio >= 1,00 Reattivo

HCV Interpretazione

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti HDV Siero	6081	immunometrico	14-15 gg	ALTA SPECIALISTICA SERVICE

Risposta dopo 24 h

VALORI DI RIFERIMENTO

		Non Reattivo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Helicobacter Pylori IgA Siero	1138	immunoenzimatico	7 gg	SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

	U/ml	Negativo: < 20 Dubbio: 20-25 Positivo: ≥ 25

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Helicobacter Pylori IgG Siero	148	ELISA	3-4 gg	SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

	AU/mL	Negativo < 8,0 Dubbio 8,0 - 12,0 Positivo > 12,0

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Herpes 1-2 IgG Siero	1563Q	CLIA	7 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

	Index	< 0,9 Non Reattivo 0,9 - 1,1 Dubbio > 1,1 Reattivo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Herpes 1-2 IgM Siero	1563MQ	CHEMILUMINESCENZA	7 gg	INFETTIVOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

	Indice	≤0,9 Negativo 1,0-1,1 Dubbi0 >1,1 Positivo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti HIV 1-2 Siero	1670	CMIA	2-3 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

ANTICORPI ANTI HIV	Index	< 1,00
Interpretazione		Non Reattivo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti HTLV I/II Siero congelato	2675	CHEMILUMINESCENZA	13 gg	INFETTIVOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti IA2 Siero	1377	chemiluminescenza	8-9 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

	U/ml	< 10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Insula (ICA) Siero	125	immunofluorescenza indiretta	9 gg	SPECIALISTICA

Substrato: pancreas di primate

VALORI DI RIFERIMENTO

< 1:10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Insulina Siero	6522	CLIA	13 gg	SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

	UI/mL	< 20

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Leptospira Ig Totali Siero	**1219**	**FC**	**8-9 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

	Titolo	< 1:16 Negativo 1:16 - 1:64 Dubbio > 1:64 Positivo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Listeria Siero	**122**	**FC**	**9-10 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

ANTICORPI ANTI LISTERIA		Qualitativo
ANTICORPI ANTI LISTERIA	Titolo	

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti MAG (Glicoproteina mielina associata) IgM Siero congelato	**1584**	**ELISA**	**20-21 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

2-8° C entro 24h dal prelievo per tempistiche di conservazione superiori alle 24h congelare il campione a -20°C ed inviare il campione congelato.

VALORI DI RIFERIMENTO

	BTU	< 1000 Negativo 1000 - < 4000 Dubbio 4000 - < 10000 Debole positivo >= 10000 Positivo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Membrana Basale del Glomerulo Siero	**138**	**CHEMILUMINESCENZA**	**9-10 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

	CU	< 20

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Micoplasma Pneumoniae IgG Siero	**1600**	**CHEMILUMINESCENZA**	**6 gg**	**INFETTIVOLOGIA**

VALORI DI RIFERIMENTO

	AU/mL	Negativi: < 10 Positivi: >= 10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Micoplasma Pneumoniae IgM Siero	**1601**	**CLIA**	**6 gg**	**INFETTIVOLOGIA**

VALORI DI RIFERIMENTO

	index	Negativi: < 10 Positivi: >= 10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Microsoma LKM Siero	**1350**	**fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP**	**4-5 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

Substrato: rene, fegato, stomaco di ratto

VALORI DI RIFERIMENTO

	U/mL	<7,0 Negativo 7,0 - 10,0 Dubbio > 10,0 POSITIVO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Mitocondri (AMA) Siero	**135**	**fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP**	**3-4 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

Substrato: rene, fegato, stomaco di ratto

VALORI DI RIFERIMENTO

IU/mL	<4,0 Negativo 4,0 - 6,0 Dubbio > 6,0 POSITIVO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Morbillo IgG Siero	**159**	**CLIA**	**7 gg**	**INFETTIVOLOGIA**

VALORI DI RIFERIMENTO

AU/mL	< 13.5 Negativi 13,5 e 16,5 Dubbi >16.5 Positivi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Morbillo IgM Siero	**1590**	**CLIA**	**7 gg**	**INFETTIVOLOGIA**

VALORI DI RIFERIMENTO

index	< 0.9 Negativi 0.9-1.10 Dubbi >1.10 Positivi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Muscolo Liscio (ASMA) Siero	**136**	**IMMUNOFLUORESCENZA INDIRETTA**	**4-5 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

Substrato: rene, fegato, stomaco di ratto

VALORI DI RIFERIMENTO

Titolo	Assenti <1:40 Bassi 1:40 - 1:80 Alti: 1:160 - 1:320 Molto alti >1:320

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Muscolo Striato Siero	**1360**	**immunofluorescenza indiretta**	**5-6 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

Substrato: cuore di primate

VALORI DI RIFERIMENTO

Titolo	< 1:20

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Parotite IgG Siero	**162**	**CHEMILUMINESCENZA**	**7 gg**	**INFETTIVOLOGIA**

VALORI DI RIFERIMENTO

AU/mL	< 9.0 Negativi 9.00 e 11.0 Dubbi >11.00 Positivi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Parotite IgM Siero	**1620**	**CHEMILUMINESCENZA**	**7 gg**	**INFETTIVOLOGIA**

VALORI DI RIFERIMENTO

index	< 0.9 Negativi 0.9-1.10 Dubbi >1.10 Positivi

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Parvovirus B19 IgG Siero	1571	CHEMILUMINESCENZA	8-9 gg	INFETTIVOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

	IU/mL	Negativi: < 2.0 Dubbi: 2.0-2.49 Positivi: >= 2.50

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Parvovirus B19 IgM Siero	1572	CHEMILUMINESCENZA	8-9 gg	INFETTIVOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

	index	< 0.9 Negativi 0.9 -1.1 Dubbi > 1,1 Positivi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Pertosse IgA Siero	1631	CLIA	10-11 gg	INFETTIVOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

	IU/mL	Negativi: < 12 Positivi: >= 12

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Pertosse IgG Siero	163	ELISA	10 gg	INFETTIVOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

	IU/mL	Negativi: < 40 Dubbio: 40-100 Positivi: >= 100

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Piastrine Siero congelato	150	ELISA	12-13 gg	ALTA SPECIALISTICA SERVICE

VALORI DI RIFERIMENTO

		Assenti

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Poliovirus IgG Siero	164P	ELISA	7-8 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Recettori Acetilcolina Siero	643	RIA	13-14 gg	ALTA SPECIALISTICA

Centrifugare rapidamente (entro 30 min), separare e congelare

VALORI DI RIFERIMENTO

	nmol/l	< 0,50

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE

A.Anti Recettori T.S.H. | **6516** | **CLIA** | **1-2 gg**

Siero

SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

IU/L < 1,50

A.Anti Reticolina | **128** | **immunofluorescenza indiretta** | **3-4 gg**

Siero

ALTA SPECIALISTICA

Substrato: rene, fegato, stomaco di ratto

VALORI DI RIFERIMENTO

Titolo Negativi 1:40

A.Anti Rosolia IgG (Rubeo) | **11601** | **CLIA** | **1-2 gg**

Siero

INFETTIVOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

A.Anti Rosolia IgG — UI/ml — Negativi: < 7; Dubbi: 7-10; Positivi: >= 10

Interpretazione

A.Anti Rosolia IgM (Rubeo) | **11602** | **CLIA** | **1-2 gg**

Siero

INFETTIVOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

A.Anti Rosolia IgM — AU/mL — Negativi: < 20; Dubbi: 20-25; Positivi: >= 25

Interpretazione

A.Anti S. Cerevisiae (ASCA) IgA | **8923** | **ELISA** | **6-7 gg**

Siero

ALTA SPECIALISTICA

SERVICE

Non è possibile eseguire il test su campioni emolizzati, lipemici, itterici.

Per conservazione superiore ai 5 gg dal prelievo congelare il campione a -20°

VALORI DI RIFERIMENTO

UA — < 20,0 NEGATIVO; 20,0 - 25,0 DUBBIO; >25,0 POSITIVO

A.Anti S. Cerevisiae (ASCA) IgG | **8922** | **ELISA** | **6-7 gg**

Siero

ALTA SPECIALISTICA

SERVICE

Non è possibile eseguire il test su campioni emolizzati, lipemici, itterici.

Per conservazione superiore ai 5 gg dal prelievo congelare il campione a -20°

VALORI DI RIFERIMENTO

UA — < 20,0 NEGATIVO; 20,0 - 25,0 DUBBIO; >25,0 POSITIVO

A.Anti Schistosoma | **116** | **immunoenzimatico** | **23-24 gg**

Siero

ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

UA — Negativo < 8,5; Dubbio 8,5 - 11,5; Positivo > 11,5

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Surrene Siero	143	immunofluorescenza indiretta	4-5 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Tetano IgG Siero	144	Immunodosaggio a Fluorescenza	4 gg	INFETTIVOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

IU/mL

< 0,1 Negativo
Immunizzazione di base consigliata.

0,1-1,0 Da controllare dopo 1-2 anni dal prelievo

1,0-5,0 Positivo
Da controllare dopo 2-4 anni dal prelievo

> 5,0 Positivo
Da controllare dopo 4-8 anni dal prelievo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Tireoglobulina Siero	1373	CHEMILUMINESCENZA	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

UI/mL

< 4,5

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Tireoperossidasi Siero	1372	CHEMILUMINESCENZA	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

IU/mL

< 13,9

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Toxoplasma gondii Avidita' IgG Siero	11805	CLIA	4 gg	INFETTIVOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

%

Avidità bassa <70
Avidità dubbia 70 - 80
Avidità alta >80

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Toxoplasma Gondii IgA Siero	427	ELISA	8-9 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Index

< 0.8 Negativo
0.8 - 1.2 Dubbio
> 1.2 Positivo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Toxoplasma gondii IgG Abs Quantitativo Siero	**11801Q**	**CLIA**	**1-2 gg**	**INFETTIVOLOGIA**

VALORI DI RIFERIMENTO

A.Anti Toxoplasma gondii IgG Abs	IU/mL	Negativi: < 7.2 Dubbi: 7.2-8.8 Positivi: >= 8.8

Interpretazione

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Toxoplasma gondii IgM Abs Quantitativo Siero	**11802Q**	**CLIA**	**1-2 gg**	**INFETTIVOLOGIA**

VALORI DI RIFERIMENTO

A.Anti Toxoplasma gondii IgM Abs	AU/mL	Negativi: < 6 Dubbi: 6-8 Positivi: >= 8

Interpretazione

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Transglutaminasi IgA Siero	**155**	**CLIA**	**5-6 gg**	**Autoimmunità**

Inviare il siero separato in provette di altezza 7.5 cm (75 mm) e diametro 1.0 cm (10 mm)

VALORI DI RIFERIMENTO

	UA/mL	<10,0 Negativo >10,0 Positivo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Transglutaminasi IgG Siero	**1559**	**CLIA**	**5 gg**	**Autoimmunità**

Inviare il siero separato in provette di altezza 7.5 cm (75 mm) e diametro 1.0 cm (10 mm)

VALORI DI RIFERIMENTO

	UA/mL	<10 Negativo ≥10 Positivo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Treponema Pallidum IgG Siero	**113**	**immunofluorescenza indiretta**	**5-6 gg**	**INFETTIVOLOGIA**

2-8° C per conservazioni superiori ai 7 giorni dal prelievo congelare il campione a -20°C

VALORI DI RIFERIMENTO

< 1:5

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Treponema Pallidum IgM Siero	**114**	**immunofluorescenza indiretta**	**3 gg**	**INFETTIVOLOGIA**

2-8°C per conservazione superiore ai 7 giorni dal prelievo congelare il campione a -20°C

VALORI DI RIFERIMENTO

< 1:5

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Varicella IgG Siero	**164Q**	**CLIA**	**4 gg**	**INFETTIVOLOGIA**

VALORI DI RIFERIMENTO

	mIU/ml	< 150 Negativo >= 150 Positivo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Varicella IgM Siero	**1640Q**	**CLIA**	**4 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

	Index	< 0,9 Negativo 0,9 - 1,1 Dubbio > 1,1 Positivo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.C.E. (Angiotensin Converting Enzyme) Siero	**267**	**enzimatico**	**8-9 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

	U/l	8 - 52

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Ac.Valproico Siero	**671**	**immunoenzimatico**	**3 gg**	**TOSSICOLOGIA**

VALORI DI RIFERIMENTO

	µg/mL	50 - 100 Intervallo terapeutico

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ACETATO DI BUTILE Urine Fine Turno Urine F.T.	**7610**	**GC**	**18 gg**	**TOSSICOLOGIA**

Utilizzare una provetta da 10 mL con fondo a U, da riempire completamente, chiusa e ben tappata, da inviare tale quale al laboratorio

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/L	Soggetti professionalmente esposti: Valore limite non proposto

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ACETATO DI BUTILE Urine Inizio Turno Urine I.T.	**761**	**GC**	**8 gg**	**TOSSICOLOGIA**

Utilizzare una provetta da 10 mL con fondo a U, da riempire completamente, chiusa e ben tappata, da inviare tale quale al laboratorio

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/L	Soggetti professionalmente esposti: Valore limite non proposto

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ACETATO DI ETILE Urine Fine Turno Urine F.T.	**7310**	**gascromatografico**	**19-20 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

Utilizzare una provetta da 10 mL con fondo a U, da riempire completamente, chiusa e ben tappata, da inviare tale quale al laboratorio

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/L	Non sono presenti valori di rif. in letteratura

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ACETATO DI ETILE Urine Inizio Turno Urine I.T.	**731**	**gascromatografico**	**19-20 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

Utilizzare una provetta da 10 mL con fondo a U, da riempire completamente, chiusa e ben tappata, da inviare tale quale al laboratorio

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/L	Non sono presenti valori di rif. in letteratura

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ACETONE Ematico Siero	**7292**	**Vedi allegato**	**2-3 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

Utilizzare una provetta da 10 mL con fondo a U, da riempire completamente, chiusa e ben tappata, da inviare tale quale al laboratorio

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ACETONE Urine Fine Turno Urine F.T.	72919	HPLC	6 gg	TOSSICOLOGIA

Utilizzare una provetta da 10 mL con fondo a U, da riempire completamente, chiusa e ben tappata, da inviare tale quale al laboratorio

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/L	Soggetti professionalmente esposti a: Acetone: < 80 (f.t.) Isopropanolo: < 25 (f.t.)

ACETONE Urine Inizio Turno Urine I.T.	7299	HPLC	6 gg	TOSSICOLOGIA

Utilizzare una provetta da 10 mL con fondo a U, da riempire completamente, chiusa e ben tappata, da inviare tale quale al laboratorio

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/L	Soggetti professionalmente esposti a: Acetone: < 80 (f.t.) Isopropanolo: < 25 (f.t.)

ACETONITRILE Urine Fine Turno Urine F.T.	7974	gascromatografico	20-21 gg	ALTA SPECIALISTICA

Utilizzare una provetta da 10 mL con fondo a U, da riempire completamente, chiusa e ben tappata, da inviare tale quale al laboratorio

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/L

ACETONITRILE Urine Inizio Turno Urine I.T.	7973	gascromatografico	20-21 gg	ALTA SPECIALISTICA

Utilizzare una provetta da 10 mL con fondo a U, da riempire completamente, chiusa e ben tappata, da inviare tale quale al laboratorio

VALORI DI RIFERIMENTO

Acidi Biliari Siero	288	SPETTROFOTOMETRICO	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

	µmol/L	< 10

Acidi Biliari post prandiale Siero	288PP	Colorimetrico	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

	uMol/L

Acidi grassi essenziali (EFA) Plasma EDTA congelato	425	gascromatografico	12-13 gg	ALTA SPECIALISTICA

Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

VALORI DI RIFERIMENTO

Ac. Arachidonico/ Eicosapentaenoico AA/EPA	Rapporto ottimale: 1,0 - 3,0
Ac. Arachidonico/ Docoesaenoico AA/DHA	Rapporto ottimale: 0,5 - 2,0

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE

ACIDI METILIPPURICI Urine Fine Turno | **7199** | **HPLC** | **6 gg**

Urine F.T.

TOSSICOLOGIA

ACCETTARE CONTESTUALMENTE AL CODICE 791 CREATININA URINE FINE TURNO

VALORI DI RIFERIMENTO

ACIDI METILIPPURICI Urine/Creatinina F.T.	g/g creatinina	Soggetti professionalmente esposti a Xileni: < 1,5 (f.t.)
Creatininuria	g/L	0,3 - 3,0
AC METILIPPURICO Urinario	g/L	

ACIDI METILIPPURICI Urine Inizio Turno | **7109** | **HPLC** | **6 gg**

Urine I.T.

TOSSICOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ACIDI METILIPPURICI Urine/Creatinina I.T.	g/g creatinina	Soggetti professionalmente esposti a Xileni: < 1,5 (f.t.)
Creatininuria	g/L	0,3 - 3,0
AC. METILIPPURICO Urinario	g/L	

Acido 5 OH Indolacetico urine 24H | **631** | **cromatografia liquida** | **10 gg**

Urine 24h Acidificate

TOSSICOLOGIA

La raccolta del campione di urine delle 24 h prevede l' acidificazione delle urine stesse. L' acidificazione viene effettuata versando nel recipiente, prima di iniziare la raccolta, circa 5 ml di HCl 5 M per ogni litro di urina (4 cucchiai di acido muriatico del commercio). Prelevare un'aliquota di circa 10 ml di urina delle 24 h acidificata, con l' indicazione della diuresi totale ed inviare in apposito contenitore di trasporto.
Risposta dopo 24 h.
A partire dalle 48 ore precedenti l'inizio e per tutto il tempo di raccolta delle urine è necessario osservare una dieta priva dei seguenti alimenti: ananas, avocado, banane, kiwi, more, prugne rosse, melanzane, pomodori, frutta secca, caffè, tè, cioccolato. Durante questo periodo si consiglia, previa consultazione del medico, di evitare l'assunzione di farmaci, in caso contrario, è opportuno comunicare il nome dei farmaci assunti al momento dell'esame

VALORI DI RIFERIMENTO

	µmol/24h	10,5 - 47,1

ACIDO BUTOSSIACETICO Urine Fine Turno | **1633** | **HPLC** | **20-21 gg**

Urine F.T.

ALTA SPECIALISTICA

E' indispensabile indicare sempre la data di nascita

VALORI DI RIFERIMENTO

ACIDO BUTOSSIACETICO Urine F.T.	mg/g creatinina	Esposti F.T.F.S.L.: inf. A 200 (ACGIH 2021)
Creatininuria	g/L	0,3 - 3,0

ACIDO BUTOSSIACETICO Urine Inizio Turno | **1632** | **HPLC** | **20-21 gg**

Urine I.T.

ALTA SPECIALISTICA

E' indispensabile indicare sempre la data di nascita

VALORI DI RIFERIMENTO

ACIDO BUTOSSIACETICO Urine I.T.	mg/g creatinina	Esposti F.T.F.S.L.: inf. A 200 (ACGIH 2021)
Creatinina Urine Inizio Turno	g/L	0,3 - 3,0

ACIDO FENILGLIOSSILICO Urine Fine Turno (C) | **71299** | **HPLC** | **6 gg**

Urine F.T.

TOSSICOLOGIA

L'ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) non prevede un valore di riferimento per il singolo metabolita, consiglia, come indicatore biologico di esposizione (IBE) a stirene e a etilbenzene, il dosaggio dell'acido mandelico sommato all'acido fenilgliossilico (nuovi esami cod.1624 – cod.1625)

ACCETTARE CONTESTUALMENTE AL CODICE 791 CREATININA URINE FINE TURNO

VALORI DI RIFERIMENTO

ACIDO FENILGLIOSSILICO Urine/Creatinina F.T.	mg/g creatinina	Soggetti professionalmente esposti: Valore limite non proposto
Creatininuria	g/L	0,3 - 3,0
ACIDO FENILGLIOSSILICO Urinario	mg/L	

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE

ACIDO FENILGLIOSSILICO Urine Inizio Turno (C)

COD.	METODO	TAT
7129	HPLC	6 gg

Urine I.T.

TOSSICOLOGIA

L'ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) non prevede un valore di riferimento per il singolo metabolita, consiglia, come indicatore biologico di esposizione (IBE) a stirene e a etilbenzene, il dosaggio dell'acido mandelico sommato all'acido fenilgliossilico (nuovi esami cod.1624 – cod.1625).

ACCETTARE CONTESTUALMENTE AL CODICE 790 CREATININA URINE INIZIO TURNO

VALORI DI RIFERIMENTO

ACIDO FENILGLIOSSILICO Urine/Creatinina I.T.	mg/g creatinina	Soggetti professionalmente esposti: Valore limite non proposto
Creatininuria	g/L	0,3 - 3,0
ACIDO FENILGLIOSSILICO Urinario	mg/L	

ACIDO FENILMERCAPTURICO Urine Fine Turno

COD.	METODO	TAT
1273	Cromat. Liq. - Spettrometria di massa	5 gg

Urine F.T.

ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

ACIDO FENILMERCAPTURICO Urine/ Creatinina F.T.	µg/g crea	Popolazione Generale: < 10,0 Esposizione a Benzene: < 25,0(ACGIH 2021)
Creatininuria	g/L	0,3 - 3,0
ACIDO FENILMERCAPTURICO Urinario	µg/L	

ACIDO FENILMERCAPTURICO Urine Inizio Turno

COD.	METODO	TAT
6309	Cromat. Liq. - Spettrometria di massa	5 gg

Urine I.T.

ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

ACIDO FENILMERCAPTURICO Urine/ Creatinina I.T.	µg/g crea	Popolazione Generale: < 10,0 Esposizione a Benzene: < 25,0(ACGIH 2021)
Creatininuria	g/L	0,3 - 3,0
ACIDO FENILMERCAPTURICO Urinario	µg/L	

ACIDO FORMICO Urine Fine Turno (C)

COD.	METODO	TAT
7280	gascromatografico	10-11 gg

Urine F.T.

ALTA SPECIALISTICA

ACCETTARE CONTESTUALMENTE AL CODICE 791 CREATININA URINE FINE TURNO

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/g crea	< 80

ACIDO FORMICO Urine Inizio Turno (C)

COD.	METODO	TAT
728	gascromatografico	10-11 gg

Urine I.T.

ALTA SPECIALISTICA

ACCETTARE CONTESTUALMENTE AL CODICE 790 CREATININA URINE INIZIO TURNO

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/g crea	< 80

ACIDO IPPURICO Urine Fine Turno (C)

COD.	METODO	TAT
70991	HPLC	6 gg

Urine F.T.

TOSSICOLOGIA

ACCETTARE CONTESTUALMENTE AL CODICE 791 CREATININA URINE FINE TURNO

VALORI DI RIFERIMENTO

ACIDO IPPURICO Urine/ Creatinina F.T.	g/g creatinina	Soggetti professionalmente esposti a Toluene: < 1,6 (f.t.) Si consiglia il dosaggio dell'orto-cresolo urinario come indicatore biologico di esposizione a Toluene
Creatininuria	g/L	0,3 - 3,0
AC. IPPURICO Urinario	g/L	

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE

ACIDO IPPURICO Urine Inizio Turno (C)

7099	HPLC	6 gg	

Urine I.T.

TOSSICOLOGIA

ACCETTARE CONTESTUALMENTE AL CODICE 790 CREATININA URINE INIZIO TURNO

VALORI DI RIFERIMENTO

ACIDO IPPURICO Urine/ Creatinina I.T.	g/g creatinina	Soggetti professionalmente esposti a Toluene: < 1,6 (f.t.) Si consiglia il dosaggio dell'orto-cresolo urinario come indicatore biologico di esposizione a Toluene
Creatininuria	g/L	0,3 - 3,0
AC. IPPURICO Urinario	g/L	

ACIDO MANDELICO + ACIDO FENILGLIOSSILICO Urine Fine Turno

1625	HPLC	6 gg	

Urine F.T.

TOSSICOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Ac. Mandelico + Ac. Fenilgliossilico Urine/Creatinina F.T.	mg/g creatinina	Soggetti professionalmente esposti a: Etilbenzene: < 150 (f.t.) Stirene: < 400 (f.t.)
Creatininuria	g/L	0,3 - 3,0
Ac. Mandelico + Ac. Fenilgliossilico Urine	mg/L	

ACIDO MANDELICO + ACIDO FENILGLIOSSILICO Urine Inizio Turno

1624	HPLC	6 gg	

Urine I.T.

TOSSICOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Ac. Mandelico + Ac. Fenilgliossilico/Creatinina I.T.	mg/g creatinina	Soggetti professionalmente esposti a: Etilbenzene: < 150 (f.t.) Stirene: < 400 (f.t.)
Creatininuria	g/L	0,3 - 3,0
Ac. Mandelico + Ac. Fenilgliossilico Urine	mg/L	

ACIDO MANDELICO Urine Fine Turno (C)

71119	HPLC	6 gg	

Urine F.T.

TOSSICOLOGIA

L'ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) non prevede un valore di riferimento per il singolo metabolita, consiglia, come indicatore biologico di esposizione (IBE) a stirene e a etilbenzene, il dosaggio dell'acido mandelico sommato all'acido fenilgliossilico (nuovi esami cod.1624 – cod.1625).

ACCETTARE CONTESTUALMENTE AL CODICE 791 CREATININA URINE FINE TURNO

VALORI DI RIFERIMENTO

ACIDO MANDELICO Urine/Creatinina F.T.	mg/g creatinina	Soggetti professionalmente esposti: Valore limite non proposto
Creatininuria	g/L	0,3 - 3,0
ACIDO MANDELICO Urinario	mg/L	

ACIDO MANDELICO Urine Inizio Turno (C)

7119	HPLC	6 gg	

Urine I.T.

TOSSICOLOGIA

L'ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) non prevede un valore di riferimento per il singolo metabolita, consiglia, come indicatore biologico di esposizione (IBE) a stirene e a etilbenzene, il dosaggio dell'acido mandelico sommato all'acido fenilgliossilico (nuovi esami cod.1624 – cod.1625).

ACCETTARE CONTESTUALMENTE AL CODICE 790 CREATININA URINE INIZIO TURNO

VALORI DI RIFERIMENTO

ACIDO MANDELICO Urine/Creatinina I.T.	mg/g creatinina	Soggetti professionalmente esposti: Valore limite non proposto
Creatininuria	g/L	0,3 - 3,0
ACIDO MANDELICO Urinario	mg/L	

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ACIDO METOSSIACETICO Urine Fine Turno Urine F.T.	**1557**	**gascromatografico**	**20-21 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/g crea	Soggetti Esposti: < 1,0 (ACGIH 2021)

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ACIDO METOSSIACETICO Urine Inizio Turno Urine I.T.	**1556**	**gascromatografico**	**20-21 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/g crea	Soggetti Esposti: < 1,0 (ACGIH 2021)

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Acido Omovanillico urine 24H Urine 24h Acidificate	**6330**	**cromatografia liquida**	**10 gg**	**TOSSICOLOGIA**

Prelevare un'aliquota di circa 10 ml di urina delle 24 h, con l' indicazione della diuresi totale ed inviare in apposito contenitore di trasporto.

VALORI DI RIFERIMENTO

	µmol/24h	< 48,0

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ACIDO TRANS, TRANS-MUCONICO Urine Fine Turno (C) Urine F.T.	**7960**	**HPLC**	**6 gg**	**TOSSICOLOGIA**

Accettare contestualmente al codice 791 CREATININA URINE FINE TURNO

VALORI DI RIFERIMENTO

ACIDO TRANS, TRANS-MUCONICO Urine/Creatinina F	µg/g creatinina	Limiti Esposti : < 500 µg/gcreatininuria (ACGIH 2021) Non esposti Fumatori : < 240µg/g creatininuria (SIVR 2011) Non esposti Non fumatori : <145 µg/g creatininuria (SIVR2011)
Creatininuria	g/L	0,3 - 3,0
Acido TT-Muconico Urinario	µg/L	

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ACIDO TRANS,TRANS-MUCONICO Urine Inizio Turno (C) Urine I.T.	**796**	**HPLC**	**6 gg**	**TOSSICOLOGIA**

Accettare contestualmente al codice 790 CREATININA URINE INIZIO TURNO

VALORI DI RIFERIMENTO

ACIDO TRANS, TRANS-MUCONICO Urine/Creatinina I.	µg/g creatinina	Limiti Esposti : < 500 µg/gcreatininuria (ACGIH 2021) Non esposti Fumatori : < 240µg/g creatininuria (SIVR 2011) Non esposti Non fumatori : <145 µg/g creatininuria (SIVR2011)
Creatininuria	g/L	0,3 - 3,0
Acido TT-MUCONICO Urinario	µg/L	

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ACIDO TRICLOROACETICO (ATA) - (T.C.A.) Urine Inizio Turno Urine I.T.	**707**	**gascromatografico**	**10-11 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/L	Popolazione Generale: < 0,2 Esposizione Professionale a: Tricloroetilene: < 15,0 (f.t./f.s.l.) (ACGIH 2021) Tricloroetano: < 10,0 (f.t./f.s.l.) (ACGIH 2021)

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE

ACIDO TRICLOROACETICO (ATA)- (T.C.A.) Urine Fine Turno | **7070** | **gascromatografico** | **10-11 gg**

Urine F.T.

ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L — Popolazione Generale: < 0,2

Esposizione Professionale a:
Tricloroetilene: < 15,0 (f.t./f.s.l.)
(ACGIH 2021)
Tricloroetano: < 10,0 (f.t./f.s.l.)
(ACGIH 2021)

Acido Vanilmandelico urine | **629** | **cromatografia liquida** | **10 gg**

Urine 24h Acidificate

TOSSICOLOGIA

La raccolta del campione di urine delle 24 h prevede l' acidificazione delle urine stesse. L' acidificazione viene effettuata versando nel recipiente, prima di iniziare la raccolta, circa 5 ml di HCl 5 M per ogni litro di urina (4 cucchiai di acido muriatico del commercio). Prelevare un'aliquota di circa 10 ml di urina delle 24 h acidificata, con l' indicazione della diuresi totale ed inviare in apposito contenitore di trasporto.
Risposta dopo 24 h
A partire dalle 48 ore precedenti l'inizio e per tutto il tempo di raccolta delle urine è necessario osservare una dieta priva dei seguenti alimenti: avocado, banane, kiwi, frutta secca, caffè, tè, cioccolato. Durante questo periodo si consiglia, previa consultazione del medico, di evitare l'assunzione di farmaci, in caso contrario, è opportuno comunicare il nome dei farmaci assunti al momento dell'esame.

VALORI DI RIFERIMENTO

µmol/24h — < 33,0

ACRILONITRILE Urine Fine Turno | **7972** | **gascromatografico** | **20-21 gg**

Urine F.T.

ALTA SPECIALISTICA

Utilizzare una provetta da 10 mL con fondo a U, da riempire completamente, chiusa e ben tappata, da inviare tale quale al laboratorio

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L — < 1

ACRILONITRILE Urine Inizio Turno | **7971** | **gascromatografico** | **20-21 gg**

Urine I.T.

ALTA SPECIALISTICA

Utilizzare una provetta da 10 mL con fondo a U, da riempire completamente, chiusa e ben tappata, da inviare tale quale al laboratorio

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L — < 1

ACTH | **640** | **CLIA** | **3 gg**

Plasma EDTA congelato

SPECIALISTICA

Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

VALORI DI RIFERIMENTO

pg/ml — < 60,0

ADH Ormone Antidiuretico | **455** | **RIA** | **25 gg**

Plasma EDTA congelato

ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

pmol/L — < 13,0

ALA Deidrasi Eritrocitaria | **299** | | **15 gg**

Plasma Litio Eparina

ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL/E — > 20

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE

Albuminemia | **2602** | **COLORIMETRICO** | **1-2 gg**
Siero
ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

g/dL	3,5 - 5,2

ALCOOL BUTILICO Urine Fine Turno | **7320** | **gascromatografico** | **19-20 gg**
Urine F.T.
ALTA SPECIALISTICA

Utilizzare una provetta da 10 mL con fondo a U, da riempire completamente, chiusa e ben tappata, da inviare tale quale al laboratorio

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L	Assente

ALCOOL BUTILICO Urine Inizio Turno | **732** | **gascromatografico** | **19-20 gg**
Urine I.T.
ALTA SPECIALISTICA

Utilizzare una provetta da 10 mL con fondo a U, da riempire completamente, chiusa e ben tappata, da inviare tale quale al laboratorio

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L	Assente

Aldolasi | **303** | **enzimatico** | **4 gg**
Siero Cerba
ALTA SPECIALISTICA
SERVICE

VALORI DI RIFERIMENTO

U/L	< 7,6

Aldosterone 24h | **625** | **chemiluminescenza** | **7 gg**
Urine 24h
ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/24h	1,19 - 28,1

Aldosterone in Clinostatismo | **6220** | **CLIA** | **5 gg**
Plasma EDTA congelato
SPECIALISTICA

Il paziente deve rimanere supino per almeno 2 ore.
Centrifugare rapidamente (entro 30 minuti) a temperatura ambiente, separare e congelare.

VALORI DI RIFERIMENTO

pg/ml	28,0 - 239,0

Aldosterone in Ortostatismo | **622** | **CLIA** | **5 gg**
Plasma EDTA congelato
SPECIALISTICA

Centrifugare rapidamente (entro 30 minuti) a temperatura ambiente, separare e congelare

VALORI DI RIFERIMENTO

pg/ml	28,0 - 376,0

Alfa 1 Fetoproteina | **651** | **CLIA** | **1-2 gg**
Siero
ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL	< 8,00

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Alfa 2 Macroglobulina Siero	1311	nefelometrico	11-12 gg	

ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

g/L 0,74 - 2,98

Alfa-1 Antitripsina Siero	130	immunoturbidimetrico	3-4 gg	

ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL 90 - 200

Alfa-1-Glicoproteina (Mucoproteina) Siero	105	immunonefelometrico	4 gg	

ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

g/L 0,500 - 1,200

Allergie alimentari umane - prelievo capillare Materiale Vario	60156		7 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi allegato

Allergie Dog/Cat (125 allergeni) Materiale Vario	60159		7 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi allegato

Allergie Dog/Cat (61 allergeni) Materiale Vario	60157		7 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi allegato

Allergie Dog/Cat (64 allergeni) Materiale Vario	60158		7 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi allegato

Allergie Horse (125 allergeni) Materiale Vario	60162		7 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi allegato

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Allergie Horse (61 allergeni) Materiale Vario	60160		7 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi allegato

Allergie Horse (64 allergeni) Materiale Vario	60161		7 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi allegato

Allergie respiratorie umane - prelievo capillare Materiale Vario	60155		7 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi allegato

ALLUMINIO Sierico Plasma Litio Eparina	7191	ICP-MS	10-11 gg	

ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

	µg/l	< 10

ALLUMINIO Urine 24 ore Urine 24h	7192	ICP-MS	10-11 gg	

ALTA SPECIALISTICA

ACCETTARE CONTESTUALMENTE AL CODICE 790 CREATININA URINE INIZIO TURNO

VALORI DI RIFERIMENTO

	µg/24h	Popolazione Generale: < 20 Soggetti Esposti: < 200

ALLUMINIO Urine Fine Turno Urine F.T.	7190	ICP-MS	10-11 gg	

ALTA SPECIALISTICA

ACCETTARE CONTESTUALMENTE AL CODICE 791 CREATININA URINE FINE TURNO

VALORI DI RIFERIMENTO

	µg/l	Popolazione Generale: 1,0 - 15,0

ALLUMINIO Urine Inizio Turno Urine I.T.	719	ICP-MS	10-11 gg	

ALTA SPECIALISTICA

ACCETTARE CONTESTUALMENTE AL CODICE 790 CREATININA URINE INIZIO TURNO

VALORI DI RIFERIMENTO

	µg/l	Popolazione Generale: 1,0 - 15,0

ALT (GPT) Siero	2901	IFCC 37° C	1-2 gg	

ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

	U/L	< 55

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Amfetamine / Metamfetamine / MDMA (Ecsatsy) test di conferma su urine Urine	6353		20-21 gg	TOSSICOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Amfetamine/Metamfetamine matrice urinaria - Valenza clinica Urine	6337CL	immunoenzimatico	1-2 gg	TOSSICOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Amfetamine/Metamfetamine matrice urinaria

Interpretaizone — Negativo (Cut off: 500 ng/mL)

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Amfetamine/Metamfetamine matrice urinaria - Valenza Legale Urine	6337	immunoenzimatico	1-2 gg	TOSSICOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo (Cut off: 500 ng/mL)

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Amfetamine/Metamfetamine/MDMA matrice pilifera - Valenza Medico Legale Matrice Pilifera	1080	LC-MS-MS	30 gg	TOSSICOLOGIA

Il sabato è da escludere dal conteggio dei 10 giorni di refertazione. Per lesecuzione di questo esame è necessario inviare i campioni con catena di custodia.
Per ulteriori chiarimenti contattare il laboratorio.

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Amfetamine/Metamfetamine/MDMA matrice pilifera - Valenza Clinica Matrice Pilifera	1080CL	LC-MS-MS	30 gg	TOSSICOLOGIA

Il sabato è da escludere dal conteggio dei 10 giorni di refertazione.
Per ulteriori chiarimenti contattare il laboratorio.

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
AMH Anti Mullerian Hormone Siero congelato	453	CLIA	5 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL — Maschi: 0,86 - 13,25

Femmine: anni:
0 - 24 anni: 1,14 - 11,46
25 - 29 anni: 0,78 - 9,75
30 - 34 anni: 0,33 - 7,83
35 - 39 anni: 0,13 - 6,65
40 - 50 anni: 0,03 - 5,27
51 - 99 anni: < 0,03

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Amilasemia (Alfa-Amilasi) Siero	310	IFCC 37° C	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

U/L — < 118

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Amilasi Isoenzimi Siero	307	ENZIMATICO	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

Amilasi	U/L	30 - 118
Amilasi pancreatica	U/L	< 53
Amilasi salivare	U/L	< 47

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Amilasi Pancreatica Siero	3100	ENZIMATICO COLORIMETRICO	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

	U/L	< 53,0

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Amilasuria (Urine 24 h) Urine 24h	311	SPETTROFOTOMETRICO	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

	U/24h	< 650

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Amiloide A Siero	574	CLIA	14-15 gg	ALTA SPECIALISTICA SERVICE

VALORI DI RIFERIMENTO

	µg/mL	< 10,00

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Amiodarone Siero	6250	Cromat. Liq. - Spettrometria di massa	10-11 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/l	0,5 - 2,5

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
AMMINE AROMATICHE Urine Fine Turno Urine F.T.	7400	CROMATOGRAFIA COLORIMETRICA	12-13 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/L	< 10,0

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
AMMINE AROMATICHE Urine Inizio Turno Urine I.T.	740	CROMATOGRAFIA COLORIMETRICA	12-13 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/L	< 10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Ammoniemia Plasma EDTA congelato	292	ENZIMATICO	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

	µg/dL	10,00 - 80,00

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Androstenediolo Glucoronide Siero	6375	RIA	10-11 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL	Maschi: 1,53 - 14,82	Femmine: Pre-menopausa : 0,55 - 4,64 Post-menopausa : 0,61 - 3,71

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ANO - CONDILOMI AP-ANO	IN10285	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ANO - EMORROIDECTOMIA/RESEZ RETTALE STARR AP-ANO	IN10000		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ANO - FISTOLA ANALE AP-ANO	IN10027	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ANO - POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA (SING.) AP-ANO	IN10001		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Anti CENP (Anti centromero B) Siero	141	fluoroimmunoenzimatico	2 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL	< 7,0 Negativo 7,0 - 10,0 Dubbio > 10,0 Positivo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ANTIBIOGRAMMA AGAL- GRUPPO A (Pyogenes)-C-G <su campione esistente>	AST-ST03	MICRODILUIZIONE	1-2 gg	ANTIBIOGRAMMI

VALORI DI RIFERIMENTO

ANTIBIOGRAMMA
Materiale :
Identificazione
- Amoxicillina
- Ampicillina/Sulbactam
- Amoxicillina/Acido clavulanico
- Ampicillina
- Azitromicina
- Benzilpenicillina
- Cefaclor
- Cefepime
- Cefotaxime
- Ceftriaxone
- Cloramfenicolo
- Clindamicina
- Eritromicina
- Gentamicina
- Resistenza inducibile alla Clindamicina
- Levofloxacina
- Linezolid
- Moxifloxacina
- Rifampicina
- Teicoplanina
- Tetraciclina
- Tigeciclina
- Trimetoprim / Sulfametossazolo
- Vancomicina

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ANTIBIOGRAMMA EURGNCOL <su campione esistente>	AST-COL	BRODODILUIZIONE	1-2 gg	ANTIBIOGRAMMI

VALORI DI RIFERIMENTO

Natura del campione
Identificazione
- Colistina
- Ceftolozane / Tazobactam
- Ceftazidime / Avibactam
- Piperacillina / Tazobactam
- Meropenem

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ANTIBIOGRAMMA EUSTAPF <su campione esistente>	**AST-GP**	**BRODODILUIZIONE**	**1-2 gg**	

ANTIBIOGRAMMI

VALORI DI RIFERIMENTO

ANTIBIOGRAMMA
Materiale :
Identificazione
- Cefoxitina
- Cefoxitina Screening
- Ceftarolina
- Clindamicina
- D Test 1
- D Test 2
- Daptomicina
- Eritromicina
- Acido fusidico
- Gentamicina
- Levofloxacina
- Linezolid
- Moxifloxacina
- Mupirocina
- Norfloxacina
- Rifampicina
- Teicoplanina
- Telavancina
- Tetraciclina
- Tobramicina
- Trimetoprim / Sulfametossazolo
- Vancomicina

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ANTIBIOGRAMMA GRAM NEGATIVI <su campione esistente>	**AST-N204**	**MICRODILUIZIONE**	**1-2 gg**	

ANTIBIOGRAMMI

VALORI DI RIFERIMENTO

ANTIBIOGRAMMA
Materiale :
Identificazione
- Amikacina
- Amoxicillina / Acido Clavulanico
- Ampicillina
- Cefepime
- Cefotaxime
- Ceftazidime
- Ciprofloxacina
- Ertapenem
- ESBL
- Fosfomicina
- Gentamicina
- Imipenem
- Meropenem
- Nitrofurantoina
- Norfloxacina
- Piperacillina / Tazobactam
- Trimetoprim / Sulfametossazolo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ANTIBIOGRAMMA GRAM NEGATIVI <su campione esistente>	**AST-N378**	**MICRODILUIZIONE**	**1-2 gg**	**ANTIBIOGRAMMI**

VALORI DI RIFERIMENTO

ANTIBIOGRAMMA
Materiale :
Identificazione
- Amikacina
- Amoxicillina / Acido Clavulanico
- Ampicillina
- Cefepime
- Cefotaxime
- Cefotixina
- Ceftazidime
- Cefuroxime
- Cefuroxime Axetil
- Ciprofloxacina
- Ertapenem
- Fosfomicina
- Gentamicina
- Levofloxacina
- Meropenem
- Nitrofurantoina
- Piperacillina / Tazobactam

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ANTIBIOGRAMMA GRAM NEGATIVI <su campione esistente>	**AST-N379**	**MICRODILUIZIONE**	**1-2 gg**	**ANTIBIOGRAMMI**

VALORI DI RIFERIMENTO

ANTIBIOGRAMMA
Materiale :
Identificazione
- Amikacina
- Amoxicillina
- Amoxicillina / Acido Clavulanico
- Cefepime
- Cefotaxime
- Ceftazidime
- Ciprofloxacina
- Ertapenem
- ESBL
- Fosfomicina
- Gentamicina
- Imipenem
- Meropenem
- Nitrofurantoina
- Piperacillina / Tazobactam
- Trimetoprim / Sulfametossazolo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ANTIBIOGRAMMA GRAM NEGATIVI <su campione esistente>	AST-N380	MICRODILUIZIONE	1-2 gg	ANTIBIOGRAMMI

VALORI DI RIFERIMENTO

ANTIBIOGRAMMA
Materiale :
Identificazione
- Amikacina
- Amoxicillina / Acido Clavulanico
- Ampicillina
- Ampicillina / Sulbactam
- Cefalexina
- Cefixime
- Cefpodoxime
- Ceftazidime
- Ceftriaxone
- Cefuroxime
- Cefuroxime Axetil
- Ciprofloxacina
- ESBL
- Gentamicina
- Meropenem
- Netilmicina
- Norfloxacina
- Tobramicina
- Trimetoprim / Sulfametossazolo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ANTIBIOGRAMMA GRAM NEGATIVI <su campione esistente>	AST-N397	MICRODILUIZIONE	1-2 gg	ANTIBIOGRAMMI

VALORI DI RIFERIMENTO

ANTIBIOGRAMMA
Materiale :
Identificazione
- Amikacina
- Amoxicillina / Acido Clavulanico
- Cefepime
- Cefotaxime
- Ceftazidime
- Ceftazidime / Avibactam
- Ceftolozane / Tazobactam
- Ciprofloxacina
- Colistina
- Gentamicina
- Imipenem
- Meropenem
- Piperacillina / Tazobactam
- Tobramicina
- Trimetoprim / Sulfametossazolo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ANTIBIOGRAMMA GRAM NEGATIVI <su campione esistente>	AST-N437	MICRODILUIZIONE	1-2 gg	ANTIBIOGRAMMI

VALORI DI RIFERIMENTO

ANTIBIOGRAMMA
Materiale :
Identificazione
- Amikacina
- Amoxicillina / Acido Clavulanico
- Amoxicillina / Acido Clavulanico (urina)
- Amoxicillina / Acido Clavulanico (altro)
- Ampicillina
- Cefalexina
- Cefixime
- Cefpodoxime
- Ceftazidime
- Ceftriaxone
- Ciprofloxacina
- Ertapenem
- ESBL
- Fosfomicina
- Gentamicina
- Levofloxacina
- Meropenem
- Nitrofurantoina
- Trimetoprim / Sulfametossazolo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ANTIBIOGRAMMA GRAM NEGATIVI <su campione esistente>	AST-N439	MICRODILUIZIONE	1-2 gg	ANTIBIOGRAMMI

VALORI DI RIFERIMENTO

ANTIBIOGRAMMA
Materiale :
Identificazione
- Amikacina
- Amoxicillina / Acido Clavulanico
- Amoxicillina / Acido Clavulanico (urina)
- Amoxicillina / Acido Clavulanico (altro)
- Cefepime
- Ceftazidime
- Ceftazidime/Avibactam
- Ceftolazane/Tazobactam
- Ciprofloxacina
- Colistina
- Fosfomicina
- Gentamicina
- Imipenem/Relabactam
- Meropenem
- Meropenem/Vaborbactam
- Piperacillina / Tazobactam
- Tigeciclina

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ANTIBIOGRAMMA GRAM NEGATIVI <su campione esistente>	AST-N440	MICRODILUIZIONE	1-2 gg	ANTIBIOGRAMMI

VALORI DI RIFERIMENTO

ANTIBIOGRAMMA
Materiale :
Identificazione
- Amikacina
- Ampicillina/Sulbactam
- Aztreonam
- Cefepime
- Ceftazidime
- Ceftazidime/Avibactam
- Ceftolozane/Tazobactam
- Ciprofloxacina
- Colistina
- Imipenem
- Imipenem/Relabactam
- Meropenem
- Piperacillina / Tazobactam
- Tobramicina

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ANTIBIOGRAMMA GRAM POSITIVI <su campione esistente>	AST-P576	MICRODILUIZIONE	1-2 gg	ANTIBIOGRAMMI

VALORI DI RIFERIMENTO

ANTIBIOGRAMMA
Materiale :
Identificazione
- Amoxicillina
- Amoxicillina / Acido Clavulanico
- Ampicillina
- Ampicillina / Sulbactam
- Benzilpenicillina
  - Polmonite
  - Meningite
  - Altro
- Cefotaxime
- Ceftriaxone
- Ciprofloxacina
- Coloramfenicolo
- Daptomicina
- Eritromicina
- Resistenza ad alto livello verso la gentamicina
- Imipenem
- Kanamicina ad alto livello (sinergia)
- Levofloxacina
- Linezolid
- Moxifloxacina
- Nitrofurantoina
- Chinupristina / Dalfopristina
- Streptomicina ad alto dosaggio
- Teicoplanina
- Telitromicina
- Tetraciclina
- Tigeciclina
- Trimetoprim
- Trimetoprim / Sulfametossazolo
- Vancomicina

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ANTIBIOGRAMMA GRAM POSITIVI <su campione esistente>	**AST-P592**	**MICRODILUIZIONE**	**1-2 gg**	**ANTIBIOGRAMMI**

VALORI DI RIFERIMENTO

ANTIBIOGRAMMA
Materiale :
Identificazione
- Acido fusidico
- Amoxicillina / Acido Clavulanico
- Ampicillina
- Ampicillina / Sulbactam
- Benzilpenicillina
- Cefoxitina sceening
- Cefaclor
- Cefotaxime
- Ceftriaxone
- Claritromicina
- Ciprofloxacina
- Clindamicina
- Daptomicina
- Eritromicina
- Fosfomicina
- Gentamicina
- Resistenza ad alto livello verso la gentamicina
- Imipenem
- Kanamicina ad alto livello (sinergia)
- Levofloxacina
- Linezolid
- Moxifloxacina
- Netilmicina
- Nitrofurantoina
- Oxacillina
- Chinupristina / Dalfopristina
- Resitenza inducibile alla Clindamicina
- Rifampicina
- Streptomicina ad alto dosaggio
- Teicoplanina
- Tetraciclina
- Tigeciclina
- Tobramicina
- Trimetoprim
- Trimetoprim / Sulfametossazolo
- Vancomicina

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ANTIBIOGRAMMA GRAM POSITIVI <su campione esistente>	**AST-P658**	**MICRODILUIZIONE**	**1-2 gg**	**ANTIBIOGRAMMI**

VALORI DI RIFERIMENTO

ANTIBIOGRAMMA
Materiale :
Identificazione
- Amoxicillina / Acido Clavulanico
- Ampicillina
- Ampicillina / Sulbactam
- Ciprofloxacina
- Daptomicina
- Resistenza ad alto livello verso la gentamicina
- Imipenem
- Kanamicina ad alto livello (sinergia)
- Levofloxacina
- Linezolid
- Nitrofurantoina
- Chinupristina / Dalfopristina
- Streptomicina ad alto dosaggio
- Teicoplanina
- Tigeciclina
- Trimetoprim
- Trimetoprim / Sulfametossazolo
- Vancomicina

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ANTIBIOGRAMMA GRAM POSITIVI <su campione esistente>	**AST-P659**	**MICRODILUIZIONE**	**1-2 gg**	**ANTIBIOGRAMMI**

VALORI DI RIFERIMENTO

ANTIBIOGRAMMA
Materiale :
Identificazione
- Benzilpenicillina
- Cefotixina Screening
- Ceftarolina
- Clindamicina
- Daptomicina
- Eritromicina
- Acido fusidico
- Gentamicina
- Resistenza inducibile alla clindamicina
- Levofloxacina
- Linezolid
- Mupirocina
- Oxacillina
- Rifampicina
- Teicoplanina
- Tetraciclina
- Tigeciclina
- Trimetoprim / Sulfametossazolo
- Vancomicina

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ANTIBIOGRAMMA MANUALE <su campione esistente>	**AST-MAN**	**E-Test**	**1-2 gg**	**ANTIBIOGRAMMI**

VALORI DI RIFERIMENTO

ANTIBIOGRAMMA
Materiale :
Identificazione
- Acido Fusidico
- Amikacina
- Amoxicillina
- Amoxicillina / Acido Clavulanico
- Ampicillina
- Azitromicina
- Beta lattamasi
- Cefepime
- Cefotaxime
- Cefoxitina
- Ceftazidime
- Cefuroxime
- Ciprofloxacina
- Claritromicina
- Clindamicina
- Cloramfenicolo
- Doxiciclina
- Eritromicina
- Gentamicina
- Netilmicina
- Norfloxacina
- Ofloxacina
- Penicillina
- Piperacillina
- Tetraciclina
- Teicoplanina
- Tobramicina
- Trimethoprim/Sulfamethoxazolo
- Vancomicina
- Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Anticorpi Anti SCL-70 Siero	**13125**	**fluoroimmunoenzimatico**	**9 gg**	**Autoimmunità**

VALORI DI RIFERIMENTO

UA/mL	< 7,0 Negativo 7,0 - 10,0 Dubbio > 10,0 Positivo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Anticorpi anti Cardiolipina IgA Siero	**1225**	**immunoenzimatico**	**7 gg**	**Autoimmunità**

VALORI DI RIFERIMENTO

APL-U/Ml	< 10 Negativo ≥ 20 Positivo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Anticorpi Anti Cardiolipina IgG Siero	1391	CLIA	5 gg	Autoimmunità

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL

< 10 Negativo
10-20 Dubbio
>20 Positivo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Anticorpi Anti Cardiolipina IgM Siero	1392	CLIA	5 gg	Autoimmunità

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL

< 10 Negativo
10-20 Dubbio
>20 Positivo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Anticorpi Anti Dnasi B Siero	1065	nefelometrico	10 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

UI/ml

< 190 Negativo
> 190 Positivo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Anticorpi Anti ds-DNA Siero	1938G	CLIA	9 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Anticorpi Anti Gliadina Deamidata IgA Siero	DGPA	CLIA	5 gg	Autoimmunità

VALORI DI RIFERIMENTO

UA/mL

<10 Negativo
>10 Positivo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Anticorpi Anti Gliadina Deamidata IgG Siero	DGPG	CLIA	4 gg	Autoimmunità

VALORI DI RIFERIMENTO

UA/mL

<10 Negativo
>10 Positivo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Anticorpi anti Jo-1 Siero	13126	CLIA	5 gg	Autoimmunità

VALORI DI RIFERIMENTO

Assenti

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ANTICORPI ANTI LEGIONELLA PNEUMOPHILA IgG Siero	**1321B**	**ELISA**	**5-6 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

	Index	Negativo < 0,9 Dubbio 0,9 - 1,1 Positivo > 1,1

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ANTICORPI ANTI LEGIONELLA PNEUMOPHILA IgM Siero	**1321A**	**ELISA**	**10-11 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

	Index	Negativo < 0,9 Dubbio 0,9 - 1,1 Positivo > 1,1

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Anticorpi anti Mieloperossidasi (MPO) Siero	**1364**	**fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP**	**3-4 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

	IU/mL	<3,5 Negativo 3,5 - 5,0 Dubbio > 5,0 POSITIVO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ANTICORPI ANTI NUCLEO ANA IFI Siero	**ANA**	**immunofluorescenza indiretta**	**5-6 gg**	**GENETICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

ANTICORPI ANTI NUCLEO (ANA)	Titolo	Negativo < 1:160 Positivo ≥ 1:160
TITOLO 1		
PATTERN 1		
TITOLO 2		
PATTERN 2		
NOTA		

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Anticorpi Anti Ovaio Ig Totali Siero	**834**	**immunofluorescenza indiretta**	**27-28 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

		Negativo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Anticorpi Anti PCNA Siero	**1109**	**fluoroimmunoenzimatico**	**2 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

In caso di consegna tardiva al laboratorio il campione può essere conservato in un luogo fresco (2 - 8 °C) per un massimo di 3 giorni.
Per conservazioni maggiori ai 3 giorni congelare il campione a -20°C.
Substrato: cellule Hep-2

VALORI DI RIFERIMENTO

	U/mL	< 7,0 Negativo 7,0 - 10,0 Dubbio > 10,0 Positivo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Anticorpi anti peptide citrullinato ciclico (CCP) Siero	395	CLIA	5 gg	Autoimmunità

VALORI DI RIFERIMENTO

UA/mL — < 5,0 Negativo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Anticorpi anti Proteinasi 3 (PR3) Siero	1365	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

IU/mL
<2,0 Negativo
2,0 - 3,0 Dubbio
> 3,0 POSITIVO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Anticorpi Anti RIB-P (Ribosomiali P) Siero	337	fluoroimmunoenzimatico	2 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL
< 7,0 Negativo
7,0 - 10,0 Dubbio
> 10,0 Positivo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Anticorpi Anti Sm Siero	13123	CLIA	5 gg	Autoimmunità

VALORI DI RIFERIMENTO

Assenti

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Anticorpi Anti Sm/RNP Siero	13124	fluoroimmunoenzimatico	5 gg	Autoimmunità

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL
< 5,0 Negativo
5,0 - 10,0 Dubbio
> 10,0 Positivo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Anticorpi Anti SSA (Ro) Siero	13121	CLIA	5 gg	Autoimmunità

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL — Assenti

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Anticorpi Anti SSB (La) Siero	13122	CLIA	5 gg	Autoimmunità

VALORI DI RIFERIMENTO

Assenti

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ANTICORPI ANTI TREPONEMA PALLIDUM SCREENING Siero	**4526**	**elettrochemiluminescenza**	**2-5 gg**	**INFETTIVOLOGIA**

VALORI DI RIFERIMENTO

	Index	<1,00 non reattivo ≥1,00 reattivo

Anticorpi Anti-RNA Polimerasi III Siero	**13129**	**fluoroimmunoenzimatico**	**14 gg**	**Autoimmunità**

VALORI DI RIFERIMENTO

	U/mL	< 7,0 Negativo 7,0 - 10,0 Dubbio > 10,0 Positivo

Anticorpi IgG S-RBD contro SARS-CoV-2 Siero	**2248**	**CLIA**	**4 gg**	**SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

Anticorpi IgG S-RBD contro SARS-CoV-2	AU/mL	< 1,00 non reattivo
	BAU/mL	> 4.29 reattivo

ANTIMICOGRAMMA MICETI <su campione esistente>	**AST-YS08**	**MICRODILUIZIONE**	**1-2 gg**	**ANTIBIOGRAMMI**

VALORI DI RIFERIMENTO

ANTIMICOGRAMMA
Materiale :
Identificazione
Amfotericina B
Caspofungina
Fluconazolo
Flucitosina
Micafungina
Voriconazolo
Anidulafungina
Itraconazolo
Commento

Antimonio Urine F.T. Urine F.T.	**7440**	**assorbimento atomico**	**20-21 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

	µg/L	Popolazione generale < 3 Soggetti esposti: non sono reperibili in letteratura valori correlabili con un indice biologico di esposizione

Antimonio Urine I.T. Urine I.T.	**744**	**assorbimento atomico**	**20-21 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

	µg/L	Popolazione generale < 3 Soggetti esposti: non sono reperibili in letteratura valori correlabili con un indice biologico di esposizione

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Antitrombina III Plasma Citrato	**018**	**Cromogenico anti-Xa**	**1-2 gg**	**ANALISI**

VALORI DI RIFERIMENTO

%	80 - 120	

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Anti-ZnT8 Siero	**1268**	**CLIA**	**8-10 gg**	**SPECIALISTICA**

In caso di consegna tardiva al laboratorio il campione può essere conservato in un luogo fresco (2 - 8 °C) per un massimo di 3 giorni.
Per conservazioni maggiori ai 3 giorni congelare il campione a -20°C.

VALORI DI RIFERIMENTO

AU/ml	<10.00 Non Reattivi ≥10.00 Reattivi	

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
APO E (E2-E3-E4) Sangue Inter EDTA	**GENE088**		**20-21 gg**	**GENETICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Apolipoproteina A1 Siero	**3250**	**immunonefelometrico**	**3 gg**	**SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL	Maschi: 90 - 170	Femmine: 108 - 185

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Apolipoproteina B Siero	**3260**	**immunonefelometrico**	**3 gg**	**SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL	Maschi: 45 - 138	Femmine: 51 - 128

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
APPENDICE - APPENDICECTOMIA AP-APPENDICE	**IN10002**		**4 gg**	**ANATOMIA PATOLOGICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Aptoglobina Siero	**131**	**immunonefelometrico**	**3 gg**	**SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL	30 - 200	

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
aPTT (Tempo di Tromboplastina Parziale) Plasma Citrato	**017**	**Coagulativo**	**1-2 gg**	**ANALISI**

VALORI DI RIFERIMENTO

Tempo*	sec.	
Ratio	Ratio	0,80 - 1,20

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ARGENTO Sierico Sangue Inter EDTA	7371	assorbimento atomico	18-19 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

	µg/L	< 0,6

ARGENTO Urine Fine Turno Urine F.T.	7370	assorbimento atomico	20-21 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

	µg/L	Esposti: non proposti

ARGENTO Urine Inizio Turno Urine I.T.	737	assorbimento atomico	20-21 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

	µg/L	Esposti: non proposti

ARSENICO Urine 24 ore Urine 24h	7433	ICP-MS	10-11 gg	ALTA SPECIALISTICA SERVICE

VALORI DI RIFERIMENTO

	µg/24h	Limiti Per la popolazione generale e per i soggetti esposti non sono presenti in letteratura valori di riferimento e valori correlabili con l´esposizione

ARSENICO Urine Fine Turno Urine F.T.	7432	ICP-MS	10-11 gg	ALTA SPECIALISTICA SERVICE

VALORI DI RIFERIMENTO

	µg/L	Non esposti: fino a 10 Esposti F.S.L.: fino a 35 (ACGIH 2021) Possibili interferenze alimentari: <350

ARSENICO Urine Inizio Turno Urine I.T.	7431	ICP-MS	10-11 gg	ALTA SPECIALISTICA SERVICE

VALORI DI RIFERIMENTO

	µg/L	Non esposti: fino a 10 Esposti F.S.L.: fino a 35 (ACGIH 2021) Possibili interferenze alimentari: <350

ARTICOLAZ. - BIOPSIA ARTICOLAZIONI AP-ARTICOLAZ.	IN10004		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ARTICOLAZ. - BIOPSIA DA DISCO INTERVERTEBRALE AP-ARTICOLAZ.	IN10005		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO
Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ARTICOLAZ. - BIOPSIA DA DISCO INTERVERTEBRALE (NEOPLASIA) AP-ARTICOLAZ.	IN10006		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO
Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ARTICOLAZ. - BIOPSIA per malattia di Dupuytren o di Quervain AP-ARTICOLAZ.	IN10007		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO
Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ARTICOLAZ. - BIOPSIA SINOVIALE, BIOPSIA TENDINEA AP-ARTICOLAZ.	IN10008		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO
Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ARTICOLAZ. - ESCISSIONE NEOFORMAZIONE SINOVIA AP-ARTICOLAZ.	IN10009		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO
Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ARTICOLAZ. - MENISCECTOMIA POST-TRAUMATICA AP-ARTICOLAZ.	IN10010		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO
Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ARTICOLAZ. ASPORTAZIONE DI NEOFORMAZIONE (ARTICOLAZIONI) AP-ARTICOLAZ.	IN10003		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO
Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ARTO INFERIORE - AMPUTAZIONE AP-ARTO INFERIORE	IN10011		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO
Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ARTO INFERIORE - AMPUTAZIONE (PER NEOPLASIA) AP-ARTO INFERIORE	IN10012		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO
Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ARTO SUPERIORE - AMPUTAZIONE AP-ARTO SUPERIORE	IN10013		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO
Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ARTO SUPERIORE - AMPUTAZIONE (PER NEOPLASIA) AP-ARTO SUPERIORE	IN10014		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO
Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

AST (GOT) Siero	2900	IFCC 37° C	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

U/L	< 34

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Atrofia Muscolare Spinale - SMA Carrier Test (test postnatale) Sangue Inter EDTA	GENE026		20-21 gg	GENETICA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Azotemia (Urea) Siero	210	ENZIMATICO UV	1-2 gg	ANALISI
VALORI DI RIFERIMENTO				
mg/dL 19 - 49				
Azoturia (Urine 24 h) Urine 24h	211	ENZIMATICO UV	1-2 gg	ANALISI
VALORI DI RIFERIMENTO				
g/24h 12,0 - 20,0				
Azoturia su campione estemporaneo Urine Estempor.	2112	ENZIMATICO UV	1-2 gg	ANALISI
VALORI DI RIFERIMENTO				
mg/dL				
B 2 Microglobulina Siero	1309	IMMUNOTURBIDIMETRIA	1-2 gg	ANALISI
VALORI DI RIFERIMENTO				
mg/L 0,7 - 2,3				
B 2 Microglobulina 24h Urine 24h	13091	CHEMILUMINESCENZA	7-8 gg	ALTA SPECIALISTICA
VALORI DI RIFERIMENTO				
µg/24 h < 400				
Barbiturici matrice pilifera - Valenza Medico Legale Matrice Pilifera	1084	LC-MS-MS	30 gg	TOSSICOLOGIA
Il sabato è da escludere dal conteggio dei 10 giorni di refertazione. Per lesecuzione di questo esame è necessario inviare i campioni con catena di custodia. Per ulteriori chiarimenti contattare il laboratorio.				
VALORI DI RIFERIMENTO				
Barbiturici matrice urinaria - Valenza clinica Urine	6670	immunoenzimatico	1-2 gg	TOSSICOLOGIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Negativo (Cut off: 300 ng/mL)				

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Barbiturici matrice urinaria - Valenza Legale Urine	**6672**	**immunoenzimatico**	**1-2 gg**	**TOSSICOLOGIA**

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo (Cut off: 300 ng/mL)

Barbiturici test di conferma su urine Urine	**6345**		**17-18 gg**	**TOSSICOLOGIA**

VALORI DI RIFERIMENTO

Bario Urinario F.T. Urine F.T.	**7810**	**assorbimento atomico**	**16-17 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/g crea Popolazione Generale: < 15,0

Bario Urinario I.T. Urine I.T.	**781**	**assorbimento atomico**	**16-17 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/g crea Popolazione Generale: < 15,0

Benzene Ematico Sangue Inter EDTA	**7661**	**gascromatografico**	**10-11 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

UTILIZZARE PROVETTA BD TAPPO VERDE (LITIO EPARINA) PER TEST EMATICI (TIPOLOGIA VACUTAINER) **SERVICE**

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/dL < 5

Benzene Urine Fine Turno Urine F.T.	**7660**	**gascromatografico**	**10-11 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

Utilizzare provetta specifica di tipologia no vacutainer (cod. FL19627)

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L Popolazione Generale <1,45

Benzene Urine Inizio Turno Urine I.T.	**766**	**gascromatografico**	**10-11 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

Utilizzare provetta specifica di tipologia no vacutainer (cod. FL19627)

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L Popolazione Generale: < 1.45

Benzodiazepine Matrice Pilifera Valenza Clinica Matrice Pilifera	**1567CL**	**LC-MS-MS**	**30 gg**	**TOSSICOLOGIA**

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Benzodiazepine matrice pilifera-valenza legale Matrice Pilifera	1567	LC-MS-MS	30 gg	TOSSICOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Benzodiazepine matrice urinaria - Valenza Clinica Urine	6691CL	Immunocromatografico	1-2 gg	TOSSICOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo (Cut off: 300 ng/mL)

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Benzodiazepine matrice urinaria - Valenza Legale Urine	6691	Immunocromatografico	1-2 gg	TOSSICOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo (Cut off: 200 ng/mL)

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Benzodiazepine test di conferma Urine	1566	LC-MS-MS	8-9 gg	TOSSICOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
BERILLIO Urine Fine Turno Urine F.T.	1448	ICP-MS	10-11 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Berillio Urinario/ Creatinina F.T.	µg/g crea	Popolazione Generale: < 0,7 Soggetti Esposti: Valore limite non proposto
Ut-Berillio	µg/l	

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
BERILLIO Urine Inizio Turno Urine I.T.	1449	ICP-MS	10-11 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Berillio Urinario/ Creatinina urine I.T.	µg/g crea	Popolazione Generale: < 0,7 Soggetti Esposti: Valore limite non proposto
Ut-Berillio	µg/l	

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Beta Fibrinogeno Sangue Inter EDTA	GENE089		20-21 gg	GENETICA

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
BHCG Plasmatica Siero	**6180**	**CLIA**	**1-2 gg**	**ANALISI**

VALORI DI RIFERIMENTO

	mUI/mL	Non in gravidanza: < 10 In gravidanza: 2 - 4 sett. 39,1 - 8388 5 - 6 sett. 861 - 88769 6 - 8 sett. 8536 - 218085 8 -10 sett. 18700 - 244467 10-12 sett. 23143 - 181899 13-27 sett. 6303 - 97171

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Bicarbonati Siero	**2400**	**Potenziometria ionoselettiva**	**3 gg**	**TOSSICOLOGIA**

Provetta dedicata e tappata

VALORI DI RIFERIMENTO

	mmol/L	22,0 - 29,0

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Bilirubinemia Frazionata Siero	**281**	**COLORIMETRICO**	**1-2 gg**	**ANALISI**

VALORI DI RIFERIMENTO

BILIRUBINA TOTALE	mg/dL	0,20 - 1,20
BILIRUBINA DIRETTA	mg/dL	< 0,50
BILIRUBINA INDIRETTA	mg/dL	0,15 - 0,80

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Bilirubinemia Totale Siero	**280**	**COLORIMETRICO**	**1-2 gg**	**ANALISI**

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/dL	0,20 - 1,20

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Bi-test Kit Specifico	**GENE009**		**20-21 gg**	**GENETICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
BOCCA - BIOPSIA CAVO ORALE AP-BOCCA	**IN10015**		**4 gg**	**ANATOMIA PATOLOGICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
BOCCA - BIOPSIA CAVO ORALE ESCISSIONE/NEOFORMAZIONE AP-BOCCA	IN10016		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
BOCCA - BIOPSIA LINGUA AP-BOCCA	IN10093		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
BOCCA - EMIGLOSSECTOMIA AP-BOCCA	IN10017	microscopico	4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
BOCCA - RESEZIONE CUNEIFORME LINGUA AP-BOCCA	IN10094		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
BORRELIA BURGDOFERI DNA Sangue Inter EDTA	1548	REAL TIME PCR	22-23 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Materiale :
Borrelia Burgdoferi : Non rilevato

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
BORRELIA IgG TEST DI CONFERMA Siero	1194	WESTERN BLOT	14-15 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
BRAF - Ricerca di Mutazioni Gene BRAF <multi materiale>	BRAF	BRAFM-1_3	15 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

BRCA1 e 2 reflex Ricerca mutazioni e microriarrangamenti Sangue Inter EDTA	GENE071		30-31 gg	GENETICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Breath Test al Sorbitolo (Lettura + kit) Kit Specifico	BRESOR	Infrarosso	10-12 gg	BREATHTEST

VALORI DI RIFERIMENTO

Breath Test Fruttosio (Lettura + Kit) Kit Specifico	BREFRU	Infrarosso	2-3 gg	BREATHTEST

Per la corretta esecuzione e per non alterare il risultato del test occorre seguire le istruzioni di seguito riportate:
- Non assumere fermenti lattici o lassativi nei 3 giorni precedenti l'esame;
- Dalla mezzanotte precedente al test non mangiare e non fumare. Presentarsi quindi a digiuno la mattina dell'esame. Si può assumere acqua non gasata.

Durante l'effettuazione del test, il paziente, per non alterare la composizione dell'aria espirata, dovrà rispettare le seguenti indicazioni:
- non mangiare
- non fumare
- evitare di allontanarsi dal laboratorio e comunque di eseguire qualsiasi attività fisica
- è possibile bere acqua naturale (non gasata) in modiche quantità

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Breath Test Glucosio (Lettura + Kit) Kit Specifico	BREGLU	Infrarosso	2-3 gg	BREATHTEST

VALORI DI RIFERIMENTO

Breath Test Lattosio (Lettura + Kit) Kit Specifico	2239	Infrarosso	2-3 gg	BREATHTEST

Per la corretta esecuzione e per non alterare il risultato del test occorre seguire le istruzioni di seguito riportate:
- Non assumere fermenti lattici o lassativi nei 3 giorni precedenti l'esame;
- Dalla mezzanotte precedente al test non mangiare e non fumare. Presentarsi quindi a digiuno la mattina dell'esame. Si può assumere acqua non gasata.

Durante l'effettuazione del test, il paziente, per non alterare la composizione dell'aria espirata, dovrà rispettare le seguenti indicazioni:
- non mangiare
- non fumare
- evitare di allontanarsi dal laboratorio e comunque di eseguire qualsiasi attività fisica
- è possibile bere acqua naturale (non gasata) in modiche quantità

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Breath Test Lattulosio (Lettura + Kit) Kit Specifico	2239L	Infrarosso	2-3 gg	BREATHTEST

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Breath Test urea C13 (lettura + kit) Kit Specifico	1488	Infrarosso	2-3 gg	BREATHTEST

Per ottenere un risultato preciso ed attendibile, il paziente deve: - essere a digiuno da almeno 6 ore;. - eseguire il test dopo almeno 4 settimane dalla fine della cura antibiotica specifica; - eseguire il test dopo aver sospeso per almeno 15 giorni la somministrazione di antiacidi.

VALORI DI RIFERIMENTO

BREATH TEST PYLORI
< 4,0 DOB NEGATIVO
>= 4,0 DOB POSITIVO

ESITO:

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Buprenorfina matrice pilifera - Valenza clinica Matrice Pilifera	1081CL	LC-MS-MS	30 gg	TOSSICOLOGIA

Il sabato è da escludere dal conteggio dei 10 giorni di refertazione.
Eseguire il prelievo secondo procedura ed inviare i campioni con catena di custodia.
Per ulteriori chiarimenti contattare il laboratorio.

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Buprenorfina matrice pilifera - Valenza Medico Legale Matrice Pilifera	1081	LC-MS-MS	30 gg	TOSSICOLOGIA

Il sabato è da escludere dal conteggio dei 10 giorni di refertazione. Per l'esecuzione di questo esame è necessario inviare i campioni con catena di custodia.
Per ulteriori chiarimenti contattare il laboratorio.

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Buprenorfina matrice urinaria - Valenza clinica Urine	848CL	Immunocromatografico	1-2 gg	TOSSICOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo (Cut off: 10 ng/mL)

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Buprenorfina matrice urinaria - Valenza Legale Urine	848	Immunocromatografico	1-2 gg	TOSSICOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo (Cut off: 10 ng/mL)

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Buprenorfina test di conferma su urine Urine	6346	LC-MS-MS	8-9 gg	TOSSICOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
CA 125 Siero	6510	CLIA	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL < 30,2

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
CA 15-3 Siero	6512	CLIA	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL	Inf. a 24	

CA 19-9 (GICA) Siero	6511	CLIA	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL	< 37,0	

CA 50 Siero	6518	CLIA	7-8 gg	SPECIALISTICA

Risposta dopo 48 h

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL	< 25	

CA 72-4 Siero	6517	CHEMILUMINESCENZA	8 gg	SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL	< 6,9	

Cadmio ematico Sangue Intero Eparinato	7131	ICP-MS	10-11 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L	Esposizione a Cadmio e Composti Inorganici: < 5.00 (ACGIH 2021)	

CADMIO Urine 24 ore Urine 24h	7132	ICP-MS	10-11 gg	ALTA SPECIALISTICA

ACCETTARE CONTESTUALMENTE AL CODICE 790 CREATININA URINE INIZIO TURNO

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/24h	<= 10	

CADMIO Urine Fine Turno (C) Urine F.T.	71309	ICP-MS	10-11 gg	ALTA SPECIALISTICA

ACCETTARE CONTESTUALMENTE AL CODICE 791 CREATININA URINE FINE TURNO

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/g crea	Esposizione a Cadmio e Composti Inorganici: < 5,00 (ACGIH 2024)	

CADMIO Urine Inizio Turno (C) Urine I.T.	7139	ICP-MS	10-11 gg	ALTA SPECIALISTICA

ACCETTARE CONTESTUALMENTE AL CODICE 790 CREATININA URINE INIZIO TURNO

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/g crea	Esposizione a Cadmio e Composti Inorganici: < 5,00 (ACGIH 2024)	

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Calcemia (Ca) Siero	244	COLORIMETRICO	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/dL	8,3 - 10,6

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Calcio Ionizzato Siero	250	Potenziometria ionoselettiva	3 gg	TOSSICOLOGIA

Inviare campioni in provetta primaria dedicata, non aliquotati

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/dL	3,25 - 5,25

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
CALCIO URINARIO SU CAMPIONE ESTEMPORANEO Urine Estempor.	2540	COLORIMETRIA	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/mg creat	6 mesi - <12 mesi: 0,03 – 0,81 12 mesi - <24 mesi: 0,03 - 0,56 24 mesi - <3 anni : 0,02 – 0,50 3 anni - <7 anni : 0,02 - 0,30 7 anni - <18 anni: 0,04 - 0,70 Adulti: 0,05 – 0,30

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Calcitonina Siero congelato	6410	CLIA	5 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

	pg/mL	Maschi: < 14,30 Femmine: < 9,82

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
CALCIURIA (Ca) (Urine 24 h) Urine 24h	254	COLORIMETRICO	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/24h	100 - 300

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Calprotectina fecale Feci	843	IMMUNOTURBIDIMETRICO	1-2 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

CALPROTECTINA FECALE		Negativa
	µg/g feci	< 50,0

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
CANDIDA ALBICANS IgG Siero	1050	IFA	8-9 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

	Titolo	< 1:128 assenti

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Cannabinoidi matrice pilifera - Valenza Clinica Matrice Pilifera	1082CL	LC-MS-MS	30 gg	TOSSICOLOGIA

Il sabato è da escludere dal conteggio dei 10 giorni di refertazione.
Eseguire il prelievo secondo procedura ed inviare i campioni con catena di custodia.
Per ulteriori chiarimenti contattare il laboratorio.

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Cannabinoidi matrice pilifera - Valenza Medico Legale Matrice Pilifera	1082	LC-MS-MS	30 gg	TOSSICOLOGIA

Il sabato è da escludere dal conteggio dei 10 giorni di refertazione. Per l'esecuzione di questo esame è necessario inviare i campioni con catena di custodia.
Per ulteriori chiarimenti contattare il laboratorio.

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Cannabinoidi matrice urinaria - Valenza clinica Urine	667CL	immunoenzimatico	1-2 gg	TOSSICOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Cannabinoidi matrice urinaria
Interpretaizone — Negativo (Cut off: 50 ng/mL)

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Cannabinoidi matrice urinaria - Valenza Legale Urine	667	immunoenzimatico	1-2 gg	TOSSICOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo (Cut off: 50 ng/mL)

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Cannabinoidi test di conferma su urine Urine	6347		20-21 gg	TOSSICOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Capacità detossificante Materiale Vario	60171		7 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi allegato

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Carbamazepina (Tegretol) Siero Cerba	674	TURBIDIMETRICO	1-2 gg	TOSSICOLOGIA SERVICE

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/mL — 4 - 12 Intervallo terapeutico
> 12 Concentrazione tossica

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Carbossiemoglobina Sangue intero Li-Eparina Cerba	720	SPETTROFOTOMETRICO	3 gg	ALTA SPECIALISTICA SERVICE

VALORI DI RIFERIMENTO

% — Soggetti professionalmente esposti:
< 3,5

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Carcinoma Cellule Squamose (S.C.C. o T.A.4) Siero	117	Elettrochemiluminescenza	7-8 gg	SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

	ng/mL	< 2,0

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Cariotipo (su liquido amniotico o CVS) Liquido Amniotico o CVS	GENE007		20-21 gg	GENETICA

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Cariotipo su sangue periferico Sangue intero Li-Eparina	1423	MICROSCOPICO	30-31 gg	GENETICA

VALORI DI RIFERIMENTO

		Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
CATECOLAMINE plasmatiche Plasma EDTA congelato	7870	cromatografia liquida	10 gg	TOSSICOLOGIA

Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

VALORI DI RIFERIMENTO

ADRENALINA	ng/L	10 - 199
NORADRENALINA	ng/L	78 - 521

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Catecolamine Urinarie Urine 24h Acidificate	787	HPLC	10 gg	TOSSICOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ADRENALINA	nmol/24h	5,0 - 110,0
NORADRENALINA	nmol/24h	40,0 - 600,0

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
CDT-Transferrina Carboidrato Carente (Desialata) HPLC Siero	1346	HPLC	3 gg	TOSSICOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

	Disialo % calibrat	≤ 1,7 Negativo 1,8 - 2,0 Non conclusivo > 2,0 Positivo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
CDT-Transferrina Carboidrato Carente (Desialata) HPLC Valenza Medico Legale Siero	1346ML	HPLC	3 gg	TOSSICOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

	Disialo % calibrat	≤ 1,7 Negativo 1,8 - 2,0 Non conclusivo > 2,0 Positivo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
CEA (Carcino - Embryonic Antigen) Siero	650	CLIA	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

	ng/mL	< 5,0

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Cellule Endoteliali Abs Siero	6195	immunofluorescenza	8-9 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Titolo	Assenti: < 1:40 Bassi: 1:40 - 1:80 Alti: 1:160 - 1:320 Molto Alti: > 1:320

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Ceruloplasmina Siero	140	IMMUNOTURBIDIMETRIA	3-4 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL	15 - 45

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
CERVICE - BIOPSIA CERVICE UTERINA CERVICE UTERINA	IN10021		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
CERVICE - CONIZZAZIONE DELLA CERVICE CERVICE UTERINA	IN10022		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
CERVICE - POLIPECTOMIA ENDOCERVICALE CERVICE UTERINA	IN10024		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
CERVICE UTERINA - NEWPAP - DNA: MONOSTRATO + HPV HIGH RISK Secreto Cervice Uterina	IN10266		7 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche		
Diagnosi		
Materiale:		
Ricerca di DNA di HPV:	Non Rilevato	
Genotipo di HPV identificato:		
Nota Gruppo		

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
CERVICE UTERINA - PAP TEST MONOSTRATO CERVICE UTERINA	IN10270		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche		
Esito		

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
CERVICE UTERINA - PAP TEST SINGOLO VETRINO CERVICE UTERINA	IN10269		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche		
Esito		

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
CH 50 (complementemia) Siero	1200	fotometrico	11-12 gg	ALTA SPECIALISTICA

Centrifugare rapidamente (entro 30 minuti) a temperatura ambiente, separare immediatamente dopo la centrifugazione e congelare.

VALORI DI RIFERIMENTO

	IU/ml	27,5 - 62,7

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Chimotripsina Fecale Feci	404	enzimatico	12-13 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

	U/g	Normale: > 13,2 Borderline: 6,6 - 13,2 Patologico: < 6,6

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
CHLAMYDIA TRACHOMATIS DNA Liquido Seminale, Secreto Prostatico, Tampone endocervicale, Tampone Uretrale, Urine I mitto, Materiale Vario	60010	PCR REAL TIME	1-2 gg	GENETICA

Se eseguito su tampone utilizzare quello con tappo rosa.
Se il campione è prelevato da uretra utilizzare quello con tappo arancione

VALORI DI RIFERIMENTO

Materiale :		
Esito :	Non Rilevato	

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
CICLOESANOLO Urine Fine Turno Urine F.T.	**7460**	**gascromatografico**	**16-17 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/L	Limiti Soggetti esposti a Cicloesanolo: Valori limite non previsti (ACGIH 2021) Soggetti esposti a Cicloesanone: 8 mg/L (ACGIH 2021)

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
CICLOESANOLO Urine Inizio Turno Urine I.T.	**746**	**gascromatografico**	**16-17 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/L	Limiti Soggetti esposti a Cicloesanolo: Valori limite non previsti (ACGIH 2021) Soggetti esposti a Cicloesanone: 8 mg/L (ACGIH 2021)

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Ciclosporina Sangue Inter EDTA	**694**	**Elettrochemiluminescenza**	**6-7 gg**	**SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

	ng/ml	50 - 250

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Cistatina Siero	**352**	**immunoturbidimetrico**	**11-12 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

Cistatina C	mg/L	0,61 - 0,95
Filtrazione glomerulare	mL/min/1,73 m^2	> 90 Normale 60 - 89 Lieve diminuzione con ridotto significato clinico 30 - 59 Moderata diminuzione 15 - 29 Marcata diminuzione < 15 Insufficienza renale

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Cistina Urinaria 24h Urine 24h	**365**	**HPLC**	**22-23 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

	µmol/24h	<260 Pazienti cistinurici presentano valori > 1004 umol/24h

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Citomegalovirus (CMV) DNA quantitativo Sangue Inter EDTA	**60061**	**PCR REAL TIME**	**4-5 gg**	**GENETICA**

Il sangue intero in EDTA NON va congelato ma conservato a 2-8°C

VALORI DI RIFERIMENTO

	Copie/mL	Non Rilevato

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
CITOPLASMA NEUTROFILI ABS (ANCA) Siero	**1354**	**fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP**	**3-4 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

Anti-Proteinasi 3 Abs (cANCA)	IU/mL	<2,0 Negativo 2,0 - 3,0 Dubbio > 3,0 POSITIVO
Anti-Mieloperossidasi Abs (pANCA)	IU/mL	<3,5 Negativo 3,5 - 5,0 Dubbio > 5,0 POSITIVO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Citraturia delle 24 ore Urine 24h	**7491**	**cromatografia liquida**	**10 gg**	**TOSSICOLOGIA**

VALORI DI RIFERIMENTO

	mmol/24h	2,0 - 4,0

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Clearance della Creatinina (Urine 24 h) Urine 24h	**221**	**ENZIMATICO**	**1-2 gg**	**ANALISI**

VALORI DI RIFERIMENTO

Creatinina plasmatica	mg/dL	Maschi: 0,70 - 1,30	Femmine: 0,55 - 1,02
Creatinina urinaria	mg/dL		
Clearance della creatinina	mL/min		
Diuresi	mL		

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Clearance Urea (Urine 24 h) Urine 24h	**2111**	**ENZIMATICO UV**	**1-2 gg**	**ANALISI**

VALORI DI RIFERIMENTO

Urea (azotemia) plasmatica	mg/dL	
Urea urinaria	mg/dL	
Clearance dell'urea	mL/min	40,00 - 65,00
Diuresi		

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Cloremia (Cl) Siero	**243**	**POTENZIOMETRIA INDIRETTA**	**1-2 gg**	**ANALISI**

VALORI DI RIFERIMENTO

	mmol/L	98 - 107

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Cloro urinario (Cl) (Urine 24 h) Urine 24h	**253**	**POTENZIOMETRIA INDIRETTA**	**1-2 gg**	**ANALISI**

VALORI DI RIFERIMENTO

	mmol/24h	110 - 250

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Cloro urinario (Cl) su campione estemporaneo Urine Estempor.	**2532**	**POTENZIOMETRIA INDIRETTA**	**1-2 gg**	**ANALISI**

VALORI DI RIFERIMENTO

	mmmol/L	

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE

CLOROFORMIO Urine Fine Turno | **7720** | **gascromatografico** | **16-17 gg**

Urine F.T.

ALTA SPECIALISTICA

Utilizzare una provetta da 10 mL con fondo a U, da riempire completamente, chiusa e ben tappata, da inviare tale quale al laboratorio

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/L	Non sono reperibili in bibliografia valori biologici correlabili agli indici di esposizione

CLOROFORMIO Urine Inizio Turno | **772** | **gascromatografico** | **16-17 gg**

Urine I.T.

ALTA SPECIALISTICA

Utilizzare una provetta da 10 mL con fondo a U, da riempire completamente, chiusa e ben tappata, da inviare tale quale al laboratorio

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/L	Non sono reperibili in bibliografia valori biologici correlabili agli indici di esposizione

CLORURO DI METILENE Ematico | **7452** | **gascromatografico** | **10-11 gg**

Sangue intero Li-Eparina

ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/L	< 0,50

CLORURO DI METILENE Urine Fine Turno | **7451** | **gascromatografico** | **10-11 gg**

Urine F.T.

ALTA SPECIALISTICA

Utilizzare una provetta da 10 mL con fondo a U, da riempire completamente, chiusa e ben tappata, da inviare tale quale al laboratorio

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/L	Popolazione Generale: Non rilevabile Soggetti Esposti: < 0,3 (ACGIH 2024)

CLORURO DI METILENE Urine Inizio Turno | **745** | **gascromatografico** | **10-11 gg**

Urine I.T.

ALTA SPECIALISTICA

Utilizzare una provetta da 10 mL con fondo a U, da riempire completamente, chiusa e ben tappata, da inviare tale quale al laboratorio

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/L	Popolazione Generale: non rilevabile Soggetti Esposti: < 0,3 (ACGIH 2024)

Clostridium difficile | **B5880** | **immunoenzimatico a fluorescenza** | **1-2 gg**

Feci

MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

GDH (Glutammato deidrogenasi)	Negativo
Tossina A/B	Negativo
Interpretazione	

Clostridium difficile II campione | **B58802** | **immunoenzimatico a fluorescenza** | **1-2 gg**

Feci

MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

GDH (Glutammato deidrogenasi)	Negativo
Tossina A/B	Negativo
Interpretazione	

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Clostridium difficile III campione Feci	B58803	immunoenzimatico a fluorescenza	1-2 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

GDH (Glutammato deidrogenasi)		Negativo
Tossina A/B		Negativo
Interpretazione		

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Clozapina Siero	1576	HPLC - MS	2-3 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/L	0,35 - 0,60

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Clozapina e Norclozapina Siero	357	HPLC	2-3 gg	ALTA SPECIALISTICA

Vengono determinate Clozapina e N-Desmetilclozapina.

SERVICE

VALORI DI RIFERIMENTO

Clozapina	mg/l	0,35 - 0,60
Norclozapina	mg/l	0,35 - 0,60

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
COBALTO Plasma Litio Eparina	7261	ICP-MS	10-11 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

	µg/L	Popolazione Generale: 0,1 - 0,4 Soggetti Esposti: < 1,0

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
COBALTO Urine 24 ore Urine 24h	7263	ICP-MS	10-11 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

	µg/24h	< 3

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
COBALTO Urine Fine Turno Urine F.T.	7260	ICP-MS	10-11 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

	µg/L	< 15

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
COBALTO Urine Inizio Turno Urine I.T.	726	ICP-MS	10-11 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

	µg/L	< 15

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Cocaina matrice pilifera - Valenza clinica Matrice Pilifera	1083CL	LC-MS-MS	30 gg	TOSSICOLOGIA

Il sabato è da escludere dal conteggio dei 10 giorni di refertazione.
Eseguire il prelievo secondo procedura ed inviare i campioni con catena di custodia.
Per ulteriori chiarimenti contattare il laboratorio.

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Cocaina matrice pilifera - Valenza Medico Legale Matrice Pilifera	1083	LC-MS-MS	30 gg	TOSSICOLOGIA

Il sabato è da escludere dal conteggio dei 10 giorni di refertazione. Per l'esecuzione di questo esame è necessario inviare i campioni con catena di custodia.
Per ulteriori chiarimenti contattare il laboratorio.

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Cocaina matrice urinaria - Valenza clinica Urine	669CL	immunoenzimatico	1-2 gg	TOSSICOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Cocaina matrice urinaria
Interpretazione Negativo (Cut off: 300 ng/mL)

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Cocaina matrice urinaria - Valenza Legale Urine	669	immunoenzimatico	1-2 gg	TOSSICOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo (Cut off: 300 ng/mL)

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Cocaina test di conferma su urine Urine	6348		20-21 gg	TOSSICOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
COLECISTI - COLECISTECTOMIA ALLARGATA AP-COLECISTI	IN10028		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
COLECISTI - COLECISTECTOMIA SEMPLICE AP-COLECISTI	IN10029		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
COLEDOCO - DIGER.BIOPSIA ENDOSCOPICA (SING.) AP-COLEDOCO	IN10030		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

VADEMECUM GENERALE

C

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Colesterolo HDL Siero	325	ENZIMATICO COLORIMETRICO	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL	Maschi: > 40 Valore desiderabile > 40	Femmine: > 45 Valore desiderabile > 45

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Colesterolo LDL Siero	326	ENZIMATICO COLORIMETRICO	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL	Valore desiderabile < 116

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Colesterolo totale Siero	320	ENZIMATICO COLORIMETRICO	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL	Valore desiderabile < 200

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Colinesterasi Siero	300	ENZIMATICO COLORIMETRICO	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

U/L	7.000 - 19.000

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Colinesterasi eritrocitaria Sangue Inter EDTA	3001	Ellman	10-11 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

UI/L	6156 - 12540

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Collie Eye Anomaly Materiale Vario	CEAVET		7 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi allegato

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
COLON - COLECTOMIA TOTALE AP-COLON	IN10031		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
COLON - DIGERENTE BIOPSIA ENDOSCOPICA (SING.) AP-COLON	IN10032		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO
Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
COLON - DIGERENTE BIOPSIA ORIENTATA PER RICERCA AP-COLON	IN10297		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO
Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
COLON - EMICOLECTOMIA (CON LINFOADENECTOMIA) AP-COLON	IN10033		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO
Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
COLON - POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA (SING.) AP-COLON	IN10035		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO
Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
COLON - RESEZIONE SEGMENTARIA DEL COLON AP-COLON	IN10036		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO
Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
COLTURALE FECI (E.coli PATOGENI) Feci	B593		5-6 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ESAME COLTURALE
E.coli O:157
E.coli enteropatogeno (ETEC)
Gruppo sierologico:
Identificazione
Carica
Identificazione
Carica
Identificazione
Carica
Commento

Complemento C1 inibitore (Proteina) Siero	1201	nefelometrico	12 gg	SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL 21,00 - 38,00

Complemento C1 Inibitore Attività Plasma Citr. Congelato	646	cromogenico	16-19 gg	ALTA SPECIALISTICA

Centrifugare rapidamente (entro 30 min) a temperatura ambiente, separare e congelare.

VALORI DI RIFERIMENTO

% < 70% Carenza

Complemento C1Q Siero	1202	nefelometrico	13 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL 12,0 - 19,6

Complemento-C3 Attivatore (Fattore B) Siero congelato	1203	TURBIDIMETRICO	33-34 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL 23,4 - 53,3

CONSULENZA GENETICA POST-TEST Amministrativo	GEPT		1-2 gg	GENETICA

VALORI DI RIFERIMENTO

CONSULENZA GENETICA PRE-TEST Amministrativo	GEPR		1-2 gg	GENETICA

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Consulenza nutrizionale Materiale Vario	**60164**		**7 gg**	

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi allegato

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Consulenza nutrizionale veterinaria Materiale Vario	**60163**		**7 gg**	

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi allegato

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Conta Eosinofili Sangue Inter EDTA	**008**	**CITOMETRICO IN FLUORESCENZA**	**1-2 gg**	**ANALISI**

VALORI DI RIFERIMENTO

CONTA EOSINOFILI	10^9/L	Maschi: 0 - 5 anni: 0,00 - 1,00 oltre i 6 anni: 0,00 - 0,50	Femmine: 0 - 5 anni: 0,00 - 1,00 oltre i 6 anni: 0,00 - 0,50
	%		

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Conta Leucociti Sangue Inter EDTA	**007**	**CITOMETRICO IN FLUORESCENZA**	**1 gg**	**ANALISI**

VALORI DI RIFERIMENTO

	10^9/L	Maschi: 0 - 0 anni: 5,00 - 20,00 1 - 1 anni: 6,00 - 18,00 2 - 2 anni: 6,00 - 17,00 3 - 3 anni: 5,70 - 16,00 4 - 4 anni: 5,50 - 16,00 5 - 5 anni: 5,20 - 15,00 6 - 6 anni: 5,00 - 15,00 7 - 7 anni: 4,70 - 14,00 8 - 16 anni: 4,50 - 14,00 17 - 17 anni: 4,50 - 13,00 oltre i 18 anni: 4,00 - 10,00	Femmine: 0 - 0 anni: 5,00 - 20,00 1 - 1 anni: 6,00 - 18,00 2 - 2 anni: 6,00 - 17,00 3 - 3 anni: 5,70 - 16,00 4 - 4 anni: 5,50 - 16,00 5 - 5 anni: 5,20 - 15,00 6 - 6 anni: 5,00 - 15,00 7 - 7 anni: 4,70 - 14,00 8 - 16 anni: 4,50 - 14,00 17 - 17 anni: 4,50 - 13,00 oltre i 18 anni: 4,00 - 10,00

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Coombs Diretto Sangue Inter EDTA	**021**	**Liss-Coombs**	**1 gg**	**ANALISI**

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Coombs Indiretto Sangue Inter EDTA	**022**	**Liss-Coombs**	**3-4 gg**	**ANALISI**

- prelevare il campione in provette senza gel separatore, granuli, etc...;
- separare almeno 1 ml di siero in provette con fondo a U.

Risposta dopo 48 h

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Coproporfirine urine Urine	7054	cromatografia liquida	11-12 gg	ALTA SPECIALISTICA

Porre il campione in un contenitore scuro al riparo dalla luce (es. avvolgere la provetta con carta stagnola) e conservarlo a 2 – 8 °C

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L	24 - 110

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Coproporfirine urine 24H Urine 24h	7053	cromatografia liquida	11-12 gg	ALTA SPECIALISTICA

Porre il campione in un contenitore scuro al riparo dalla luce (es. avvolgere la provetta con carta stagnola) e conservarlo a 2 – 8 °C

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/24h	24 - 110

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Cortisolo Siero	623	CHEMILUMINESCENZA	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/dL	Mattina : 5,27 - 22,45 Pomeriggio : 3,44 - 16,76

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Cortisolo salivare Saliva	6231	Elettrochemiluminescenza	7-8 gg	SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

ug/dL	<0,736

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Cortisolo urinario Urine 24h	626	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/24h	20,9 - 292,3

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Cotinina Urinaria Urine	COTI	HPLC	15-17 gg	TOSSICOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/gr	Non esposti, non fumatori: <100

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
CPK Siero	301	IFCC 37° C	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

U/L	Maschi: < 171	Femmine: < 145

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
CREATINCHINASI ISOENZIMA MB (CK-MB) Siero	428	Elettrochemiluminescenza	3 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL	Maschi: < 4,87	Femmine: < 3,61

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Creatinina urinaria su campione estemporaneo Urine Estempor.	1911	ENZIMATICO	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/dL		

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Creatininemia Siero	220	ENZIMATICO	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

CREATININEMIA	mg/dL	Maschi: 0,70 - 1,30	Femmine: 0,55 - 1,02
Stima del Filtrato Glomerulare (eGFR)	mL/min/1,73m2	> 60	

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Creatininuria (Urine 24 h) Urine 24h	232	ENZIMATICO	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

	g/24h	Maschi: 0,90 - 2,50	Femmine: 0,60 - 1,80

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Crioglobuline Siero	142	Precipitazione a freddo	3-4 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

		Assenti

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
CROMO Sierico Siero	7144	ICP-MS	10-11 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

	µg/L	< 1,0

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
CROMO Urine Fine Turno Urine F.T.	71419	ICP-MS	10-11 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

	µg/L	Popolazione generale (f.t./f.s.l.): < 0.70 (ACGIH 2024)

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
CROMO Urine Inizio Turno Urine I.T.	7149	ICP-MS	10-11 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

	µg/l	Popolazione generale (f.t./f.s.l.): < 0.70(ACGIH 2024)

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Cromogranina A Siero congelato	62121	immunometrico	10-11 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

	µg/L	< 100,0

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Cryptosporidium Ag ricerca diretta Feci	6199	Immunocromatografico	15 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Assente

CTX Plasmatico Siero congelato	351	CLIA	6 gg	SPECIALISTICA

Prelevare il campione a digiuno.
Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL

Maschi 30-50 anni: 0.029-0.585
Maschi 51-70 anni: 0.010-0.710
Maschi >70 anni: 0.145-0.850
Femmine pre menopausa: 0.039-0.575
Femmine post menopausa: 0.105-1.017

CUORE - BIOPSIA ENDOMIOCARDICA AP-CUORE	IN10037		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

CUORE - BIOPSIA MUSCOLO/BEM AP-CUORE	IN10038		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

CUORE - VALVOLA CARDIACA AP-CUORE	IN10040		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

Cupremia (Rame Sierico) Siero	248	COLORIMETRICO	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/dL

Maschi: 70,0 - 140,0

Femmine: 80,0 - 155,0

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Curva da carico di glucosio completa Plasma	1090	ENZIMATICO COLORIMETRICO	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

Glucosio basale	mg/dL	70 - 100
Glucosio dopo 30'	mg/dL	< 180
Glucosio dopo 60'	mg/dL	< 180
Glucosio dopo 90'	mg/dL	< 156
Glucosio dopo 120'	mg/dL	< 140
Glucosio dopo 150'	mg/dL	< 135
Glucosio dopo 180'	mg/dL	< 126

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Curva da carico di glucosio standard (2 punti) Plasma	1079	ENZIMATICO COLORIMETRICO	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

Glucosio basale	mg/dL	70 - 100
Glucosio dopo 120'	mg/dL	< 140

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Curva Glicemica in Gravidanza Plasma	1166	ENZIMATICO COLORIMETRICO	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

Glucosio	mg/dL	< 92
Glucosio dopo 60'	mg/dL	< 180
Glucosio dopo 120'	mg/dL	< 153

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Curva Insulinemica Siero	6533	CLIA	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

INSULINA basale	µU/mL	2,00 - 25,00
INSULINA 30'	µU/mL	
INSULINA 60'	µU/mL	
INSULINA 90'	µU/mL	
INSULINA 120'	µU/mL	
INSULINA 150'	µU/mL	
INSULINA 180'	µU/mL	

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
CUTE - BIOPSIA CUTE (PUNCH) AP-CUTE E ANNESSI	IN10042		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Es. Istolog. Cute Shave o Punch
Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
CUTE - SENO PILONIDALE AP-CUTE E ANNESSI	IN10043		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
CUTE E ANNESSI - BIOPSIA ESCISSIONALE CUTE AP-CUTE E ANNESSI	IN10044		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
CUTE E ANNESSI - ESCISSIONE ALLARGATA CUTE E/O TESSUTI MOLLI AP-CUTE E ANNESSI	IN10045		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
CYFRA 21-1 Siero	65190	elettrochemiluminescenza	1-2 gg	SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL	< 3,30	

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
DAO Test Siero	1587	ELISA	23-24 gg	ALTA SPECIALISTICA

Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

- Effettuare l'esame nelle 24-72 ore successive alla crisi di emicrania
- Rispettare il digiuno da 8 ore
- Sospendere temporaneamente la somministrazione di farmaci che possano inibire l'enzima DAO (tra cui gli antiinfiammatori, antidepressivi, diuretici, antibiotici, procinetici, mucolitici, neurolettici e altri)
- Sospendere per 24 ore gli antistaminici

La sintesi placentaria dell'enzima DAO è la causa per cui gli attacchi di emicrania diminuiscono durante la gravidanza. Per questo motivo non si consiglia l'esecuzione di tale esame in gravidanza

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL	< 3,0 Positivo 3,0 - 10,0 Dubbio > 10,0 Negativo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
D-Dimero Plasma Citrato	043	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L FEU	< 500

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Delta 4 Androstenedione Siero	**637**	**RIA**	**7 gg**	**SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

	ng/mL	Uomini: 0,30 - 3,90 Donne: Pre-menopausa: 0,40 - 3,40 Post-menopausa: 0,10 - 2,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
DENGUE Abs IgG Siero	**413**	**immunoenzimatico**	**18 gg**	**SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

	UR/ml	Negativo: <16 Dubbio: 16-22 Positivo: >=22

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Desossipiridinolina totale urine Urine	**6321**	**gascromatografico**	**11 gg**	**TOSSICOLOGIA**

Risposta dopo 24 h

VALORI DI RIFERIMENTO

	pmol/µmol creat.	Maschi: 6 - 26	Femmine: 6 - 23

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Determinazioni immunoistochimiche Istologico	**IN10313**	**IMMUNOISTOCHIMICO CON LETTURA MICROSCOPICA**	**20 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
DHEA Siero	**6360**	**ELISA**	**9-10 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

Risposta dopo 48 h

VALORI DI RIFERIMENTO

	ng/mL	Maschi: 1,8 - 12,5	Femmine: 1,3 - 9,8

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
DHEA-S Siero	**636**	**CHEMILUMINESCENZA**	**1-2 gg**	**ANALISI**

VALORI DI RIFERIMENTO

	µg/dL	Maschi: 0 - 14 anni: 16,4 - 243,7 15 - 19 anni: 44,1 - 385,9 20 - 24 anni: 237,4 - 539,9 25 - 34 anni: 166,9 - 592,9 35 - 44 anni: 139,1 - 488,4 45 - 54 anni: 135,2 - 448,6 55 - 64 anni: 48,2 - 362,8 oltre i 65 anni: 20,1 - 283,9	Femmine: 0 - 14 anni: 8,2 - 171,8 15 - 19 anni: 60,2 - 494,6 20 - 24 anni: 133,2 - 409,4 25 - 34 anni: 94,8 - 513,7 35 - 44 anni: 73,8 - 411,2 45 - 54 anni: 55,2 - 283,9 55 - 64 anni: 29,1 - 183,2 oltre i 65 anni: 33,2 - 79,1

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Diagnosi molecolare di beta talassemia - sequenziamento completo del gene HBB Sangue Inter EDTA	8424	PCR E SEQUENZIAMENTO DIRETTO	16-17 gg	GENETICA

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Digossina Siero	660	CLIA	3 gg	TOSSICOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

	ug/L	Concentrazione terapeutica <= 2,00

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Diidrotestosterone (DHT) Siero	6210	ELISA	9-10 gg	ALTA SPECIALISTICA

Risposta dopo 48 h

VALORI DI RIFERIMENTO

	pg/ml	Maschi: 1 - 9 anni: 0,0 - 86,0 10 - 14 anni: 11,0 - 876,0 15 - 18 anni: 70,0 - 1.261 19 - 99 anni: 143,0 - 842,0	Femmine: 2 - 9 anni: 0,0 - 89,0 10 - 14 anni: 22,0 - 281,0 15 - 18 anni: 63,0 - 760,0 19 - 50 anni: 0,0 - 596,0 51 - 99 anni: 0,0 - 431,0

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
DISBIOSI TEST Urine Mattino	8921	HPLC	3 gg	TOSSICOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

INDICANO	mg/g creat.	15,0 - 63,0
SCATOLO	µg/L	< 10,0

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Distrofia Miotonica - Malattia di Steinert (DMPK) Sangue Inter EDTA	GENE028		20-21 gg	GENETICA

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
DITO - AMPUTAZIONE DITO AP-DITO	IN10046		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
DITO - AMPUTAZIONE DITO (PER NEOPLASIA) AP-DITO	IN10047		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
DNA - HBV Quantitativo Siero - Plasma	60091	PCR REAL TIME	4 gg	GENETICA

Per l'esecuzione delle analisi di biologia molecolare per HCV, HBV e HIV non è più possibile richiedere più di una analisi per lo stesso campione (esempio: se per 1 paziente si richiede HCV qualitativo e HCV quantitativo, è necessario inviare 2 campioni anche se la richiesta può essere fatta sulla stessa accettazione)

VALORI DI RIFERIMENTO

HBV-DNA Quantitativo		Non rilevato
Carica virale	UI/mL	

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
DNA - Microdelezioni Cromosoma Y Sangue Inter EDTA	60150	PCR E ANALISI DI FRAMMENTI	18-19 gg	GENETICA

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
DNA - Trichomonas vaginalis Liquido Seminale, Secreto Prostatico, Tampone endocervicale, Tampone Uretrale, Urine I mitto, Materiale Vario	TRICO	PCR REAL TIME	4-5 gg	GENETICA

Se eseguito su tampone utilizzare quello con tappo rosa.
Se il campione è prelevato da uretra utilizzare quello con tappo arancione

VALORI DI RIFERIMENTO

Materiale :	
Esito :	Non Rilevato

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
DNA Macro-match Materiale Vario	60139		7 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi allegato

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Dog Degenerative Myelopathy Materiale Vario	SOD1		7 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi allegato

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Dog Exercise Induced Collapse Materiale Vario	EIC		7 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi allegato

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Dopamina plasmatica Plasma EDTA congelato	**7890**	**cromatografia liquida**	**10-11 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

VALORI DI RIFERIMENTO

	ng/L	< 52

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Dopamina urinaria Urine 24h Acidificate	**789**	**HPLC**	**10 gg**	**TOSSICOLOGIA**

La raccolta del campione di urine delle 24 h prevede l' acidificazione delle urine stesse. L' acidificazione viene effettuata versando nel recipiente, prima di iniziare la raccolta, circa 5 ml di HCl 5 M per ogni litro di urina (4 cucchiai di acido muriatico del commercio). Prelevare un'aliquota di circa 10 ml di urina delle 24 h acidificata con l'indicazione della diuresi totale ed inviare in apposito contenitore di trasporto.
Risposta dopo 24 h.

VALORI DI RIFERIMENTO

	nmol/24h	400,0 - 2.600

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Dosaggio C3/C3C Siero	**1209**	**immunonefelometrico**	**1-2 gg**	**ANALISI**

VALORI DI RIFERIMENTO

	g/L	0,90 - 1,80

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Dosaggio C4/C4C Siero	**12099**	**immunonefelometrico**	**1-2 gg**	**ANALISI**

VALORI DI RIFERIMENTO

	g/L	0,10 - 0,40

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Dosaggio catene leggere libere Kappa e Lambda sieriche Siero	**1667**	**immunonefelometrico**	**1-2 gg**	**SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

Catene leggere libere Kappa	mg/L	6,70 - 22,40
Catene leggere libere Lambda	mg/L	8,30 - 27,00
Rapporto Kappa/Lambda		0,31 - 1,56

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
DUODENO/ILEO - DIGERENTE/ BIOPSIA ENDOSCOPICA (SING.) AP-DUODENO	**IN10048**		**4 gg**	**ANATOMIA PATOLOGICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
DUODENO/ILEO-DIGERENTE/ POLIPECTOMIA (SING.) AP-DUODENO	**IN10049**		**4 gg**	**ANATOMIA PATOLOGICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Echinococco IgG Siero	**1158**	**ELISA**	**8-9 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

Index	< 0,8 Negativo 0,8 - 1,2 Dubbio > 1,2 Positivo

Ecstasy (MDMA) matrice urinaria - Valenza clinica Urine	**6338CL**	**immunoenzimatico**	**1-2 gg**	**TOSSICOLOGIA**

VALORI DI RIFERIMENTO

Ecstasy (MDMA) matrice urinaria	
Interpetazione	Negativo (Cut off: 500 ng/mL)

Ecstasy (MDMA) matrice urinaria - Valenza Legale Urine	**6338**	**immunoenzimatico**	**1-2 gg**	**TOSSICOLOGIA**

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo (Cut off: 500 ng/mL)

Efficienza metabolismo Caffeina Materiale Vario	**60133**		**7 gg**	

VALORI DI RIFERIMENTO

Efficienza metabolismo Caffeina	
Valore 1	
valore 2	
Informativa	Vedi allegato

Efficienza metabolismo Vitamina D e Folati Materiale Vario	**60128**		**7 gg**	

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi allegato

Efficienza recupero atletico Materiale Vario	**60169**		**7 gg**	

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi allegato

Elastasi 1 Pancreatica Fecale Feci	**520**	**CHEMILUMINESCENZA**	**10-11 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/g di feci	> 200 (Normale) 100 - 199,99 (Insufficienza da lieve a moderata) < 100 (Insufficienza grave)

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Elettroforesi Siero	260	Elettroforesi Capillare	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO		
Proteine totali	g/dL	5,7 - 8,2
Tracciato		
Rapporto albumina/globuline		1,10 - 2,40
Albumina	%	55,8 - 66,1
Alfa 1	%	2,9 - 4,9
Alfa 2	%	7,1 - 11,8
Beta 1	%	4,7 - 7,2
Beta 2	%	3,2 - 6,5
Gamma globuline	%	11,1 - 18,8
Banda paraproteinemica 1	g/dL	
Banda paraproteinemica 1	%	
Banda paraproteinemica 2	g/dL	
Banda paraproteinemica 2	%	

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Elettroforesi Hb Sang.Edta Cerba	039	elettroforetico	4 gg	TOSSICOLOGIA SERVICE

VALORI DI RIFERIMENTO		
Emoglobina A1	%	Giorni 0-30 15-40 Mesi 1-2 38-70 Mesi 3-4 65-90 Mesi 5-7 83-95 Mesi 8-12 89-96 Anni 1-2 94-97 Anni >2 96,7-97,8
Emoglobina A2	%	2,2 - 3,2
Emoglobina F	%	Giorni 0-30 58-84 Mesi 1-2 29-61 Mesi 3-4 9-40 Mesi 5-7 3-15 Mesi 8-12 1-10 Anni 1-2 0,5-3 Anni >2 <=0,5
Emoglobine Anomale	%	
Osservazioni	%	

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Elettroforesi Proteine Urinarie Urine 24h	265	elettroforetico	5 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO		
Albumina	%	100,0
Alfa 1 Globuline	%	0,0
Alfa 2 Globuline	%	0,0
Beta Globuline	%	0,0
Gamma Globuline	%	0,0
Proteine totali	g/24h	< 0,15
Commento		

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
EMILARINGECTOMIA AP-LARINGE	IN10079		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO
Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Emocoltura per batteri aerobi Sangue	B527		6-7 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Sede del prelievo
Ora del prelievo
Tempo di positivizzazione
Esame Batterioscopico
COLTURALE
Identificazione - 1 -
Identificazione - 2 -
Identificazione - 3 -
Commento

Emocoltura per batteri aerobi II Campione Sangue	B5272		6-7 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Sede del prelievo
Ora del prelievo
Tempo di positivizzazione
Esame Batterioscopico
COLTURALE
Identificazione - 1 -
Identificazione - 2 -
Identificazione - 3 -
Commento

Emocoltura per batteri aerobi III Campione Sangue	B5273		6-7 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Sede del prelievo
Ora del prelievo
Tempo di positivizzazione
Esame Batterioscopico
COLTURALE
Identificazione - 1 -
Identificazione - 2 -
Identificazione - 3 -
Commento

Emocoltura per batteri anaerobi Sangue	B5681		5-6 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Sede del prelievo
Ora del prelievo
Tempo di positivizzazione
Esame Batterioscopico
COLTURALE
Identificazione - 1 -
Identificazione - 2 -
Identificazione - 3 -
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Emocoltura per batteri anaerobi II Campione Sangue	B56812		5-6 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Sede del prelievo
Ora del prelievo
Tempo di positivizzazione
Esame Batterioscopico
COLTURALE
Identificazione - 1 -
Identificazione - 2 -
Identificazione - 3 -
Commento

Emocoltura per batteri anaerobi III Campione Sangue	B56813		5-6 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Sede del prelievo
Ora del prelievo
Tempo di positivizzazione
Esame Batterioscopico
COLTURALE
Identificazione - 1 -
Identificazione - 2 -
Identificazione - 3 -
Commento

Emocromatosi (3 mutazioni) - HFE (C282Y, S65C, H63D) Sangue Inter EDTA	GENE031		20-21 gg	GENETICA

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Emocromo a caldo Sangue Inter EDTA	**EMFR**	**FOTO/IMPEDENZIOMETRICO-CITOMETRICO IN FLUORESCENZA**	**1-2 gg**	**ANALISI**

VALORI DI RIFERIMENTO

Globuli Bianchi (WBC)	10^9/L	Maschi: 0 - 0 anni: 5,00 - 20,00 1 - 1 anni: 6,00 - 18,00 2 - 2 anni: 6,00 - 17,00 3 - 3 anni: 5,70 - 16,00 4 - 4 anni: 5,50 - 16,00 5 - 5 anni: 5,20 - 15,00 6 - 6 anni: 5,00 - 15,00 7 - 7 anni: 4,70 - 14,00 8 - 17 anni: 4,50 - 12,00 oltre i 18 anni: 4,00 - 10,00	Femmine: 0 - 0 anni: 5,00 - 20,00 1 - 1 anni: 6,00 - 18,00 2 - 2 anni: 6,00 - 17,00 3 - 3 anni: 5,70 - 16,00 4 - 4 anni: 5,50 - 16,00 5 - 5 anni: 5,20 - 15,00 6 - 6 anni: 5,00 - 15,00 7 - 7 anni: 4,70 - 14,00 8 - 17 anni: 4,50 - 12,00 oltre i 18 anni: 4,00 - 10,00
Globuli Rossi (RBC)	10^12/L	Maschi: 0 - 0 anni: 3,10 - 5,00 1 - 1 anni: 3,70 - 5,00 2 - 5 anni: 3,90 - 5,00 6 - 11 anni: 4,00 - 5,00 12 - 17 anni: 4,50 - 5,00 oltre i 18 anni: 4,20 - 6,10	Femmine: 0 - 0 anni: 3,10 - 5,00 1 - 1 anni: 3,70 - 5,00 2 - 5 anni: 3,90 - 5,00 6 - 11 anni: 4,00 - 5,00 12 - 17 anni: 4,10 - 5,00 oltre i 18 anni: 4,00 - 5,40
Emoglobina (Hgb)	g/dL	Maschi: 0 - 0 anni: 9,5 - 14,0 1 - 1 anni: 10,5 - 14,0 2 - 5 anni: 11,5 - 14,0 6 - 11 anni: 11,5 - 16,0 12 - 17 anni: 13,0 - 16,0 oltre i 18 anni: 14,0 - 17,0	Femmine: 0 - 0 anni: 9,5 - 14,0 1 - 1 anni: 10,5 - 14,0 2 - 5 anni: 11,5 - 14,0 6 - 11 anni: 11,5 - 16,0 12 - 17 anni: 12,0 - 16,0 oltre i 18 anni: 12,0 - 15,0
Ematocrito (Hct)	%	Maschi: 0 - 0 anni: 29,0 - 41,0 1 - 1 anni: 33,0 - 39,0 2 - 5 anni: 34,0 - 40,0 6 - 11 anni: 35,0 - 45,0 12 - 17 anni: 37,0 - 49,0 oltre i 18 anni: 42,0 - 51,0	Femmine: 0 - 0 anni: 29,0 - 41,0 1 - 1 anni: 33,0 - 39,0 2 - 5 anni: 34,0 - 40,0 6 - 11 anni: 35,0 - 45,0 oltre i 12 anni: 37,0 - 46,0
Volume corpuscolare medio (MCV)	fL	Maschi: 0 - 0 anni: 74,0 - 106,0 1 - 1 anni: 70,0 - 86,0 2 - 5 anni: 75,0 - 87,0 6 - 11 anni: 77,0 - 95,0 12 - 17 anni: 78,0 - 98,0 oltre i 18 anni: 80,0 - 95,0	Femmine: 0 - 0 anni: 74,0 - 106,0 1 - 1 anni: 70,0 - 86,0 2 - 5 anni: 75,0 - 87,0 6 - 11 anni: 77,0 - 95,0 12 - 17 anni: 78,0 - 100,0 oltre i 18 anni: 81,0 - 95,0
Contenuto medio Hgb (MCH)	pg	Maschi: 0 - 0 anni: 25 - 35 1 - 1 anni: 23 - 31 2 - 5 anni: 24 - 30 6 - 11 anni: 25 - 33 oltre i 12 anni: 27 - 31	Femmine: 0 - 0 anni: 25 - 35 1 - 1 anni: 23 - 31 2 - 5 anni: 24 - 30 6 - 11 anni: 25 - 33 oltre i 12 anni: 27 - 31
Concentrazione media Hgb (MCHC)	g/dL	Maschi: 0 - 1 anni: 30 - 36 oltre i 2 anni: 32 - 36	Femmine: 0 - 1 anni: 30 - 36 oltre i 2 anni: 32 - 36
Distribuzione volume eritrocitario (RDW)	%	Maschi: 11,5 - 15,5	Femmine: 11,5 - 15,5
Piastrine (PLT)	10^9/L	130 - 400	
Volume piastrinico medio (MPV)	fL	Maschi: 7,4 - 10,4	Femmine: 7,4 - 10,4
Granulociti Neutrofili	%	40 - 70	
Linfociti	%	20 - 50	
Monociti	%	2 - 12	
Granulociti Eosinofili	%	1 - 6	
Granulociti Basofili	%	0 - 2	
Promielociti	%		
Mielociti	%		
Metamielociti	%		
Blasti	%		
Plasmacellule	%		
Prolinfociti	%		
Linfociti Granulati	%		

ANALITA			COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Granulociti Neutrofili	10^9/L	Maschi: 0 - 0 anni: 1,00 - 9,00 1 - 5 anni: 1,50 - 9,00 6 - 8 anni: 1,50 - 8,00 9 - 9 anni: 1,70 - 8,00 10 - 17 anni: 1,80 - 8,00 oltre i 18 anni: 1,60 - 7,50			Femmine: 0 - 0 anni: 1,00 - 9,00 1 - 5 anni: 1,50 - 9,00 6 - 8 anni: 1,50 - 8,00 9 - 9 anni: 1,70 - 8,00 10 - 17 anni: 1,80 - 8,00 oltre i 18 anni: 1,60 - 7,50	
Linfociti	10^9/L	Maschi: 0 - 0 anni: 3,00 - 16,00 1 - 1 anni: 4,00 - 11,00 2 - 3 anni: 3,00 - 9,00 4 - 5 anni: 2,00 - 8,00 6 - 13 anni: 1,50 - 7,00 14 - 15 anni: 1,40 - 6,00 16 - 17 anni: 1,20 - 5,00 oltre i 18 anni: 0,80 - 4,50			Femmine: 0 - 0 anni: 3,00 - 16,00 1 - 1 anni: 4,00 - 11,00 2 - 3 anni: 3,00 - 9,00 4 - 5 anni: 2,00 - 8,00 6 - 13 anni: 1,50 - 7,00 14 - 15 anni: 1,40 - 6,00 16 - 17 anni: 1,20 - 5,00 oltre i 18 anni: 0,80 - 4,50	
Monociti	10^9/L	0,08 - 1,00				
Granulociti Eosinofili	10^9/L	Maschi: 0 - 5 anni: 0,00 - 1,00 oltre i 6 anni: 0,04 - 0,60			Femmine: 0 - 5 anni: 0,00 - 1,00 oltre i 6 anni: 0,04 - 0,60	
Granulociti Basofili	10^9/L	0,00 - 0,15				
COMMENTO						

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Emocromocitometrico completo Sangue Inter EDTA	0014	FOTO/IMPEDENZIOMETRICO-CITOMETRICO IN FLUORESCENZA	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

Globuli Bianchi (WBC)	10^9/L	Maschi: 0 - 0 anni: 5,00 - 20,00 1 - 1 anni: 6,00 - 18,00 2 - 2 anni: 6,00 - 17,00 3 - 3 anni: 5,70 - 16,00 4 - 4 anni: 5,50 - 16,00 5 - 5 anni: 5,20 - 15,00 6 - 6 anni: 5,00 - 15,00 7 - 7 anni: 4,70 - 14,00 8 - 17 anni: 4,50 - 12,00 oltre i 18 anni: 4,00 - 10,00	Femmine: 0 - 0 anni: 5,00 - 20,00 1 - 1 anni: 6,00 - 18,00 2 - 2 anni: 6,00 - 17,00 3 - 3 anni: 5,70 - 16,00 4 - 4 anni: 5,50 - 16,00 5 - 5 anni: 5,20 - 15,00 6 - 6 anni: 5,00 - 15,00 7 - 7 anni: 4,70 - 14,00 8 - 17 anni: 4,50 - 12,00 oltre i 18 anni: 4,00 - 10,00
Globuli Rossi (RBC)	10^12/L	Maschi: 0 - 0 anni: 3,10 - 5,00 1 - 1 anni: 3,70 - 5,00 2 - 5 anni: 3,90 - 5,00 6 - 11 anni: 4,00 - 5,00 12 - 17 anni: 4,50 - 5,00 oltre i 18 anni: 4,20 - 6,10	Femmine: 0 - 0 anni: 3,10 - 5,00 1 - 1 anni: 3,70 - 5,00 2 - 5 anni: 3,90 - 5,00 6 - 11 anni: 4,00 - 5,00 12 - 17 anni: 4,10 - 5,00 oltre i 18 anni: 4,00 - 5,40
Emoglobina (Hgb)	g/dL	Maschi: 0 - 0 anni: 9,5 - 14,0 1 - 1 anni: 10,5 - 14,0 2 - 5 anni: 11,5 - 14,0 6 - 11 anni: 11,5 - 16,0 12 - 17 anni: 13,0 - 16,0 oltre i 18 anni: 14,0 - 17,0	Femmine: 0 - 0 anni: 9,5 - 14,0 1 - 1 anni: 10,5 - 14,0 2 - 5 anni: 11,5 - 14,0 6 - 11 anni: 11,5 - 16,0 12 - 17 anni: 12,0 - 16,0 oltre i 18 anni: 12,0 - 15,0
Ematocrito (Hct)	%	Maschi: 0 - 0 anni: 29,0 - 41,0 1 - 1 anni: 33,0 - 39,0 2 - 5 anni: 34,0 - 40,0 6 - 11 anni: 35,0 - 45,0 12 - 17 anni: 37,0 - 49,0 oltre i 18 anni: 42,0 - 51,0	Femmine: 0 - 0 anni: 29,0 - 41,0 1 - 1 anni: 33,0 - 39,0 2 - 5 anni: 34,0 - 40,0 6 - 11 anni: 35,0 - 45,0 oltre i 12 anni: 37,0 - 46,0
Volume corpuscolare medio (MCV)	fL	Maschi: 0 - 0 anni: 74,0 - 106,0 1 - 1 anni: 70,0 - 86,0 2 - 5 anni: 75,0 - 87,0 6 - 11 anni: 77,0 - 95,0 12 - 17 anni: 78,0 - 98,0 oltre i 18 anni: 80,0 - 95,0	Femmine: 0 - 0 anni: 74,0 - 106,0 1 - 1 anni: 70,0 - 86,0 2 - 5 anni: 75,0 - 87,0 6 - 11 anni: 77,0 - 95,0 12 - 17 anni: 78,0 - 100,0 oltre i 18 anni: 81,0 - 95,0
Contenuto medio Hgb (MCH)	pg	Maschi: 0 - 0 anni: 25 - 35 1 - 1 anni: 23 - 31 2 - 5 anni: 24 - 30 6 - 11 anni: 25 - 33 oltre i 12 anni: 27 - 31	Femmine: 0 - 0 anni: 25 - 35 1 - 1 anni: 23 - 31 2 - 5 anni: 24 - 30 6 - 11 anni: 25 - 33 oltre i 12 anni: 27 - 31
Concentrazione media Hgb (MCHC)	g/dL	Maschi: 0 - 1 anni: 30 - 36 oltre i 2 anni: 32 - 36	Femmine: 0 - 1 anni: 30 - 36 oltre i 2 anni: 32 - 36
Distribuzione volume eritrocitario (RDW)	%	Maschi: 11,5 - 15,5	Femmine: 11,5 - 15,5
Piastrine (PLT)	10^9/L	140 - 450	
Volume piastrinico medio (MPV)	fL	Maschi: 7,0 - 13,0	Femmine: 7,0 - 13,0
Granulociti Neutrofili	%	40 - 70	
Linfociti	%	20 - 50	
Monociti	%	2 - 12	
Granulociti Eosinofili	%	1 - 6	
Granulociti Basofili	%	0 - 2	
Promielociti	%		
Mielociti	%		
Metamielociti	%		
Blasti	%		
Plasmacellule	%		
Prolinfociti	%		
Linfociti Granulati	%		
Linfociti Forma Variante	%		
Hairy Cell	%		
Promonociti	%		

ANALITA			COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Linfociti Atipici	%					
Linfociti Reattivi	%					
Sezary Cell	%					
Granulociti Neutrofili	10^9/L	Maschi: 0 - 0 anni: 1,00 - 9,00 1 - 5 anni: 1,50 - 9,00 6 - 8 anni: 1,50 - 8,00 9 - 9 anni: 1,70 - 8,00 10 - 17 anni: 1,80 - 8,00 oltre i 18 anni: 1,60 - 7,50			Femmine: 0 - 0 anni: 1,00 - 9,00 1 - 5 anni: 1,50 - 9,00 6 - 8 anni: 1,50 - 8,00 9 - 9 anni: 1,70 - 8,00 10 - 17 anni: 1,80 - 8,00 oltre i 18 anni: 1,60 - 7,50	
Linfociti	10^9/L	Maschi: 0 - 0 anni: 3,00 - 16,00 1 - 1 anni: 4,00 - 11,00 2 - 3 anni: 3,00 - 9,00 4 - 5 anni: 2,00 - 8,00 6 - 13 anni: 1,50 - 7,00 14 - 15 anni: 1,40 - 6,00 16 - 17 anni: 1,20 - 5,00 oltre i 18 anni: 0,80 - 4,50			Femmine: 0 - 0 anni: 3,00 - 16,00 1 - 1 anni: 4,00 - 11,00 2 - 3 anni: 3,00 - 9,00 4 - 5 anni: 2,00 - 8,00 6 - 13 anni: 1,50 - 7,00 14 - 15 anni: 1,40 - 6,00 16 - 17 anni: 1,20 - 5,00 oltre i 18 anni: 0,80 - 4,50	
Monociti	10^9/L	0,08 - 1,00				
Granulociti Eosinofili	10^9/L	Maschi: 0 - 5 anni: 0,00 - 1,00 oltre i 6 anni: 0,04 - 0,60			Femmine: 0 - 5 anni: 0,00 - 1,00 oltre i 6 anni: 0,04 - 0,60	
Granulociti Basofili	10^9/L	0,00 - 0,15				
Promielociti	10^9/L					
Mielociti	10^9/L					
Metamielociti	10^9/L					
Blasti	10^9/L					
Plasmacellule	10^9/L					
Prolinfociti	10^9/L					
Linfociti Granulati	10^9/L					
Linfociti Forma Variante	10^9/L					
Hairy Cell	10^9/L					
Promonociti	10^9/L					
Linfociti Atipici	10^9/L					
Linfociti Reattivi	10^9/L					
Sezary Cell	10^9/L					
COMMENTO						

Emoglobina Glicata | **205** | **IMMUNOCHIMICO** | **1-3 gg**

Sangue Inter EDTA

ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

EMOGLOBINA GLICATA (HbA1c)	%Hb Tot	Valore desiderabile: < 5,7 Livello decisionale per la diagnosi di diabete: > 6,4 Obiettivo terapeutico: < 7,0
	mmoli/mol	Valore desiderabile: < 40 Livello decisionale per la diagnosi di diabete: > 46 Obiettivo terapeutico: < 53

ENA Screening | **ENA** | **CLIA** | **9 gg**

Siero

Autoimmunità

VALORI DI RIFERIMENTO

	Indice	< 1,0 Negativo 1,0 - 1,5 Dubbio > 1,5 Positivo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Epstein-Barr Virus (EBV) DNA quantitativo Sangue Inter EDTA	4604DNA	PCR REAL TIME	4-5 gg	GENETICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Copie/mL Non Rilevato

Eritropoietina Siero	644	CLIA	5 gg	SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

mIU/ml 2,6 - 19,0

ES. CITOLOGICO ESPETTORATO PER RICERCA CELLULE NEOPLASTICHE 1° CAMP Citologico espettorato	IN10281	microscopico	20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche

Esito

ES. CITOLOGICO ESPETTORATO PER RICERCA CELLULE NEOPLASTICHE 2° CAMP Citologico espettorato	IN10282	microscopico	20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche

Esito

ES. CITOLOGICO ESPETTORATO PER RICERCA CELLULE NEOPLASTICHE 3° CAMP Citologico espettorato	IN10283	microscopico	20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche

Esito

ES. CITOLOGICO URINE PER RICERCA CELLULE NEOPLASTICHE 1° CAMP AP-URINA	IN10278	microscopico	20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche

Esito

ES. CITOLOGICO URINE PER RICERCA CELLULE NEOPLASTICHE 2° CAMP AP-URINA	IN10279	microscopico	20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche

Esito

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ES. CITOLOGICO URINE PER RICERCA CELLULE NEOPLASTICHE 3° CAMP AP-URINA	IN10280	microscopico	20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche

Esito

Esame Chimico del Calcolo Renale Calcolo	810		1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

ESAME CHIMICO DEL CALCOLO RENALE

Altro da annotare

Esame Chimico Fisico completo delle Feci Feci	517	MICROSCOPIA	1-2 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ASPETTO

COLORE

CONSISTENZA

FILAMENTI DI MUCO

REAZIONE pH

FIBRE MUSCOLARI

FIBRE VEGETALI

ACIDI GRASSI

GRASSI NEUTRI

GRANULI DI AMIDO

Commento

Esame Chimico Fisico completo delle Feci II campione Feci	5172	MICROSCOPIA	1-2 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ASPETTO

COLORE

CONSISTENZA

FILAMENTI DI MUCO

REAZIONE pH

FIBRE MUSCOLARI

FIBRE VEGETALI

ACIDI GRASSI

GRASSI NEUTRI

GRANULI DI AMIDO

Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame Chimico Fisico completo delle Feci III campione Feci	5173	MICROSCOPIA	1-2 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ASPETTO
COLORE
CONSISTENZA
FILAMENTI DI MUCO
REAZIONE pH
FIBRE MUSCOLARI
FIBRE VEGETALI
ACIDI GRASSI
GRASSI NEUTRI
GRANULI DI AMIDO
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame Colturale Batteri Anaerobi Liquido Pleurico Liquido Pleurico	B9008		11-12 gg	MICROBIOLOGIA

Utilizzare flacone emocoltura anaerobi

VALORI DI RIFERIMENTO

Sede del prelievo:
COLTURALE
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame Colturale Batteri Anaerobi Pus/Essudato Pus (PUS1)	B9009		11-12 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Sede del prelievo:
COLTURALE
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame colturale broncoaspirato Aspirato Bronchiale (BAS)	B567		4-5 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

COLTURALE
Identificazione

Carica batterica
Identificazione
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame colturale del sangue (Emocoltura) pediatrico con Antibiogramma Sangue	B528		6-7 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Sede del prelievo
Ora del prelievo
Tempo di positivizzazione
Esame Batterioscopico
COLTURALE
Identificazione - 1 -
Identificazione - 2 -
Identificazione - 3 -
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame colturale delle feci (Coprocoltura) con Antibiogramma Feci	B501		5-6 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ESAME COLTURALE
Salmonella spp
Shigella spp
Campylobacter spp
Identificazione
Carica
Identificazione 2
Carica
Identificazione 3
Carica
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame colturale delle feci (Coprocoltura) II Campione con Antibiogramma Feci	B5012		5-6 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ESAME COLTURALE
Salmonella spp
Shigella spp
Campylobacter spp
Identificazione
Carica
Identificazione 2
Carica
Identificazione 3
Carica
Commento

Esame colturale delle feci (Coprocoltura) III Campione con Antibiogramma Feci	B5013		5-6 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ESAME COLTURALE
Salmonella spp
Shigella spp
Campylobacter spp
Identificazione
Carica
Identificazione 2
Carica
Identificazione 3
Carica
Commento

Esame Colturale dermatofiti ed altri miceti Matrice Pilifera, Squame cutanee, Unghie, Materiale Vario	B9013		20-21 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Esame Colturale Endometrio (batteri aerobi e miceti) Endometrio	B9016		5-6 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Sede del prelievo:
COLTURALE
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame Colturale Endometrio (batteri anaerobi) Endometrio	B9017		6-7 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Sede del prelievo:
COLTURALE
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame colturale espettorato con Antibiogramma Espettorato	B507		7 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

COLTURALE
Identificazione
Carica
Commento
identificazione
Carica
commento
Identificazione
Carica
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame colturale espettorato II campione con Antibiogramma Espettorato	B50701		5-6 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

COLTURALE
Identificazione
Carica
Commento
identificazione
Carica
commento
Identificazione
Carica
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame colturale espettorato III campione con Antibiogramma Espettorato	B50702		5-6 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Cellule epiteliali:
Polimorfonucleati:
Muco:
Commento:
COLTURALE
Identificazione
Carica
Commento
identificazione
Carica
commento
Identificazione
Carica
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame colturale liquidi cavitari con Antibiogramma <multi materiale>	B5037		5-6 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Materiale :
COLTURALE
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame Colturale Liquido Ascitico (aerobi) Liquido Ascitico	B9006		5-6 gg	MICROBIOLOGIA

1 provetta con anticoagulante + flacone emocoltura aerobi

VALORI DI RIFERIMENTO

Sede del prelievo:
COLTURALE
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame Colturale Liquido Drenaggio (aerobi)	**B9005**		**5-6 gg**	
Liquido da Drenaggio				
				MICROBIOLOGIA

1 provetta con anticoagulante + flacone emocoltura aerobi

VALORI DI RIFERIMENTO

Sede del prelievo:
COLTURALE
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame Colturale Liquido Pleurico (aerobi)	**B9004**		**5-6 gg**	
Liquido Pleurico				
				MICROBIOLOGIA

1 provetta con anticoagulante + flacone emocoltura aerobi

VALORI DI RIFERIMENTO

Sede del prelievo:
COLTURALE
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame colturale liquido seminale con Antibiogramma	**B543**		**5-6 gg**	
Liquido Seminale				
				MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ESAME COLTURALE
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame colturale liquido sinoviale aerobi Liquido Sinoviale	549		15 gg	MICROBIOLOGIA

1 provetta con antigoagulante + flaconi emocoltura

VALORI DI RIFERIMENTO

COLTURALE
Identificazione
Carica
Commento
identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame Colturale Materiale Intraoperatorio (aerobi) Materiale intraoperatorio	B9003		5-6 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Sede del prelievo:
COLTURALE
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame Colturale Materiale Intraoperatorio (anaerobi) Materiale intraoperatorio	B9003AN		11-12 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Sede del prelievo:
COLTURALE
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame Colturale Materiale Vario Materiale Vario	1032		5-6 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Sede del prelievo:
COLTURALE
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame colturale materiale vario aerobi con Antibiogramma Materiale Vario	547		5-6 gg	MICROBIOLOGIA

1 provetta con antigoagulante + flaconi emocoltura

VALORI DI RIFERIMENTO

Sede del prelievo:
COLTURALE
Identificazione
Carica
Commento
identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame colturale materiale vario anaerobi con Antibiogramma Materiale Vario	548		11-12 gg	MICROBIOLOGIA

Utilizzare flacone emocoltura anaerobi

VALORI DI RIFERIMENTO

Sede del prelievo:
COLTURALE
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame colturale protesi/pezzi anatomici con Antibiogramma <multi materiale>	**B5110**		**10-11 gg**	**MICROBIOLOGIA**

Inserire il frammento in provetta tappo rosa

VALORI DI RIFERIMENTO

Materiale :
COLTURALE
Identificazione

Carica batterica
Identificazione
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame Colturale Punta Catetere (aerobi) Punta Catetere	**B9002**		**5-6 gg**	**MICROBIOLOGIA**

VALORI DI RIFERIMENTO

Sede del prelievo:
COLTURALE
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame colturale pus con Antibiogramma Pus (PUS1)	**B548**		**5-6 gg**	**MICROBIOLOGIA**

VALORI DI RIFERIMENTO

COLTURALE
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame colturale secreto prostatico con Antibiogramma Secreto Prostatico	B553		5-6 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

COLTURALE

Identificazione
Carica batterica
Commento
Identificazione
Carica batterica
Commento
Identificazione
Carica batterica
Commento

Esame colturale tampone anale Secreto Anale	B5048		5-6 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

COLTURALE
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento

Esame colturale tampone auricolare con Antibiogramma Secreto Auricolare	B564		5-6 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

COLTURALE
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame colturale tampone auricolare destro con Antibiogramma Secreto Auricolare	B564D		5-6 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

COLTURALE
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame colturale tampone auricolare sinistro con Antibiogramma Secreto Auricolare	B564S		5-6 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

COLTURALE
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame colturale tampone cavo orale con Antibiogramma Secreto Orale	B5031		5-6 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

COLTURALE
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame colturale tampone cervicale con Antibiogramma Materiale Vario	B531		5-6 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Sede del prelievo:
COLTURALE
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame colturale tampone congiuntivale con Antibiogramma Secreto Congiuntivale	B565		5-6 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ESAME COLTURALE
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione 2
Carica
Commento
Identificazione 3
Carica
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame colturale tampone congiuntivale destro con Antibiogramma Secreto Congiuntivale	B565D		5-6 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ESAME COLTURALE
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione 2
Carica
Commento
Identificazione 3
Carica
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame colturale tampone congiuntivale sinistro con Antibiogramma Secreto Congiuntivale	B565S		5-6 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ESAME COLTURALE
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione 2
Carica
Commento
Identificazione 3
Carica
Commneto

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame colturale tampone cutaneo con Antibiogramma Epidermide	B5070		5-6 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ESAME COLTURALE
Sede del prelievo:
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame colturale tampone cutaneo II Campione con Antibiogramma Epidermide	B5072		5-6 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ESAME COLTURALE
Sede del prelievo:
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame colturale tampone cutaneo III Campione con Antibiogramma	**B5073**		**5-6 gg**	

Epidermide

MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ESAME COLTURALE
Sede del prelievo:
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento

Esame colturale TAMPONE DA FERITA + Antibiogramma	**B515**		**5-6 gg**	

Materiale Vario

MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ESAME COLTURALE
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento

Esame colturale tampone da lesione	**B5692**		**5-6 gg**	

Materiale Vario

MICROBIOLOGIA

Utilizzare tampone Tappo Rosa per il prelievo del campione

VALORI DI RIFERIMENTO

COLTURALE
Identificazione
Carica batterica
Commento
Identificazione
Carica batterica
Commento
Identificazione
Carica batterica
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame Colturale Tampone Faringeo per Streptococcus Pyogenes con Antibiogramma Secreto faringeo	B503		5-6 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

COLTURALE
Streptococcus pyogenes (beta emolitico di gruppo A)
Identificazione
Carica

Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame colturale tampone linguale con Antibiogramma Secreto Linguale	B5032		5-6 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

COLTURALE
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame colturale tampone nasale con Antibiogramma Secreto Nasale	B573		5-6 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

COLTURALE
Streptococchi beta emolitici (pyogenes gruppo A, C, G)
Staphylococcus aureus
Miceti lievitiformi
Branhamella catarrhalis
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame colturale tampone nasale destro Secreto Nasale	B573D		5-6 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

COLTURALE
Streptococchi beta emolitici (pyogenes gruppo A, C, G)
Staphylococcus aureus
Miceti lievitiformi
Branhamella catarrhalis
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame colturale tampone nasale sinistro Secreto Nasale	B573S		5-6 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

COLTURALE
Streptococchi beta emolitici (pyogenes gruppo A, C, G)
Staphylococcus aureus
Miceti lievitiformi
Branhamella catarrhalis
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame colturale tampone rettale germi comuni Secreto rettale	B5045		5-6 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

COLTURALE
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame colturale tampone solco balano prepuziale con Antibiogramma Secreto Balano	B504		5-6 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

COLTURALE
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento

Esame colturale tampone ulcera Materiale Vario	B512		5-6 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

COLTURALE
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento

Esame colturale tampone ulcera II campione Materiale Vario	B5122		5-6 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

COLTURALE
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame colturale tampone ulcera III campione Materiale Vario	B5123		5-6 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

COLTURALE
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame colturale tampone uretrale con Antibiogramma Materiale Vario	B533		5-6 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ESAME COLTURALE
Identificazione
Carica
Beta lattamasi:
Commento
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame colturale tampone vaginale con Antibiogramma Secreto Vaginale	B505		7 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Esame microscopico :
Cellule epiteliali
Leucociti
Emazie
Lattobacilli
Flora microbica
Clue cells
Miceti
ESAME COLTURALE
Ph vaginale
Flora Lattobacillare
Streptococcus agalactiae
Enterobacteriaceae (in particolare Escherichia coli)
Miceti lievitiformi (in particolare Candida spp)
Gardnerella vaginalis
Mobiluncus spp
Identificazione:
Carica
Commento
Identificazione:
Carica
Commento
Identificazione:
Carica
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame colturale tampone vulvare con Antibiogramma Secreto Vulvare	B5040		5-6 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

COLTURALE
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento

Esame Colturale Urina I mitto Urine I mitto	B9001		5-6 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Sostanze antibatteriche
Leucociti in carica significativa
ESAME COLTURALE
Identificazione
Carica batterica
Commento
Identificazione
Crica batterica
Commento
Identificazione
Carica batterica
Commento

Esame colturale urine con Antibiogramma Urine	B500		5-6 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Sostanze antibatteriche
Leucociti in carica significativa
ESAME COLTURALE
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione 2
Carica
Commento
Identificazione 3
Carica
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame colturale urine II Campione con Antibiogramma Urine	B5002		5-6 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Sostanze antibatteriche
Leucociti in carica significativa
ESAME COLTURALE
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione 2
Carica
Commento
Identificazione 3
Carica
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame colturale urine III Campione con Antibiogramma Urine	B5003		5-6 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Sostanze antibatteriche
Leucociti in carica significativa
ESAME COLTURALE
Identificazione
Carica batterica
Commento
Identificazione 2
Carica batterica
Commento
Identificazione 3
Carica batterica
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame colturale Liquido Sinoviale anaerobi Liquido Sinoviale	B9012		15-16 gg	MICROBIOLOGIA

Utilizzare flacone emocoltura anaerobi

VALORI DI RIFERIMENTO

COLTURALE
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento
Identificazione
Carica
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE

Esame di Base del Liquido Seminale (Spermiogramma)

B543B | 1-2 gg

Liquido Seminale

GENETICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Volume	mL	> 1,4
pH		> 7,2
Viscosità		NORMALE
Aspetto		AVORIO OPALESCENTE
Fluidificazione		COMPLETA
Concentrazione	milioni/mL	> 16
Numero/eiaculato	milioni	> 39
Normali	%	> 4
Motilità progressiva (rapida + lenta)	%	
Motilità non progressiva	%	
Immobili	%	
Motilità totale (P+NP)	%	> 42
Vitalità (colorazione sopravitale Eosina Y)	%	> 58
MAR TEST (Mixed Antiglobulin Reaction Test)	%	< 50% Negativo
ESAME CITOLOGICO		
Esame del Citocentrifugato		
Conclusioni:		

Esame Feci x Parassiti

514 | MICROSCOPIA | 6 gg

Feci

MICROBIOLOGIA

SERVICE

VALORI DI RIFERIMENTO

Protozoi	Assenti
Identificazione:	
Elminti	Assenti
Identificazione:	
Commento	

Esame Feci x Parassiti (AMEBA)

514A | MICROSCOPIA | 1-2 gg

Feci

MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Ameba spp :	Assente
Identificazione:	
Commento	

Esame Feci x Parassiti II Campione

5141 | MICROSCOPIA | 6 gg

Feci

MICROBIOLOGIA

SERVICE

VALORI DI RIFERIMENTO

Protozoi	Assenti
Identificazione:	
Elminti	Assenti
Identificazione:	
Commento	

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE

Esame Feci x Parassiti III Campione | 5142 | MICROSCOPIA | 1-6 gg

Feci

MICROBIOLOGIA

SERVICE

VALORI DI RIFERIMENTO

Protozoi	Assenti	
Identificazione:		
Elminti	Assenti	
Identificazione:		
Commento		

Esame liquido sinoviale | 549M | | 1-2 gg

Liquido Sinoviale

ANALISI

1 provetta con antigoagulante + flaconi emocoltura

VALORI DI RIFERIMENTO

Aspetto	
Colore	
Leucociti totali	10^9/L
Leucociti polimorfonucleati	%
Leucociti mononucleati	%
Commento	

Esame microscopico di sangue periferico | 4599 | MICROSCOPICO | 1-2 gg

Sangue Inter EDTA

ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

Granulociti Neutrofili	%
Linfociti	%
Monociti	%
Granulociti Eosinofili	%
Granulociti Basofili	%
Promielociti	%
Linfociti atipici	%
Mielociti	%
Metamielociti	%
Blasti	%
COMMENTO	

Esame microscopico Espettorato | B507M | Microscopico | 1 gg

Espettorato

MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Polimorfonucleati
Cellule epiteliali
Muco
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame microscopico Tampone Uretrale Secreto Uretrale	B5100U		1-2 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Cellule epiteliali
Leucociti
Emazie
Flora microbica
Flora lattobacillare
Cocchi Gram positivi
Cocchi Gram negativi
Bacilli Gram positivi
Bacilli Gram negativi
Spore
Ife
Clue cells
pH

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame microscopico Tampone Vaginale Secreto Vaginale	B5100V		6 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

pH
Cellule epiteliali
Leucociti
Emazie
Lattobacilli
Cocchi Gram positivi
Cocchi Gram negativi
Bacilli Gram positivi
Bacilli Gram negativi
Miceti
Spore
Ife
Clue Cells (Gardnerella vaginalis)
Mobiluncus spp

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame molecolare tampone rettale per CRE (Enterobatteri resistenti ai Carbapenemi) Secreto rettale	B5041		5-6 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Real Time PCR
Identificazione
Carica

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame Urine Urine	**400**	**Riflettanza**	**1-2 gg**	

ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO		
COLORE		
ASPETTO		
PESO SPECIFICO		1.005 - 1.030
pH		5,0 - 7,5
PROTEINE	mg/dl	< 15,0
GLUCOSIO	mg/dl	< 10,0
CORPI CHETONICI	mg/dl	< 2
BILIRUBINA	mg/dl	< 0,2
EMOGLOBINA	mg/dl	< 0,03
UROBILINOGENO	mg/dl	< 1,0
NITRITI	mg/dl	Assenti
ESTERASI LEUCOCITARIA		Assente
Albumina/Creatinina	mg/g creat	< 30
Proteine/Creatinina	g/g creat.	< 0,15
SEDIMENTO		
EMAZIE	/µL	< 15
LEUCOCITI	/µL	< 20
CELLULE EPITELIALI SQUAMOSE	/µL	< 20
BATTERI		
CRISTALLI		
MUCO		
OSSERVAZIONI MICROSCOPICHE		
NOTE		
CELLULE TRANSIZIONALI		
CELLULE RENALI TUBULARI		
CILINDRI LALINI		
CILINDRI LALINI GRANULOSI		
CILINDRI GRANULOSI		
CRISTALLI DI OSSALATO DI CALCIO		
CRISTALLI DI ACIDO URICO		
CRISTALLI DI TRIPLOFOSFATO DI CALCIO		
FOSFATI AMORFI		
URATI AMORFI		
MICETI		
IFE MICOTICHE		

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame Urine Completo II Camp. Urine	401	Riflettanza	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

COLORE		
ASPETTO		
PESO SPECIFICO		1.005 - 1.030
pH		5,5 - 7,5
ALBUMINA	mg/dl	< 15,0
GLUCOSIO	mg/dl	< 10,0
CORPI CHETONICI	mg/dl	< 2
BILIRUBINA	mg/dl	< 0,2
EMOGLOBINA	mg/dl	< 0,03
UROBILINOGENO	mg/dl	< 1,0
NITRITI	mg/dl	Assenti
ESTERASI LEUCOCITARIA	leu/µl	Assente
SEDIMENTO		
EMAZIE		< 15
LEUCOCITI		< 20
CELLULE EPITELIALI SQUAMOSE		< 20
BATTERI		
CRISTALLI		
MUCO		
NOTE		
OSSERVAZIONI MICROSCOPICHE		

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame Urine Completo III Camp. Urine	402	Riflettanza	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

COLORE		
ASPETTO		
PESO SPECIFICO		1.005 - 1.030
pH		5,5 - 7,5
ALBUMINA	mg/dl	< 15,0
GLUCOSIO	mg/dl	< 10,0
CORPI CHETONICI	mg/dl	< 2
BILIRUBINA	mg/dl	< 0,2
EMOGLOBINA	mg/dl	< 0,03
UROBILINOGENO	mg/dl	< 1,0
NITRITI	mg/dl	Assenti
ESTERASI LEUCOCITARIA	leu/µl	Assente
SEDIMENTO		
EMAZIE		< 15
LEUCOCITI		< 20
CELLULE EPITELIALI SQUAMOSE		< 20
BATTERI		
CRISTALLI		
MUCO		
NOTE		
OSSERVAZIONI MICROSCOPICHE		

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ESOFAGO - DIGERENTE BIOPSIA ENDOSCOPICA (SING.) AP-ESOFAGO	IN10050		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ESOFAGO - POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA (SING.) AP-ESOFAGO	IN10051		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ESOFAGO - RESEZIONE ESOFAGO-GASTRICA AP-ESOFAGO	IN10052		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ESOFAGO - RESEZIONE SEGMENTARIA DELL'ESOFAGO AP-ESOFAGO	IN10053		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Estriolo Libero Siero	6111	CLIA	3 gg	SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL	Sett. grav. Da 14 a 20: 0,28 - 3,14 Sett. grav. Da 20 a 31: 2,75 - 10,9 Sett. grav. Da 31 a 37: 3,62 - 14,6 Sett. grav. Da 37 a 40: 6,20 - 22,4	

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Estrone Siero	634	RIA	20 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

pg/ml	Maschi: 10 - 60	Femmine: 20 - 300 Fase luteinica: 60 - 300 Fase follicolare: 20 - 120 Menopausa: <= 60

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Etanolo Siero	7341	ENZIMATICO COLORIMETRICO	1-2 gg	TOSSICOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/dL	< 50,0

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ETANOLO Ematico con valenza medico legale Siero	1664	ENZIMATICO COLORIMETRICO	1-2 gg	TOSSICOLOGIA

Congelare il campione se trascorrono più di 24 ore dal prelievo.

VALORI DI RIFERIMENTO

	g/L	< 0,50 (Art. 186 Codice della Strada) < 0,05 (Art. 186bis Codice della Strada - norme neo patentati)

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Etanolo test di conferma su urine Urine	6349		22-23 gg	TOSSICOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Etanolo urinario - valenza clinica Urine	734	ENZIMATICO	1-2 gg	TOSSICOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/dL	< 50,0

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Etanolo urinario - Valenza legale Urine	7342	ENZIMATICO	1-2 gg	TOSSICOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/dL	< 50,0

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Etilglucoronide matrice pilifera - Valenza Medico Legale Matrice Pilifera	1087	LC-MS-MS	30 gg	TOSSICOLOGIA

Il sabato è da escludere dal conteggio dei 10 giorni di refertazione

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Etilglucoronide matrice urinaria - valenza clinica Urine	1505	immunoenzimatico	7 gg	TOSSICOLOGIA

Se il campione è inviato dopo le 24 ore dalla raccolta congelare a – 20 °C.
Il sabato è da escludere dal conteggio dei 10 giorni di refertazione

VALORI DI RIFERIMENTO

		Negativo (Cut off: 500 ng/mL)

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Etilglucoronide su matrice pilifera (valenza clinica) Matrice Pilifera	1550CL	immunoenzimatico	30 gg	TOSSICOLOGIA

Il sabato è da escludere dal conteggio dei 10 giorni di refertazione

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Etilglucoronide su matrice urinaria Test di conferma Urine	1088	LC-MS-MS	13-14 gg	TOSSICOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Etilglucuronide matrice urinaria - Valenza Legale Urine	1506	immunoenzimatico	1-2 gg	TOSSICOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo (Cut off: 500 ng/mL)

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Etosuccimide Siec Cerba	672	HPLC	3 gg	TOSSICOLOGIA SERVICE

Il prelievo non può essere effettuato in provette con gel separatore in quanto quest'ultimo può modificare il dosaggio del farmaco nel siero e quindi il risultato dell'esame effettuato con queste provette non è attendibile.

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L — Soggetti in terapia : 40,0 - 100,0

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Everolimus Sangue Inter EDTA	6340	Cromat. Liq. - Spettrometria di massa	7-8 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/l — Valori terapeutici in funzione del tipo di trapianto e farmaci associati

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
FARINGE - EMIFARINGECTOMIA AP-FARINGE	IN10054		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
FARINGE - FARINGOLARINGECTOMIA TOTALE AP-FARINGE	IN10055		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
FARINGE - TONSILLECTOMIA PER LINFOMA AP-FARINGE	IN10056		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
FARINGE - TONSILLECTOMIA E/O ADENOIDECTOMIA AP-FARINGE	IN10057		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Fattore V Plasma Citrato	360	COAGULATIVO	15 gg	ANALISI

Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

VALORI DI RIFERIMENTO

% 70 - 130

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Fattore II Plasma Citrato	441	COAGULATIVO	15 gg	ANALISI

Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

VALORI DI RIFERIMENTO

% 70 - 120

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Fattore IX Plasma Citrato	0740	coagulometrico	15 gg	ANALISI

Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

VALORI DI RIFERIMENTO

% 70,0 - 120,0

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
FATTORE V mutazione H1299R (DNA) Sangue Inter EDTA	GENE093		20-21 gg	GENETICA

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
FATTORE V mutazione Y1702C (DNA) Sangue Inter EDTA	GENE092		20-21 gg	GENETICA

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Fattore VII Plasma Citrato	342	coagulometrico	15 gg	ANALISI

Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

VALORI DI RIFERIMENTO

% 70,0 - 120,0

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Fattore VIIIc Plasma Citrato	7620	COAGULATIVO	15 gg	ANALISI

Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

VALORI DI RIFERIMENTO

% 50 - 150

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Fattore X Plasma Citrato	**440**	**coagulometrico**	**15 gg**	**ANALISI**

Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

VALORI DI RIFERIMENTO

%	70,0 - 120,0	

Fattore XI Plasma Citrato	**0741**	**coagulometrico**	**15 gg**	**ANALISI**

Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

VALORI DI RIFERIMENTO

%	70,0 - 120,0	

Fattore XII Plasma Citrato	**0743**	**coagulometrico**	**15 gg**	**ANALISI**

Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

VALORI DI RIFERIMENTO

%	70,0 - 150,0	

Fattore XIII Plasma Citrato	**074**	**coagulometrico**	**15 gg**	**ANALISI**

Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

VALORI DI RIFERIMENTO

%	70 - 140	

Feci ricerca sangue occulto Feci	**515**	**Immunologico al lattice con lettura in turbidimetria**	**1-2 gg**	**MICROBIOLOGIA**

VALORI DI RIFERIMENTO

FECI RICERCA SANGUE OCCULTO		Negativa
	ng/mL	< 50 Negativa >= 50 e <= 200 Zona grigia > 200 Positiva

Feci ricerca sangue occulto II campione Feci	**5152**	**Immunologico al lattice con lettura in turbidimetria**	**1-2 gg**	**MICROBIOLOGIA**

VALORI DI RIFERIMENTO

FECI RICERCA SANGUE OCCULTO II CAMPIONE		Negativa
	ng/mL	< 50 Negativa >= 50 e <= 200 Zona grigia > 200 Positiva

Feci ricerca sangue occulto III campione Feci	**5153**	**Immunologico al lattice con lettura in turbidimetria**	**1-2 gg**	**MICROBIOLOGIA**

VALORI DI RIFERIMENTO

FECI RICERCA SANGUE OCCULTO III CAMPIONE		Negativa
	ng/mL	< 50 Negativa >= 50 e <= 200 Zona grigia > 200 Positiva

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
FEGATO - AGOBIOPSIA EPATICA AP-FEGATO	IN10060		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
FEGATO - BIOPSIA FEGATO AP-FEGATO	IN10061		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
FEGATO - EPATECTOMIA AP-FEGATO	IN10062		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
FEGATO - RESEZIONE SEGMENTARIA AP-FEGATO	IN10063		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Feline Polycistic Kidney Disease Materiale Vario	PKD1		7 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi allegato

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Fenitoina (Dintoina) (Difenilidantoina) Siero congelato	675	cromatografia liquida	10 gg	TOSSICOLOGIA SERVICE

Il prelievo non può essere effettuato in provette con gel separatore in quanto quest'ultimo può modificare il dosaggio del farmaco nel siero e quindi il risultato dell'esame effettuato con queste provette non è attendibile.

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/mL	10 - 20 Concentrazione terapeutica > 20 Concentrazione tossica

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
FENOLO Urine Fine Turno Urine F.T.	**7083**	**HPLC**	**6 gg**	**TOSSICOLOGIA**

VALORI DI RIFERIMENTO

FENOLO Urine/Creatinina F.T.	mg/g crea	Popolazione Generale: < 20,0 Soggetti Esposti: < 250,0 (ACGIH 2021)
Creatininuria	g/L	0,3 - 3,0
Fenolo Urinario	mg/L	

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
FENOLO Urine Inizio Turno Urine I.T.	**7082**	**HPLC**	**6 gg**	**TOSSICOLOGIA**

VALORI DI RIFERIMENTO

FENOLO Urine/Creatinina I.T.	mg/g crea	Popolazione Generale: < 20,0 Soggetti Esposti: < 250,0 (ACGIH 2021)
Creatininuria	g/L	0,3 - 3,0
Fenolo Urinario	mg/L	

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Ferritina Siero	**663**	**CHEMILUMINESCENZA**	**1-2 gg**	**ANALISI**

VALORI DI RIFERIMENTO

	ng/mL	Maschi: 22,0 - 330,0	Femmine: 10,0 - 291,0

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Ferro Urine 24h Urine 24h	**8995**	**assorbimento atomico**	**7-8 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

	µg/24h	100 - 400

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Ferro Urine Fine Turno Urine F.T.	**7242**	**assorbimento atomico**	**12-13 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

	µg/L	70 - 280

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Ferro Urine Inizio Turno Urine I.T.	**7240**	**assorbimento atomico**	**12-13 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

	µg/L	70 - 280

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
FETO - ETA' GESTAZ.ANT.ALLA 20^SETT.E/O PESO <500 AP-FETO	**IN10066**		**4 gg**	**ANATOMIA PATOLOGICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Fibrinogeno Plasma Citrato	020	Clauss	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/dL	180,0 - 400,0

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Fibrosi Cistica - Gene CFTR Screening 88 Mutazioni Sangue Inter EDTA	GENE032	Reverse Dot-Blot	9-10 gg	GENETICA

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Fibrosi Cistica - Gene CFTR Sequenziamento completo Sangue Inter EDTA	GENE035	NGS	25-27 gg	GENETICA

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
FLUORURI Urine Fine Turno Urine F.T.	75009	Potenziometria	10-11 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/L	Popolazione Generale: < 1.0 Fine Turno - Soggetti Esposti: < 3.0 (ACGIH 2021)

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
FLUORURI Urine Inizio Turno Urine I.T.	7509	POTENZIOMETRIA DIRETTA CON IONI SELETTIVI	10-11 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/L	Popolazione Generale: < 1.0 Inizio Turno - Soggetti Esposti: < 2.0 (ACGIH 2021)

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Folati (Vitamina B9) Siero	662	CHEMILUMINESCENZA	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

	ng/mL	> 2,5

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
FORMULA LEUCOCITARIA Sangue Inter EDTA	003		1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

Granulociti Neutrofili	%
Linfociti	%
Monociti	%
Granulociti Eosinofili	%
Granulociti Basofili	%
Promielociti	%
Mielociti	%
Metamielociti	%
Blasti	%
Commento	

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Fosfatasi acida prostatica (PAP) Siero	**2830**	**CHEMILUMINESCENZA**	**7 gg**	**SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL	< 2,0	

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Fosfatasi Acida Totale Siero	**283**	**spettrofotometrico**	**7-8 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

VALORI DI RIFERIMENTO

UI/L	Maschi: < 6,6	Femmine: < 6,5

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Fosfatasi Alcalina Siero	**282**	**IFCC 37° C**	**1-2 gg**	**ANALISI**

VALORI DI RIFERIMENTO

U/L	Maschi: 0 - 0 anni: 155 - 404 1 - 9 anni: 149 - 349 10 - 12 anni: 186 - 440 13 - 14 anni: 202 - 618 15 - 18 anni: 59 - 294 oltre i 19 anni: 46 - 116	Femmine: 0 - 0 anni: 155 - 404 1 - 9 anni: 149 - 349 10 - 12 anni: 186 - 440 13 - 14 anni: 76 - 419 15 - 18 anni: 54 - 143 oltre i 19 anni: 46 - 116

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Fosfatasi Alcalina Ossea Specifica Siero	**2820**	**CLIA**	**7 gg**	**SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L	4,7-27,0 Donne pre-menopausa 5,5-27,1 Donne post-menopausa	

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Fosfaturia (P) (Urine 24 h) Urine 24h	**255**	**SPETTOFOTOMETRICO UV**	**1-2 gg**	**ANALISI**

VALORI DI RIFERIMENTO

g/24h	0,40 - 1,30	

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Fosfolipidi Abs IgG Siero	**328**	**EIA**	**15 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

U/ml	< 12 Negativo 12 - 18 Dubbio > 18 Positivo	

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Fosfolipidi Abs IgM Siero	**3281**	**EIA**	**15 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

U/ml	< 12 Negativo 12 - 18 Dubbio > 18 Positivo	

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE

Fosforemia (P)
Siero

245	SPETTROFOTOMETRICO UV	1-2 gg

ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/dL	2,3 - 5,1

FOSFORO URINARIO CAMPIONE ESTEMPORANEO
Urine Estempor.

2243	SPETTOFOTOMETRICO UV	1-2 gg

ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/mg creatinina	Maschi: 0 - 0 anni: 0,30 - 5,24 1 - 1 anni: 0,30 - 3,95 2 - 2 anni: 0,30 - 3,13 3 - 6 anni: 0,30 - 2,00 7 - 17 anni: 0,30 - 0,95 oltre i 18 anni: 0,20 - 0,80	Femmine: 0 - 0 anni: 0,30 - 5,24 1 - 1 anni: 0,30 - 3,95 2 - 2 anni: 0,30 - 3,13 3 - 6 anni: 0,30 - 2,00 7 - 17 anni: 0,30 - 0,95 oltre i 18 anni: 0,20 - 0,80

Fox Test - Food Explorer
Siero

FOX		1-2 gg

ALLERGIE E INTOLLERA
SERVICE

VALORI DI RIFERIMENTO

Free Beta HCG
Siero

8970	Tecnologia Trace	5 gg

ALTA SPECIALISTICA
SERVICE

VALORI DI RIFERIMENTO

	UI/L	Screening Gravidanza: Negativo: <5 Positivo: >25 Follow-up Gravidanza: 1-10 settimana: 202 - 231000 11-15 settimana: 22536 - 234990 16-22 settimana: 8007 - 50064 23-40 settimana: 1600 - 49413 Uomini: 0 - 5

FREE PSA
Siero

65140	CLIA	1-2 gg

ANALISI

Accettabile solo contestualmente al codice 6514 PSA TOTALE

VALORI DI RIFERIMENTO

PSA Free	ng/mL	
Calcolo rapporto PSA Free / PSA Totale	%	> 23 %

Fruttosamina
Siero

2050	COLORIMETRICO	3-4 gg

ALTA SPECIALISTICA
SERVICE

VALORI DI RIFERIMENTO

	µmol/L	205,0 - 285,0

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
FSH Siero	615	CLIA	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

	mUI/mL	Maschi: 1,4 - 18,1	Femmine: Fase follicolare : 2,5 - 10,2 Gravidanza : < 0,3 Fase ovulatoria : 3,4 - 33,4 Fase luteinica : 1,5 - 9,1 Post-menopausa : 23,0 - 116,3

G.SALIVARE - AGOBIOPSIA GHIANDOLE SALIVARI AP-G.SALIVARE	IN10067		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

G.SALIVARE - ASPORTAZIONE ALLARGATA GHIANDOLA SALIVARE AP-G.SALIVARE	IN10068		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

G.SALIVARE - ASPORTAZIONE SEMPLICE GHIANDOLA SALIVARE AP-G.SALIVARE	IN10069		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

G.SALIVARE - BIOPSIA GHIANDOLA SALIVARE AP-G.SALIVARE	IN10070		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
G.SALIVARE - NODULECTOMIA GHIANDOLA SALIVARE AP-G.SALIVARE	**IN10071**		**4 gg**	**ANATOMIA PATOLOGICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

G-6-PDH Eritrocitaria Sangue Inter EDTA	**044**	**enzimatico**	**1-2 gg**	**SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

	%	Soggetti normali: <10 carente totale 10-85 Eterozigote >85 normale Alfa e beta microcitemie, Reticolocitosi >5%, Leucocitosi >20.000 WBC: <10 carente totale 10-95 eterozigote >95 normale Neonati: <10 carente totale 10-110 eterozigote >110 normale

GAMMA GT Siero	**285**	**IFCC 37° C**	**1-2 gg**	**ANALISI**

VALORI DI RIFERIMENTO

	U/L	Maschi: < 73 Femmine: < 38

Gastrina 17 Siero congelato	**655**	**CLIA**	**5 gg**	**SPECIALISTICA**

Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

VALORI DI RIFERIMENTO

	pmol/l	1,70 - 7,60

GASTROPANEL Siero congelato	**6550**	**CLIA**	**10 gg**	**SPECIALISTICA**

Per l'esecuzione del test è necessario il digiuno da almeno 8-12 ore prima del prelievo.

Centrifugare rapidamente (entro 30 min) a temperatura ambiente, separare e congelare.

VALORI DI RIFERIMENTO

Helycobacter Pylori Abs IgG	EIU	< 30,0
Gastrina - 17 basale	pmol/L	1,0 - 10,0
Pepsinogeno I	ng/mL	70 - 240
Pepsinogeno II	ng/mL	< 13,0
Rapporto PG I/PG II		> 3,0
Note		

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Gene ACE Polimorfismo in/del introne 16 Sangue Inter EDTA	GENE086		20-21 gg	GENETICA

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Gene Fattore II : ricerca della mutazione G20210A Sangue Inter EDTA	GENE090	PCR REAL TIME	4-5 gg	GENETICA

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Gene Fattore V: ricerca della mutazione G1691A (detta di Leiden) Sangue Inter EDTA	GENE091	PCR REAL TIME	4-6 gg	GENETICA

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Gene MTHFR: ricerca della mutazione C677T Sangue Inter EDTA	GENE097	PCR REAL TIME	4-6 gg	GENETICA

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Gene PAI-1 RICERCA DELLA MUTAZIONE 4G/5G Sangue Inter EDTA	1051	RFLP PCR	11-12 gg	GENETICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Gentamicina Siero	6955	immunologico	4-5 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/l — < 1, < 2, < 2,4 in relazione alla gravitÃ dellÃ´infezione

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Giardia ricerca diretta Feci	6201	Immunocromatografico	1-2 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Assente

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Glicemia Plasma	200	ENZIMATICO	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL — 70 - 99
100 - 125 alterata glicemia a digiuno

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Glicemia frazionata Plasma	202	ENZIMATICO COLORIMETRICO	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

GLUCOSIO	mg/dL	

Nota:

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Glicemia Post Prandiale Plasma	201	ENZIMATICO COLORIMETRICO	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Glicemia preprandiale (per interni) Plasma	1282	ENZIMATICO COLORIMETRICO	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Glicosuria (Urine 24 h) Urine 24h	206	ENZIMATICO COLORIMETRICO	1-2 gg	ANALISI

[206A]*[@DIURESI]/100000

VALORI DI RIFERIMENTO

	g/24h	< 0,15

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Glicosuria Frazionata Urine	207	ENZIMATICO COLORIMETRICO	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

GLICOSURIA FRAZIONATA	g/L	< 10
GLICOSURIA FRAZIONATA Tempo 1	g/L	< 10
GLICOSURIA FRAZIONATA Tempo 2	g/L	< 10
GLICOSURIA FRAZIONATA Tempo 3	g/L	< 10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Glicosuria su campione estemporaneo Urine Estempor.	2062	ENZIMATICO COLORIMETRICO	1-2 gg	ANALISI

[206A]*[@DIURESI]/100000

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Gruppo e fattore Rh Sangue Inter EDTA	023	Agglutinazione	1 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

Gruppo sanguigno (AB0)

Fattore Rh o anti D

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
H.G.H. (Ormone Somatotropo)	**6540**	**CLIA**	**7-9 gg**	
Siero				**SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

	ng/ml	Maschi: 0 - 10 anni: < 6,29 11 - 19 anni: < 10,80 oltre i 20 anni: < 2,47	Femmine: 0 - 10 anni: < 7,79 11 - 19 anni: < 8,05 oltre i 21 anni: < 9,88

Haemophilus Influenzae B Abs IgG	**432**	**IMMUNOENZIMATICO**	**17-18 gg**	
Siero				**ALTA SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

Assenti

HBcAb (CORE VIRUS EPATITE B) Abs IgM	**609**	**CMIA**	**1-2 gg**	
Siero				**ANALISI**

VALORI DI RIFERIMENTO

ANTICORPI ANTI-CORE VIRUS B (HBcAb IgM)	Index	< 0.80 Non reattvo >= 0.80 < 1.00 Dubbio >= 1.00 Reattivo

HBc IgM Interpretazione

HBeAg	**602**	**CMIA**	**1-2 gg**	
Siero				**ANALISI**

VALORI DI RIFERIMENTO

HBeAg (Antigene E)		< 0,10 Non reattivo ≥ 0,10 Reattivo

HBeAg Interpretazione

HBsAg (Antigene Au) Markers Epatite B	**600**	**CMIA**	**1-2 gg**	
Siero				**ANALISI**

VALORI DI RIFERIMENTO

HBsAg (Antigene Au)	Index	< 1,00 Non reattivo ≥ 1,00 Reattivo

HBsAg Interpretazione

HBsAg TEST DI CONFERMA	**6001**	**CLIA**	**5-6 gg**	
Siero				**SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

Non reattivo

HCV RNA Quantitativo	**60530**	**PCR REAL TIME**	**4-5 gg**	
Siero				**GENETICA**

Per l'esecuzione delle analisi di biologia molecolare per HCV, HBV e HIV non è più possibile richiedere più di una analisi per lo stesso campione (esempio: se per 1 paziente si richiede HCV qualitativo e HCV quantitativo, è necessario inviare 2 campioni anche se la richiesta può essere fatta sulla stessa accettazione)

VALORI DI RIFERIMENTO

HCV RNA Quantitativo		Non rilevato
Carica virale	UI/mL	

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
He4 (Ovarian Cancer Marker) Siero	**6323**	**CLIA**	**1-2 gg**	**SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

	pmol/L	≤70 donne in pre-menopausa ≤140 donne in post menopausa

HIV 1 RNA Quantitativo Plasma EDTA congelato	**60131**	**PCR REAL TIME**	**4 gg**	**GENETICA**

Per l'esecuzione delle analisi di biologia molecolare per HCV, HBV e HIV non è più possibile richiedere più di una analisi per lo stesso campione (esempio: se per 1 paziente si richiede HCV qualitativo e HCV quantitativo, è necessario inviare 2 campioni anche se la richiesta può essere fatta sulla stessa accettazione)

VALORI DI RIFERIMENTO

HIV-1 RNA Quantitativo		Non rilevato
Carica virale	Copie/mL	

HIV1/HIV2 WB (Test di conferma) Siero	**1672**	**immunoblot**	**6-7 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

sgp120
gp41
p31
p24
p17
sgp105
gp36
Esito

HLA (locus B51) Tipizzazione Sangue Inter EDTA	**GENE144**		**20-21 gg**	**GENETICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

HLA I Classe (A, B, C) Sangue Inter EDTA	**GENE145**		**20-21 gg**	**GENETICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

HLA I Classe (A, B, C) e HLA II Classe (DQB1, DRB1) Sangue Inter EDTA	**GENE149**		**20-21 gg**	**GENETICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

HLA II (singolo locus) Sangue Inter EDTA	**GENE148**		**20-21 gg**	**GENETICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
HLA II Classe (loci DQB1, DRB1) Sangue Inter EDTA	GENE147		20-21 gg	GENETICA
VALORI DI RIFERIMENTO				
HLA Tipizzazione classe I (Loci A-B-C) Sangue Inter EDTA	60115	PCR + IBRIDAZIONE	20-21 gg	GENETICA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
HLA Tipizzazione Classe II (loci DRB1 - DQB1) Sangue Inter EDTA	60119	PCR + IBRIDAZIONE	20-21 gg	GENETICA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
HLA Tipizzazione locus A Sangue Inter EDTA	60116	PCR E REVERSE DOT BLOT	11-12 gg	GENETICA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
HLA Tipizzazione locus B Sangue Inter EDTA	60117	PCR E REVERSE DOT BLOT	11-12 gg	GENETICA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
HLA Tipizzazione locus C Sangue Inter EDTA	60118	PCR E REVERSE DOT BLOT	11-12 gg	GENETICA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
HLA Tipizzazione locus DQB1 Sangue Inter EDTA	60120	PCR E REVERSE DOT BLOT	11 gg	FENOTIPIZZAZIONE
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
HLA-B27 RICERCA MOLECOLARE Sangue Inter EDTA	60121	PCR REAL TIME	15-16 gg	GENETICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
HLA-G Sangue Inter EDTA	1218	PCR REAL TIME	22-23 gg	GENETICA

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
HPV DNA (validato clinicamente) screening di ceppi ad alto rischio oncogeno Liquido Seminale, Secreto Prostatico, Tampone Cervicale, Tampone Uretrale, Urine I mitto, Materiale Vario	8659	PCR REAL TIME	4-5 gg	GENETICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Materiale :
Ricerca di DNA di HPV: Non Rilevato
Genotipo di HPV identificato:
Nota Gruppo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
HPV TIPIZZAZIONE 28 GENOTIPI Liquido Seminale, Secreto Prostatico, Tampone Cervicale, Tampone Uretrale, Urine I mitto, Materiale Vario	8660		8 gg	GENETICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
HPV Tipizzazione dei genotipi ad alto rischio oncogeno Provetta dedicata	GENE120		20-21 gg	GENETICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
HSV-1/HSV-2 DNA (Herpes Simplex Virus 1-2) Tampone Cutaneo	60070	REAL TIME PCR	5-6 gg	GENETICA

Qualora si utilizzi un tampone per la raccolta di materiale biologico, si raccomanda l'utilizzo di un tampone a secco o comunque privo di mezzo di coltura (tipo STUART usati per microbiologia colturale)

Il sangue intero in EDTA NON va congelato, bensì conservato a 2-8°C

VALORI DI RIFERIMENTO

Non rilevato

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Hyperuricosuria & Hyperuricemia Materiale Vario	HUU		7 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi allegato

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE

I.G.F. BP-3

Siero

COD.	METODO	TAT
6420	CHEMILUMINESCENZA	25-26 gg

SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L

Maschi:
1 - 2 anni: 0,63 - 3,75
3 - 4 anni: 0,84 - 4,74
5 - 6 anni: 0,90 - 5,51
7 - 8 anni: 1,47 - 6,33
9 - 10 anni: 1,88 - 7,12
11 - 12 anni: 2,50 - 8,41
13 - 14 anni: 3,17 - 10,20
15 - 16 anni: 3,42 - 9,37
17 - 18 anni: 3,28 - 8,56
19 - 20 anni: 2,85 - 7,40
21 - 30 anni: 3,34 - 7,64
31 - 40 anni: 3,54 - 6,82
41 - 50 anni: 3,35 - 6,78
51 - 60 anni: 3,42 - 6,87
61 - 64 anni: 3,10 - 6,43
oltre i 65 anni: 2,72 - 5,56

Femmine:
1 - 2 anni: 0,63 - 3,75
3 - 4 anni: 0,84 - 4,74
5 - 6 anni: 0,90 - 5,51
7 - 8 anni: 1,47 - 6,33
9 - 10 anni: 1,88 - 7,12
11 - 12 anni: 2,50 - 8,41
13 - 14 anni: 3,17 - 10,20
15 - 16 anni: 3,42 - 9,37
17 - 18 anni: 3,28 - 8,56
19 - 20 anni: 2,85 - 7,40
21 - 30 anni: 3,34 - 7,64
31 - 40 anni: 3,54 - 6,82
41 - 50 anni: 3,35 - 6,78
51 - 60 anni: 3,42 - 6,87
61 - 64 anni: 3,10 - 6,43
oltre i 65 anni: 2,72 - 5,56

Idrossiprolina urinaria

Urine 24h

COD.	METODO	TAT
632	HPLC	15 gg

TOSSICOLOGIA

A partire dalle 48 ore precedenti l'inizio e per tutto il tempo di raccolta delle urine evitare i seguenti alimenti: carne, derivati della carne, brodo ed estratti di carne, prodotti contenenti gelatina, pesce, dolci, uova. Durante questo periodo si consiglia, previa consultazione del medico, di evitare l'assunzione di farmaci.

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/24h

Anni: 0 - 13 25-80
Anni: 14 - 64 10-40
Anni: >65 5 -17

IgE Multiplex - Test Alex 2

Siero

COD.	METODO	TAT
666		1-2 gg

ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

IgE specifiche Acacia longifolia

Siero

COD.	METODO	TAT
6T19	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg

ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Acarus siro (Storage mite)

Siero

COD.	METODO	TAT
6D70	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg

ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Acciuga (Engraulis encrasicolus)

Siero

COD.	METODO	TAT
6F313	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg

ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Acero (Acer negundo) Siero	6T1	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Aglio (Allium sativum) Siero	6F47	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Albicocca (Prunus armeniaca) Siero	6F237	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Albume Siero	6F1	CHEMILUMINESCENZA	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Alopecurus pratensis Siero	6G16	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Alternaria alternata Siero	6M6	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Amb a 1, Ambrosia (Ambrosia elatior) Siero	5W230	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Ambrosia artemisiifolia (Ambrosia elatior) Siero	6W1	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Ambrosia psilostachya Siero	6W2	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Amoxicillina (Amoxicilloyl) Siero	6C6	CHEMILUMINESCENZA	5 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Ampicillina (Ampicilloyl) Siero	6C5	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-6 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Anacardio (Anacardium occidentale) Siero	6F202	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Ananas (Ananas comosus) Siero	6F210	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Anguria (Citrullus lanatus) Siero	6F329	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Anice (Pimpinella anisum) Siero	6F271	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Anisakis Siero	6P4	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Ape (Apis mellifera) Siero	6I1	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	1-2 gg	ALLERGIE E INTOLLERA
VALORI DI RIFERIMENTO kU/L < 0,10				
IgE specifiche Ara h 1, Arachide (Arachis hypogaea) Siero	5F422	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA
VALORI DI RIFERIMENTO kU/L < 0,10				
IgE specifiche Ara h 2, Arachide (Arachis hypogaea) Siero	5F423	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA
VALORI DI RIFERIMENTO kU/L < 0,10				
IgE specifiche Ara h 3, Arachide (Arachis hypogaea) Siero	5F424	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA
VALORI DI RIFERIMENTO kU/L < 0,10				
IgE specifiche Ara h 8, Arachide, PR-10 (Arachis hypogaea) Siero	5F352	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA
VALORI DI RIFERIMENTO kU/L < 0,10				
IgE specifiche Ara h 9, Arachide, LTP (Arachis hypogaea) Siero	5F427	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA
VALORI DI RIFERIMENTO kU/L < 0,10				
IgE specifiche Arachide (Arachis hypogaea) Siero	6F13	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA
VALORI DI RIFERIMENTO kU/L < 0,10				
IgE specifiche Aragosta (Palinurus spp.) Siero	6F304	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA
VALORI DI RIFERIMENTO kU/L < 0,10				

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Arancia (Citrus sinensis) Siero	6F33	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Art v 1, Assenzio selvatico (Artemisia vulgaris) Siero	5W231	CHEMILUMINESCENZA	4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Art v 3, Assenzio selvatico, LTP (Artemisia vulgaris) Siero	5W233	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Ascaris Siero	6P1	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Asp f 1 (Aspergillus fumigatus) Siero	5M218	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Aspergillus fumigatus Siero	6M3	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Assenzio selvatico (Artemisia vulgaris) Siero	6W6	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Astice (Homarus gammarus) Siero	6F80	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Avena (Avena sativa) Siero	6G14	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Avocado (Persea americana) Siero	6F96	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Banana (Musa spp.) Siero	6F92	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Barbagiona (Holcus lanatus) Siero	6G13	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Basilico (Ocimum basilicum) Siero	6F269	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Ber e 1, Noce brasiliana (Bertholletia excelsa) Siero	5F354	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Bet v 1, Betulla, PR-10 (Betula verrucosa) Siero	5T215	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Bet v 2, Betulla, Profilina (Betula verrucosa) Siero	5T216	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Bet v 4, Betulla (Betula verrucosa) Siero	5T220	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Betulla (Betula verrucosa) Siero	6T3	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Bos d 4, Latte, Alfa-lattoalbumina (Bos domesticus) Siero	5F76	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Bos d 5, Latte, Beta-lattoglobulina (Bos domesticus) Siero	5F77	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Bos d 8, Latte,Caseina (Bos domesticus) Siero	5F78	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Broccoli (Brassica oleracea var. italica) Siero	6F260	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Cacao (Theobroma cacao) Siero	6F93	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Caffè (Coffea spp.) Siero	6F221	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Calabrone bianco (Dolichovespula maculata) Siero	6I2	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	1-2 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Calabrone europeo (Vespa crabro) Siero	6I75	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	1-2 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Calabrone giallo (Dolichovespula arenaria) Siero	6I5	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	1-2 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Calamaro (Loligo spp.) Siero	6F258	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Candida albicans Siero	6M5	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Cannarecchia (Sorghum halepense) Siero	6G10	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Carne di bue (Bos spp.) Siero	6F27	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Carne di coniglio (Oryctolagus spp.) Siero	6F213	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Carne di maiale (Sus spp.) Siero	6F26	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Carne di montone (Ovis spp.) Siero	6F88	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Carne di pollo (Gallus spp.) Siero	6F83	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Carne di tacchino (Meleagris gallopavo) Siero	6F284	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Carota (Daucus carota) Siero	6F31	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Carpino bianco (Carpinus betulus) Siero	6T209	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Carruba (E410) (Ceratonia siliqua) Siero	6F296	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Castagna (Castanea sativa) Siero	6F299	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Castagno (Castanea sativa) Siero	6T206	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA
VALORI DI RIFERIMENTO kU/L < 0,10				
IgE specifiche Cavolfiore (Brassica oleracea var. botrytis) Siero	6F291	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA
VALORI DI RIFERIMENTO kU/L < 0,10				
IgE specifiche Cavolini di Bruxelles (Brassica oleracea var. gemmifera) Siero	6F217	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA
VALORI DI RIFERIMENTO kU/L < 0,10				
IgE specifiche Ceci (Cicer arietinus) Siero	6F309	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA
VALORI DI RIFERIMENTO kU/L < 0,10				
IgE specifiche Cefaclor Siero	6RC7	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	ALLERGIE E INTOLLERA
VALORI DI RIFERIMENTO kU/L < 0,10				
IgE specifiche Cetriolo (Cucumis sativus) Siero	6F244	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA
VALORI DI RIFERIMENTO kU/L < 0,10				
IgE specifiche Ciliegia (Prunus avium) Siero	6F242	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA
VALORI DI RIFERIMENTO kU/L < 0,10				
IgE specifiche Cipolla (Allium cepa) Siero	6F48	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA
VALORI DI RIFERIMENTO kU/L < 0,10				

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Cipresso mediterraneo (Cupressus sempervirens) Siero	6T23	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Cladosporium herbarum Siero	6M2	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Clorexidina (Chlorhexidine) Siero	6C8	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Coda di Topo (Phleum pratense) Siero	6G6	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Cor a 1, Nocciola, PR-10 (Corylus avellana) Siero	5F428	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Cor a 14, Nocciola (Corylus avellana) Siero	5F439	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Cor a 8, Nocciola, LTP (Corylus avellana) Siero	5F425	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Cor a 9, Nocciola (Corylus avellana) Siero	5F440	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Cryptomeria japonica Siero	6T17	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Cyp c 1, Carpa (Cyprinus carpio) Siero	5F355	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Der p 10, Acaro della polvere domestica, Tropomiosina (Dermatophagoides P.) Siero	5D205	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	10-12 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

KU/L < 0,10

IgE specifiche Dermatophagoides farinae (House dust mite) Siero	6D2	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Dermatophagoides pteronyssinus (House dust mite) Siero	6D1	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Epitelio di capra Siero	6E80	CHEMILUMINESCENZA	4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Epitelio di cavia Siero	6E6	CHEMILUMINESCENZA	4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Epitelio di coniglio Siero	6E82	CHEMILUMINESCENZA	4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Epitelio di pecora Siero	6E81	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Epitelio di ratto Siero	6E73	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Epitelio di topo Siero	6E71	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Erba canina (Cynodon dactylon) Siero	6G2	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Erba mazzolina (Dactylis glomerata) Siero	6G3	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Erba vetriola (Parietaria officinalis) Siero	6W19	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Euroglyphus maynei (House dust mite) Siero	6D74	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Fagioli bianchi (Phaseolus vulgaris) Siero	6F15	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Farinaccio (Chenopodium album) Siero	6W10	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Fico (Ficus carica) Siero	6F328	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	1-2 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Forfora di cane Siero	6E5	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Forfora di cavallo Siero	6E3	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Forfora di gatto Siero	6E1	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Forfora di vacca Siero	6E4	CHEMILUMINESCENZA	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Formaggio a pasta dura Siero	6F82	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Formaggio a pasta molle Siero	6F81	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Formaldeide/Formalina Siero	6K80	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Fragola (Fragaria vesca) Siero	6F44	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Franseria acanthicarpa Siero	6W4	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Frassino (Fraxinus americana) Siero	6T15	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Funghi, champignon (Agaricus hortensis) Siero	6F212	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Gad c 1, Merluzzo (Gadus morhua) Siero	5F426	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Gal d 1, Uovo, Ovomucoide (Gallus domesticus) Siero	5F233	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Gal d 2, Uovo, Ovoalbumina (Gallus domesticus) Siero	5F232	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Gal d 4, Uovo, Lisozima (Gallus domesticus) Siero	5K208	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA
VALORI DI RIFERIMENTO kU/L < 0,10				
IgE specifiche Gambero (Pandalus borealis, Penaeus monodon) Siero	6F24	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA
VALORI DI RIFERIMENTO kU/L < 0,10				
IgE specifiche Giallone (Vespula spp.) Siero	6I3	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	1-2 gg	ALLERGIE E INTOLLERA
VALORI DI RIFERIMENTO kU/L < 0,10				
IgE specifiche Ginepro sabina (Juniperus sabinoides) Siero	6T6	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA
VALORI DI RIFERIMENTO kU/L < 0,10				
IgE specifiche Glutine Siero	6F79	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA
VALORI DI RIFERIMENTO kU/L < 0,10				
IgE specifiche Gly m 4, Soia, PR-10 (Glycine max) Siero	5F353	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA
VALORI DI RIFERIMENTO kU/L < 0,10				
IgE specifiche Gly m 5, Soia, Beta-conglicinina (Glycine max) Siero	5F431	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA
VALORI DI RIFERIMENTO kU/L < 0,10				
IgE specifiche Gly m 6, Soia, Glicinina (Glycine max) Siero	5F432	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA
VALORI DI RIFERIMENTO kU/L < 0,10				

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Glycyphagus domesticus (Storage mite) Siero	6D73	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Gomma arabica (E414) (Acacia spp.) Siero	6F297	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Gramigna dei prati (Poa pratensis) Siero	6G8	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Granchio comune (Cancer pagurus) Siero	6F23	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Grano (Frumento) Siero	6F4	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Grano (Triticum aestivum) Siero	6G15	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	1-2 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Grano saraceno (Fagopyrum esculentum) Siero	6F11	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Isocianato TDI (Toluene diisocyanate) Siero	6K75	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Jug r 1, Noce (Juglans regia) Siero	5F441	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Jug r 3, Noce, LTP (Juglans regia) Siero	5F442	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Kiwi (Actinidia deliciosa) Siero	6F84	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Lanciuola (Plantago lanceolata) Siero	6W9	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Latte Siero	6F2	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Lattice (Hevea brasiliensis) Siero	6K82	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Lattuga (Lactuca sativa) Siero	6F215	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Lenticchia (Lens esculenta) Siero	6F235	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Lepidoglyphus destructor (Storage mite) Siero	6D71	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Lievito (Saccharomyces cerevisiae) Siero	6F45	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Ligustro (Ligustrum vulgare) Siero	6T210	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Limone (Citrus limon) Siero	6F208	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Loglierella (Lolium perenne) Siero	6G5	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Mal d 3, Mela, LTP (Malus domestica) Siero	5F435	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Malto Siero	6F90	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Mandarino (Citrus reticulata) Siero	6F302	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Mandorla (Amygdalus communis) Siero	6F20	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Mango (Mangifera indica) Siero	6F91	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Margherita dei prati (Chrysanthemum leucanthemum) Siero	6W7	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Mela (Malus x domestica) Siero	6F49	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Melaleuca (Melaleuca leucadendron) Siero	6T21	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Melanzana (Solanum melongena) Siero	6F262	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Melone (Cucumis melo spp.) Siero	6F87	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Mitili (Mytilus edulis) Siero	6F37	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Mucor racemosus Siero	6M4	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Nocciola (Corylus avellana) Siero	6F17	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Nocciolo (Corylus avellana) Siero	6T4	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Noce (Juglans spp.) Siero	6F256	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Noce brasiliana (Bertholletia excelsa) Siero	6F18	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Noce di cocco (Cocos nucifera) Siero	6F36	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Olivo (Olea europaea) Siero	6T9	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Olmo americano (Ulmus americana) Siero	6T8	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Ontano bianco (Alnus incana) Siero	6T2	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Origano (Origanum vulgare) Siero	6F283	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Ortica comune (Urtica dioica) Siero	6W20	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Orzo (Hordeum vulgare) Siero	6F6	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Ossido di etilene Siero	6K78	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Ostrica (Ostrea edulis) Siero	6F290	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Paleino odoroso (Anthoxanthum odoratum) Siero	6G1	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Paleo dei prati (Festuca elatior) Siero	6G4	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Paprica, Peperone (Capsicum annuum) Siero	6F218	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Par j 2, Erba vetriola, LTP (Parietaria judaica) Siero	5W211	CHEMILUMINESCENZA	9 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Parietaria judaica Siero	6W21	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Pen a 1, Gamberetto, Tropomiosina Siero	5F351	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Penicillium chrysogenum (P. notatum) Siero	6M1	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Penicilloyl G Siero	6C1	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Penicilloyl V Siero	6C2	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Pepe nero (Piper nigrum) Siero	6F280	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Pepe verde (Piper nigrum) Siero	6F263	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Pera (Pyrus communis) Siero	6F94	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Pesca (Prunus persica) Siero	6F95	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Pesce, Merluzzo (Gadus morhua) Siero	6F3	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Phl p 11, Coda di topo (Phleum pratense) Siero	6G211	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Phl p 12, Coda di topo (Phleum pratense) Siero	6G212	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Phl p 15b, Coda di topo (Phleum pratense) Siero	6G215	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Phl p 2, Coda di topo (Phleum pratense) Siero	6G206	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Phl p 4, Coda di topo (Phleum pratense) Siero	6G208	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Phl p 6, Coda di topo (Phleum pratense) Siero	6G209	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Phl p 7, Coda di topo (Phleum pratense) Siero	6G210	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Pino strobo (Pinus strobus) Siero	6T16	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Pinoli (Pinus edulis) Siero	6F253	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Pioppo (Populus deltoides) Siero	6T14	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Piselli (Pisum sativum) Siero	6F12	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Pistacchio (Pistacia vera) Siero	6F203	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Piume di pappagallo Siero	6E91	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Piume d'oca Siero	6E70	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Platano (Platanus acerifolia) Siero	6T11	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Platessa (Pleuronectes platessa) Siero	6F254	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Polpo (Octopus vulgaris) Siero	6F59	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Polvere (Greer Labs., Inc.) Siero	6H1	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	1-2 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Polvere (Hollister-Stier Labs.) Siero	6H2	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Pomodoro (Lycopersicon lycopersicum) Siero	6F25	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Pompelmo (Citrus paradisi) Siero	6F209	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Prezzemolo (Petroselinum crispum) Siero	6F86	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Proteine urinarie di ratto Siero	6E74	CHEMILUMINESCENZA	4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Proteine urinarie di topo Siero	6E72	CHEMILUMINESCENZA	4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Pru p 1, Pesca, PR-10 (Prunus persica) Siero	5F419	CHEMILUMINESCENZA	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Pru p 3, Pesca, LTP (Prunus persica) Siero	5F420	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Pru p 4, Pesca, Profilina (Prunus persica) Siero	5F421	CHEMILUMINESCENZA	5-6 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Prugna (Prunus domestica) Siero	6F255	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Quercia bianca (Quercus alba) Siero	6T7	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Riso integrale (Oryza sativa) Siero	6F9	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche rPhl p1 - Phleum Pratense (Coda di Topo) Siero	6G205		5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Salice (Salix caprea) Siero	6T12	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Salmone (Salmo salar) Siero	6F41	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Sardina (Sardinops melanosticta) Siero	6F61	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Scarafaggio (Blatella germanica) Siero	6I6	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Sedano (Apium graveolens) Siero	6F85	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Segale (Secale cereale) Siero	6G12	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Semi di Finocchio Siero	6F219		5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Semi di sesamo (Sesamum indicum) Siero	6F10	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	1-2 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Semi di soia (Glycine max) Siero	6F14	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Senape (Brassica/Sinapis spp.) Siero	6F89	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Sgombro (Scomber scombrus) Siero	6F206	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Sogliola (Solea solea) Siero	6F337	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

IgE specifiche Spinaci (Spinachia oleracea) Siero	6F214	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Tafano (Tabanus spp.) Siero	6I204	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Taraxacum vulgare Siero	6W8	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Tea (Camellia sinensis) Siero	6F222	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Tiglio (Tilia cordata) Siero	6T208	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Timo (Thymus vulgaris) Siero	6F273	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Tonno (Thunnus albacares) Siero	6F40	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Tri a 14, Grano, LTP (Triticum aestivum) Siero	5F433	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

KU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Tri a 19, Grano, Omega-5 Gliadina (Triticum aestivum) Siero	5F416	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Trota (Oncorhynchus mykiss (Salmo gairdnieri)) Siero	6F204	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA
VALORI DI RIFERIMENTO	kU/L	< 0,10		
IgE specifiche Tuorlo Siero	6F75	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA
VALORI DI RIFERIMENTO	kU/L	< 0,10		
IgE specifiche Uva (Vitis vinifera) Siero	6F259	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA
VALORI DI RIFERIMENTO	kU/L	< 0,10		
IgE specifiche Vaniglia (Vanilla planifolia) Siero	6F234	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA
VALORI DI RIFERIMENTO	kU/L	< 0,10		
IgE specifiche Verga d'oro (Solidago virgaurea) Siero	6W12	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	3-4 gg	ALLERGIE E INTOLLERA
VALORI DI RIFERIMENTO	kU/L	< 0,10		
IgE specifiche Vespa (Polistes spp.) Siero	6I4	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	1-2 gg	ALLERGIE E INTOLLERA
VALORI DI RIFERIMENTO	kU/L	< 0,10		
IgE specifiche Vongola (Ruditapes spp.) Siero	6F207	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA
VALORI DI RIFERIMENTO	kU/L	< 0,10		
IgE specifiche Zanzara comune (Aedes communis) Siero	6I71	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	1-2 gg	ALLERGIE E INTOLLERA
VALORI DI RIFERIMENTO	kU/L	< 0,10		

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Zea mays Siero	6G202	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE specifiche Zucca (Cucurbita pepo) Siero	6F225	fluoroimmunoenzimatico - sistema UNICAP	5-7 gg	ALLERGIE E INTOLLERA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 0,10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgE TOTALI Siero	665	CHEMILUMINESCENZA	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

UI/mL < 200

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Immunocomplessi Circolanti Siero congelato	1313	ELISA	14-15 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

µgEq/ml Negativo: < 4,4
Dubbio: 4,4 - 10,8
Positivo: > 10,8

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Immunofissazione Sierica Siero	1000	IMMUNOELETTROFORESI	5 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Immunofissazione urinaria Urine Mattino	1001	IMMUNOELETTROFORESI	5 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Immunoglobuline A Siero	1101	immunonefelometrico	3 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL 70,00 - 400,00

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Immunoglobuline G Siero	1102	immunonefelometrico	3 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL 700,00 - 1.600

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Immunoglobuline M Siero	1103	immunonefelometrico	3 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL	40,00 - 230,00

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Indagine immunoistochimica CD138 e NK Endometrio	IN10312	IMMUNOISTOCHIMICO CON LETTURA MICROSCOPICA	20 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Indicano Urinario Urine Mattino	8921I	HPLC	3 gg	TOSSICOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/g creat.	15,0 - 63,0

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
INDICE DI RISCHIO (RAPPORTO HDL/LDL) Siero	327	ENZIMATICO COLORIMETRICO	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Indice Homa Plasma	1039	CALCOLO DERIVATO	1-2 gg	ANALISI

Per la corretta esecuzione del test accettare anche Glicemia e Insulina

VALORI DI RIFERIMENTO

	0,23 - 2,50

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Indice ROMA Siero	1418	CALCOLO DERIVATO	4-5 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

%	Pre-menopausa: < 11,4 % Basso rischio ≥ 11,4 % Alto rischio Post-menopausa: < 29,9 % Basso rischio ≥ 29,9 % Alto rischio

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Influenza A IgA Siero	1241A	ELISA	5-6 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Index	< 0,9 Negativo 0,9 - 1,1 Dubbio > 1,1 Positivo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Influenza B IgA Siero	**1241**	**ELISA**	**5-6 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

Index

< 0,9 Negativo
0,9 – 1,1 Dubbio
> 1,1 Positivo

Inibina B Siero	**7989**	**immunoenzimatico**	**9-10 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

Inviare il siero separato a 4° C se l' invio del campione avviene entro la giornata del prelievo.
In caso contrario inviare il siero separato a – 20 °C.

VALORI DI RIFERIMENTO

pg/mL

Maschi:
1 - 9 anni: 91 - 163
10 - 19 anni: 169 - 216
20 - 39 anni: 151,7 - 173,9
40 - 59 anni: 134,7 - 150,5
oltre i 60 anni: 126,5 - 151

Femmine:
1 - 9 anni: 8 - 37
10 - 19 anni: 22 - 85
20 - 39 anni: 21 - 53
40 - 59 anni: 0 - 33
oltre i 60 anni:

Insulinemia Siero	**652**	**CHEMILUMINESCENZA**	**1-2 gg**	**ANALISI**

VALORI DI RIFERIMENTO

µU/mL 2,00 - 25,00

Insulinemia post prandiale Siero	**1378**	**CHEMILUMINESCENZA**	**1-2 gg**	**ANALISI**

VALORI DI RIFERIMENTO

µU/mL

Interleuchina 6 (IL6) Siero congelato	**430**	**CHEMILUMINESCENZA**	**5 gg**	**SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

pg/ml < 7,0

Intolleranza all'Istamina Materiale Vario	**60167**		**7 gg**	

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi allegato

Intolleranza genetica al lattosio Sangue Inter EDTA	**GENE133**		**15-16 gg**	**GENETICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

Gene:
Varianti Alleliche:
Genotipo:
Variante:
Suscettibilità:

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Intraoperatoria estemporanea AP-SOMA	IN10188	CONGELAMENTO +TAGLIO + COLORAZIONE CON EE	20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Iodio Urinario 24 h Urine 24h	79972	cromatografia ionica	20-21 gg	ALTA SPECIALISTICA SERVICE

VALORI DI RIFERIMENTO

	µg/24h	100 - 300

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Iodio urinario su urine estemporanee Urine Estempor.	79971	ICP-MS	20 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

	µg/l	100 - 300

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IPOFISECTOMIA TOTALE O PARZIALE AP-IPOFISI	IN10072		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Isoenzimi CK (Creatinchinasi) Siero	1485	ELETTROFORESI SU GEL AGAROSIO	3 gg	ALTA SPECIALISTICA

L'ESAME E' COMPOSTO DA DUE ANALISI (1485 + 1486) CHE NECESSITANO DI DUE PROVETTE SEPARATE (BLU + ROSSA) CON DUE CODICI ETICHETTA DIFFERENTI.

VALORI DI RIFERIMENTO

CK (Creatinchinasi)	U/L	Maschi: < 171,0	Femmine: < 145,0
CK-MM	%	97,0 - 100,0	
CK-MB	%	0 - 3% se l'attività CK è compresa tra 15 e 500 U/L 0 - 4% se l'attività di CK è superiore a 500 U/L	
CK-BB	%	0%	

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE

Isoenzimi della Fosfatasi Alcalina | **258** | **elettroforetico** | **11-12 gg**

Siero

ALTA SPECIALISTICA

Per il corretto invio di questa analisi è necessario produrrwe due etichette con relativo codice campione e due codici analisi distinti (258 + 2829)

VALORI DI RIFERIMENTO

Frazione Ossea	%	20 - 75
Frazione Epatica 1	%	15 - 72
Frazione Intestinale	%	Intestinale 1+2+3: < 14,0 %
Frazione Epatica 2	%	1 - 14
Frazione Intestinale 2		
Frazione Intestinale 3		
Frazione Placentare		Assente

Isoenzimi L.D.H. | **2580** | **elettroforetico** | **5 gg**

Siero

ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

LDH 1	%	16,1 - 31,5
LDH 2	%	29,2 - 41,6
LDH 3	%	17,0 - 26,2
LDH 4	%	5,9 - 12,3
LDH 5	%	3,2 - 17,3

JAK2 (Mutazione V617F) | **GENE058** | **PCR REAL TIME** | **15 gg**

Sangue Inter EDTA

GENETICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Ketamina Matrice Pilifera Valenza Clinica | **1564CL** | **LC-MS-MS** | **30 gg**

Matrice Pilifera

TOSSICOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Ketamina matrice pilifera -valenza medico legale | **1564** | **LC-MS-MS** | **30 gg**

Matrice Pilifera

TOSSICOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Ketamina matrice Urinaria - Valenza Clinica | **1558CL** | **Cromat. Liq. - Spettrometria di massa** | **10-11 gg**

Urine

ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Cut Off: 100 µg/L

Ketamina test di conferma -matrice urinaria | **1561** | **Cromat. Liq. - Spettrometria di massa** | **10-11 gg**

Urine

TOSSICOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Ketamina test di screening su urine-valenza medico legale Urine	1558	Cromat. Liq. - Spettrometria di massa	10-11 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo (Cut Off: 100 µg/L)

KRAS - Ricerca di Mutazioni Codoni 12/13,61 <multi materiale>	KRAS	KRASM-1_3	15 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

L.A.C. (Lupus anticoagulant) Plasma Citrato	1353	COAGULATIVO-DRVVT	7 gg	ANALISI

1. prelevare due provette con Na-citrato
2. agitare delicatamente per inversione almeno 3 volte;
3. le provette primarie possono essere inviate se prevengono in laboratorio entro 4 ore dal prelievo

Diversamente, per l'invio di aliquote:

4. centrifugare immediatamente le provette a 3000 giri per 10 minuti;
5. prelevare una aliquota di surnatante di almeno 2,5 ml;
6. centrifugare immediatamente a 4000 – 5000 giri per 10 minuti;
7. prelevare una aliquota di surnatante di almeno 2 ml e congelare rapidamente a - 20 °C;
8. inviare in provetta dedicata

VALORI DI RIFERIMENTO

< 1,20 Negativo
1,20 - 1,50 Debolmente positivo
1,51 - 2,00 Moderatamente positivo
> 2,00 Altamente positivo

LABBRO - RESEZIONE CUNEIFORME LABBRO AP-LABBRO	IN10073		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

LABBRO - RESEZIONE QUADRANGOLARE LABBRO AP-LABBRO	IN10074		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

Lacosamide Siec Cerba	LACO	HPLC	2-3 gg	TOSSICOLOGIA SERVICE

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L

Intervallo terapeutico :
1 - 10

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Lamotrigina Siec Cerba	680	HPLC	3 gg	TOSSICOLOGIA SERVICE

Il prelievo non può essere effettuato in provette con gel separatore in quanto quest'ultimo può modificare il dosaggio del farmaco nel siero e quindi il risultato dell'esame effettuato con queste provette non è attendibile.

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/L	Soggetti in terapia : 3,0 - 15,0

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
LARINGE - BIOPSIA LARINGEA (SING.) AP-LARINGE	IN10075		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
LARINGE - CORDECTOMIA BILATERALE AP-LARINGE	IN10077		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
LARINGE - CORDECTOMIA MONOLATERALE AP-LARINGE	IN10078		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
LARINGE - EPIGLOTTIDECTOMIA AP-LARINGE	IN10080		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
LARINGE - LARINGECTOMIA AP-LARINGE	IN10081		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
LARINGE - LARINGECTOMIA SOVRAGLOTTIDA AP-LARINGE	IN10082		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
LARINGE - LARINGECTOMIA TOTALE AP-LARINGE	IN10083		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
LARINGE - LARINGECTOMIA TOTALE CON SVUOTAMENTO DEL COLLO AP-LARINGE	IN10084		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
LARINGE - POLIPECTOMIA O NODULECTOMIA LARINGE AP-LARINGE	IN10085		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Lattato Plasma	305	ENZIMATICO COLORIMETRICO	1-2 gg	ANALISI

Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/dL	4,5 - 19,8

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
LDH (NAC attivato) Siero	302	ENZIMATICO	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

	U/L	< 246

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
LDL ossidate Siero congelato	**6216**	**ELISA**	**30 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

Congelare il campione nel caso non venga inviato entro 6 ore dal prelievo.

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL 20 - 170

LEGIONELLA PNEUMOPHILA SU URINE Urine	**LEGU**	**IMMUNOCROMATOGRAFIA**	**6 gg**	**MICROBIOLOGIA**

VALORI DI RIFERIMENTO

Leishmania Sangue Inter EDTA	**1129**	**PCR REAL TIME**	**12 gg**	**GENETICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

Materiale:

Esito : Non Rilevato

Leishmania Infantum IgG Siero	**7981**	**immunofluorescenza indiretta**	**8-9 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

LEVETIRACETAM (KEPPRA) Siec Cerba	**6208**	**HPLC**	**3 gg**	**TOSSICOLOGIA** **SERVICE**

La provetta di siero non deve avere gel separatore.

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L 10,0 – 43,0

LH Siero	**616**	**CLIA**	**1-2 gg**	**ANALISI**

VALORI DI RIFERIMENTO

mUI/mL

Maschi:
0 - 70 anni: 1,5 - 9,3
oltre i 71 anni: 3,1 - 34,6

Femmine:
Fase follicolare : 1,9 - 12,5
Fase ovulatoria : 8,7 - 76,3
Fase luteinica : 0,5 - 16,9
Post-menopausa : 7,9 - 53,8
Gravidanza : < 1,5
Bambine : < 6,0

Linfociti B (CD20+CD3-) Sangue Inter EDTA	**CD20**	**citometria a flusso**	**14-15 gg**	**ALTA SPECIALISTICA** **SERVICE**

- prelevare assolutamente in K3 EDTA;
- volume minimo 3 ml;
- temperatura di conservazione + 4° C;
- il prelievo deve essere tassativamente eseguito nello stesso giorno della spedizione in service;
- non possono essere accettati campioni biologici inviati VENERDI e PREFESTIVI

VALORI DI RIFERIMENTO

% 0,03 - 0,05

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Linfociti CD34+ Sangue Inter EDTA	**0603**	**citometria a flusso**	**12-13 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

- prelevare assolutamente in K3 EDTA;
- volume minimo 3 ml;
- temperatura di conservazione + 4° C;
- il prelievo deve essere tassativamente eseguito nello stesso giorno della spedizione in service;
- non possono essere accettati campioni biologici inviati VENERDI e PREFESTIVI

VALORI DI RIFERIMENTO

	%	0,03 - 0,05

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Linfociti T CD4+ Sangue Inter EDTA	**0609**	**citometria a flusso**	**12-13 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

- prelevare assolutamente in K3 EDTA;
- volume minimo 3 ml;
- temperatura di conservazione + 4° C;
- il prelievo deve essere tassativamente eseguito nello stesso giorno della spedizione in service;
- non possono essere accettati campioni biologici inviati VENERDI e PREFESTIVI

VALORI DI RIFERIMENTO

Valore percentuale	%	27 - 57
Valore assoluto	/µL	562 - 2.692

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
LINFONODO - AGOBIOPSIA LINFONODALE (SING.) AP-LINFONODO	**IN10086**		**4 gg**	**ANATOMIA PATOLOGICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
LINFONODO - BIOPSIA LINFONODO SUPERFICIALE AP-LINFONODO	**IN10089**		**4 gg**	**ANATOMIA PATOLOGICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
LINFONODO - LINFOADENECTOMIA REGIONALE DI LINFONODI MULTIPLI AP-LINFONODO	**IN10090**		**4 gg**	**ANATOMIA PATOLOGICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
LINFONODO - LINFOADENECTOMIA REGIONALE MULTIPLI DA STAZIONI AP-LINFONODO	**IN10091**		**4 gg**	**ANATOMIA PATOLOGICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
LINFONODO - LINFONODO SENTINELLA ASPORTAZIONE AP-LINFONODO	IN10088		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
LINFONODO - SVUOTAMENTO LINFONODALE ALLARGATO CAPO, COLLO AP-LINFONODO	IN10092		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Lipasi Siero	319	ENZIMATICO COLORIMETRICO	1 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

	U/L	12 - 53

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Lipoproteina a Siero	3253	IMMUNOTURBIDIMETRIA	3 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/dL	< 30,0

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Lisozima Sierico Siero	1132	enzimatico	12-13 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/l	2,5 - 8,0

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Litiemia Siero	247	COLORIMETRICO	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

	mmol/L	Concentrazione terapeutica : 0,6 - 1,2 Possibili effetti tossici : > 1,5

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Longevity Test Materiale Vario	60151		7 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi allegato

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Macroprolattina Siero	**6179**	**elettrochemiluminescenza**	**5-6 gg**	ALTA SPECIALISTICA SERVICE

VALORI DI RIFERIMENTO

Prolattina Totale	ng/ml	Maschi: 4,04 - 15,20	Femmine: 4,79 - 23,30
Prolattina post-PEG		3 - 18	
Recupero percentuale (R%)	%	> 60	
Commento			

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Magnesiemia (Mg) Siero	**246**	**COLORIMETRICO**	**1-2 gg**	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/dL	1,6 - 2,6

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Magnesio urinario (Mg) (Urine 24 h) Urine 24h	**256**	**COLORIMETRICO**	**1-2 gg**	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/24h	24 - 255

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
MAGNESIO URINARIO SU CAMPIONE ESTEMPORANEO Urine Estempor.	**2244**	**COLORIMETRICO (blu xilidile)**	**1-2 gg**	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/mg creatinina	Maschi: 0 - 0 anni: 0,10 - 0,48 1 - 1 anni: 0,09 - 0,37 2 - 2 anni: 0,07 - 0,25 3 - 6 anni: 0,05 - 0,20 7 - 17 anni: 0,05 - 0,15 oltre i 18 anni: 0,05 - 0,15	Femmine: 0 - 0 anni: 0,10 - 0,48 1 - 1 anni: 0,09 - 0,37 2 - 2 anni: 0,07 - 0,25 3 - 6 anni: 0,05 - 0,20 7 - 17 anni: 0,05 - 0,15 oltre i 18 anni: 0,05 - 0,15

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
MAMMELLA - AGOASPIRATO MAMMARIO AP-MAMMELLA	**IN10218**	**Microscopico**	**20 gg**	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Esito

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
MAMMELLA – AGOBIOPSIA MAMMARIA AP-MAMMELLA	**IN10100**		**4 gg**	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
MAMMELLA - MASTECTECTOMIA SEMPLICE O TOTALE (CON O SENZA LINF.)	**IN10101**		**4 gg**	
AP-MAMMELLA				**ANATOMIA PATOLOGICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

MAMMELLA - MASTECTOMIA RADICALE	**IN10102**		**4 gg**	
AP-MAMMELLA				**ANATOMIA PATOLOGICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

MAMMELLA - MASTECTOMIA SOTTOCUTANEA SEMPLICE	**IN10103**		**4 gg**	
AP-MAMMELLA				**ANATOMIA PATOLOGICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

MAMMELLA - NODULECTOMIA MAMMELLA	**IN10104**		**4 gg**	
AP-MAMMELLA				**ANATOMIA PATOLOGICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

MAMMELLA - QUADRANTECTOMIA O RESEZIONE PARZIALE	**IN10105**		**4 gg**	
AP-MAMMELLA				**ANATOMIA PATOLOGICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
MAMMELLA - RESEZIONE PARZIALE IN CORSO DI MASTOPLASTICA AP-MAMMELLA	IN10106	microscopico	20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
MANGANESE Sierico Sangue intero Li-Eparina	718	ICP-MS	10-11 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

	µg/l	Popolazione Generale: < 10.0 Soggetti Esposti: non sono presenti in letteratura valori di riferimento e valori correlabili con l'esposizione.

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Manganese Urine Fine Turno Urine F.T.	7181	ICP-MS	10-11 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

	µg/L	Popolazione Generale: 0.040 - 1.53 Soggetti Esposti: valore limite non proposto Valori di riferimento per la popolazione generale tratti da SIVR 2023

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Manganese Urine Inizio Turno Urine I.T.	7180	ICP-MS	10-11 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

	µg/L	Popolazione Generale: 0.040 - 1.53 Soggetti Esposti: valore limite non proposto Valori di riferimento per la popolazione generale tratti da SIVR 2023

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
MEDIASTINO - BIOPSIA MEDIASTINO AP-MEDIASTINO	IN10107		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
MEDIASTINO - ESCISSIONE NEOFORMAZIONE MEDIASTINO AP-MEDIASTINO	IN10108		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Mercurio Siero	**7250**	**assorbimento atomico**	**19-20 gg**	

ALTA SPECIALISTICA

Non inviare provette contenenti mertiolato (es. LDM)

VALORI DI RIFERIMENTO

	µg/L	< 15,0

MERCURIO Urine 24 ore Urine 24h	**7251**	**ICP-MS**	**11-12 gg**	

ALTA SPECIALISTICA

ACCETTARE CONTESTUALMENTE AL CODICE 790 CREATININA URINE INIZIO TURNO

VALORI DI RIFERIMENTO

	µg/24h	< 20,0

MERCURIO Urine Fine Turno Urine F.T.	**7253**	**ICP-MS**	**11-12 gg**	

ALTA SPECIALISTICA

ACCETTARE CONTESTUALMENTE AL CODICE 791 CREATININA URINE FINE TURNO

VALORI DI RIFERIMENTO

Mercurio Urinario/ Creatinina F.T.	µg/g crea	Soggetti Esposti: < 20,0 (ACGIH 2021)
Ut-Mercurio	µg/L	

MERCURIO Urine Inizio Turno Urine I.T.	**7252**	**ICP-MS**	**11-12 gg**	

ALTA SPECIALISTICA

ACCETTARE CONTESTUALMENTE AL CODICE 790 CREATININA URINE INIZIO TURNO

VALORI DI RIFERIMENTO

Mercurio Urinario/ Creatinina I.T.	µg/g crea	Soggetti Esposti: < 20,0 (ACGIH 2021)
Ut-Mercurio	µg/L	

Metabolismo dei carboidrati Materiale Vario	**60141**		**7 gg**	

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi allegato

Metabolismo dei lipidi Materiale Vario	**60140**		**7 gg**	

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi allegato

Metabolismo del Fruttosio Materiale Vario	**60172**		**7 gg**	

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi allegato

Metabolismo della nicotina Materiale Vario	**60144**		**7 gg**	

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi allegato

VADEMECUM GENERALE

M

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Metabolismo dell'alcool Materiale Vario	60143		7 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi allegato

Metabolismo delle Vitamine Materiale Vario	60152		7 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi allegato

Metabolismo dell'Omocisteina Materiale Vario	60166		7 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi allegato

Metabolismo Folati Materiale Vario	60129		7 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi allegato

Metabolismo Vitamina D Materiale Vario	60130		7 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi allegato

Metaboliti reattivi dell'ossigeno (Radicali liberi) Siero	639	SPETTROFOTOMETRICO	6 gg	

ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

U CARR.	250-300 Normale 301-320 Stress ossidativo borderline 321-340 Stress ossidativo lieve 341-400 Stress ossidativo medio 401-600 Stress ossidativo elevato

Metadone matrice pilifera - Valenza clinica Matrice Pilifera	1085CL	LC-MS-MS	30 gg	

TOSSICOLOGIA

Il sabato è da escludere dal conteggio dei 10 giorni di refertazione. Per lesecuzione di questo esame è necessario inviare i campioni con catena di custodia.
Per ulteriori chiarimenti contattare il laboratorio.

VALORI DI RIFERIMENTO

Metadone matrice pilifera - Valenza Medico Legale Matrice Pilifera	1085	LC-MS-MS	30 gg	

TOSSICOLOGIA

Il sabato è da escludere dal conteggio dei 10 giorni di refertazione. Per lesecuzione di questo esame è necessario inviare i campioni con catena di custodia.
Per ulteriori chiarimenti contattare il laboratorio.

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Metadone matrice urinaria - Valenza clinica Urine	6671CL	immunoenzimatico	1-2 gg	TOSSICOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Metadone matrice urinaria
Interpretaizone — Negativo (Cut off: 300 ng/mL)

Metadone matrice urinaria - Valenza Legale Urine	6671	immunoenzimatico	1-2 gg	TOSSICOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo (Cut off: 300 ng/mL)

Metadone test di conferma su urine Urine	6354	LC-MS-MS	20-21 gg	TOSSICOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Metaemoglobina Sangue intero Li-Eparina Cerba	721	Potenziometria ionoselettiva	3 gg	ALTA SPECIALISTICA SERVICE

VALORI DI RIFERIMENTO

% Hb Totale — <5 (ACGIH 2024)

Metanefrina Urine 24H Urine 24h Acidificate	785	cromatografia liquida	12 gg	TOSSICOLOGIA

Prelevare un'aliquota di circa 10 ml di urina delle 24 h con l'indicazione della diuresi totale ed inviare in apposito contenitore di trasporto.
Risposta dopo 24 h.

VALORI DI RIFERIMENTO

µmol/24h — 0 - 2

METANOLO Urine Fine Turno Urine F.T.	7531	gascromatografico	10-11 gg	ALTA SPECIALISTICA

Utilizzare una provetta da 10 mL con fondo a U, da riempire completamente, chiusa e ben tappata, da inviare tale quale al laboratorio

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L — Soggetti esposti: < 15

METANOLO Urine Inizio Turno Urine I.T.	753	gascromatografico	10-11 gg	ALTA SPECIALISTICA

Utilizzare una provetta da 10 mL con fondo a U, da riempire completamente, chiusa e ben tappata, da inviare tale quale al laboratorio

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L — Soggetti esposti: < 15

Methotrexate Siero Siero	376	HPLC-MS/MS	10-11 gg	ALTA SPECIALISTICA

Proteggere dalla luce

Il prelievo non può essere effettuato in provette con gel separatore in quanto quest'ultimo può modificare il dosaggio del farmaco nel siero e quindi il risultato dell'esame effettuato con queste provette non è attendibile.

VALORI DI RIFERIMENTO

µmol/l — 0,01 - 5

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
METILETILCHETONE (MEK) Urine Fine Turno Urine F.T.	7360	HPLC	6 gg	ALTA SPECIALISTICA

Utilizzare una provetta da 10 mL con fondo a U, da riempire completamente, chiusa e ben tappata, da inviare tale quale al laboratorio

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/L	Popolazione generale: Assente Esposti : < 2 (ACGIH2021)

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
METILETILCHETONE (MEK) Urine Inizio Turno Urine I.T.	736	HPLC	6 gg	ALTA SPECIALISTICA

Utilizzare una provetta da 10 mL con fondo a U, da riempire completamente, chiusa e ben tappata, da inviare tale quale al laboratorio

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/L	Popolazione generale: Assente Esposti : < 2 (ACGIH2021)

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
METILISOBUTILCHETONE (MIBK) Urine Fine Turno Urine F.T.	7580	gascromatografico	10-11 gg	ALTA SPECIALISTICA

Utilizzare una provetta da 10 mL con fondo a U, da riempire completamente, chiusa e ben tappata, da inviare tale quale al laboratorio

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/L	Soggetti esposti: < 1,00 (ACGIH 2021)

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
METILISOBUTILCHETONE (MIBK) Urine Inizio Turno Urine I.T.	758	gascromatografico	10-11 gg	ALTA SPECIALISTICA

Utilizzare una provetta da 10 mL con fondo a U, da riempire completamente, chiusa e ben tappata, da inviare tale quale al laboratorio

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/L	Soggetti esposti: < 1,00 (ACGIH 2021)

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Miceti in campioni biologici diversi esame colturale Matrice Pilifera, Squame cutanee, Unghie, Materiale Vario	B509		25-26 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Miceti in campioni biologici diversi esame colturale II Cam <multi materiale>	B5092		25-26 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Miceti in campioni biologici diversi esame colturale III Cam <multi materiale>	B5093		25-26 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Miceti in campioni biologici diversi ricerca microscopica <multi materiale>	B5101		18-19 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
MICOBATTERI SU ESPETTORATO Espettorato	BKES	COLTURALE	45 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Microalbuminuria Urine Mattino	259	IMMUNOTURBIDIMETRIA	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/g creatinina
< 9 Normale
10 - 29 Pre-microalbuminuria
30 - 300 Microalbuminuria
> 300 Macroalbuminuria

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Microalbuminuria (Urine 24 h) Urine 24h	2590	IMMUNOTURBIDIMETRIA	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/24h
< 30 Normoalbuminuria
30 - 299 Microalbuminuria
≥ 300 Macroalbuminuria

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Microalbuminuria II Camp. Urine Mattino	2592	IMMUNOTURBIDIMETRIA	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/g creatinina
< 9 Normale
10 - 29 Pre-microalbuminuria
30 - 300 Microalbuminuria
> 300 Macroalbuminuria

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Microalbuminuria III Camp. Urine Mattino	2593	IMMUNOTURBIDIMETRIA	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/g creat.
< 9 Normale
10 - 29 Pre-microalbuminuria
30 - 300 Microalbuminuria
> 300 Macroalbuminuria

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Microbioma patogeno orale Materiale Vario	60147		7 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi allegato

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Microbioma vaginale Materiale Vario	60149		7 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi allegato

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Microdelezioni Cromosoma Y Sangue Inter EDTA	GENE036		20-21 gg	GENETICA

VALORI DI RIFERIMENTO

MIDOLLO OSSEO - MIDOLLO OSSEO APPOSIZIONE/STRISCI AP-M.OSSEO	IN10096		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO
Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

MIDOLLO OSSEO - BIOPSIA OSTEOMIDOLLARE AP-M.OSSEO	IN10095		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO
Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

MILZA - AGOBIOPSIA MILZA AP-MILZA	IN10109		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO
Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

MILZA - SPLENECTOMIA AP-MILZA	IN10110		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO
Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

MILZA - SPLENECTOMIA PER PATOLOGIA TRAUMATICA AP-MILZA	IN10111		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO
Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Minerali: Zinco e Ferro Materiale Vario	60153		7 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi allegato

Mioglobina Siero	119	elettrochemiluminescence	3 gg	SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL Maschi: 26,0 - 72,0 Femmine: 25,0 - 58,0

Mioglobina Urinaria Urine 24h	1190	CHEMILUMINESCENZA	4 gg	SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

ug/L < 21

Molibdeno Urinario Fine Turno Urine F.T.	2103	assorbimento atomico	16-17 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/g crea Popolazione generale: < 60
Soggetti esposti: valori non proposti

Molibdeno Urinario Inizio Turno Urine I.T.	2102	assorbimento atomico	16-17 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/g crea Popolazione generale: < 60
Soggetti esposti: valori non proposti

Mono Test (MNI) Siero	107	Immunocromatografico	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

Monoidrossicarbazepina (Tolep) Plasma Eparinato	6740	HPLC	3 gg	TOSSICOLOGIA

La provetta di siero non deve avere gel separatore.

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L Soggetti in terapia :
10,0 - 35,0

MTHFR mutazione A1298C Sangue Inter EDTA	GENE098		20-21 gg	GENETICA

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Multi-Drug Resistence Materiale Vario	MDR1		7 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi allegato

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Musk Abs Siero	6235	ELISA	34-35 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL 0,00 - 0,40

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
My Food Profile Advanced - 216 alimenti Siero	MYFOOD3		7 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
My Food Profile Extended - 108 alimenti Siero	MYFOOD2		7 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
My Food Profile Mediterraneo Basic - 54 alimenti Siero	MYFOOD1		7 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Mycoplasma e Ureaplasma DNA (PCR) Liquido Seminale, Secreto Prostatico, Tampone endocervicale, Tampone Uretrale, Urine I mitto, Materiale Vario	MYUR	PCR REAL TIME	1-2 gg	GENETICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Materiale:

Mycoplasma Hominis PCR	Non rilevato
Mycoplasma Genitalium PCR	Non rilevato
Ureaplasma Parvum PCR	Non rilevato
Ureaplasma Urealyticum PCR	Non rilevato

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
N- METILACETAMMIDE Urine Fine Turno Urine F.T.	1258	gascromatografico	13-14 gg	ALTA SPECIALISTICA

ACCETTARE CONTESTUALMENTE AL CODICE 791 CREATININA URINE FINE TURNO

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/g creat. < 30

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
NASO - BIOPSIA CAVITA' NASALI (SING.) AP-NASO	IN10112		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO
Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
NASO - ETMOIDECTOMIA AP-NASO	IN10113		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO
Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
NASO - POLIPECTOMIA NASALE (SING.) AP-NASO	IN10114		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO
Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
NASO - RESEZIONE DEI TURBINATI AP-NASO	IN10115		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO
Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
NASO - RESEZIONE DEL SETTO NASALE AP-NASO	IN10116		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO
Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
NASO - RESEZIONE ETMOIDO-MASCELLARE AP-NASO	IN10117		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO
Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
NASO - RESEZIONE ETMOIDO-MASCELLARE CON EXENTERATIO ORBITAE AP-NASO	IN10118		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
NASO - RESEZIONE MASCELLARE CON SVUOTAMENTO LINFONODALE AP-NASO	IN10119		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Neisseria Gonorrhoeae DNA Liquido Seminale, Secreto Prostatico, Tampone endocervicale, Tampone Uretrale, Urine I mitto, Materiale Vario Se eseguito su tampone utilizzare quello con tappo rosa. Se il campione è prelevato da uretra utilizzare quello con tappo arancione	1659	PCR REAL TIME	1-2 gg	GENETICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Materiale :
Esito : Non Rilevato

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Neisseria gonorrhoeae esame colturale Liquido Seminale, Secreto endocervicale, Secreto Prostatico, Secreto Uretrale, Sperma, Tampone Anale, Tampone Faringeo, Tampone Rettale, Tampone Vaginale	B583		4-5 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

COLTURALE
Identificazione
Carica
Beta lattamasi
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Neisseria gonorrhoeae esame colturale II campione <multi materiale>	B5831		5-6 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Materiale
COLTURALE
Identificazione

Carica batterica
Identificazione
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
NICHEL Sierico Siero	723	ICP-MS	10-11 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L	< 2,0	

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Nichel Urine 24 ore Urine 24h	7151	ICP-MS	10-11 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/24h	< 30,0	

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Nichel Urine Fine Turno Urine F.T.	71509	ICP-MS	10-11 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L	Soggetti esposti a Nichel elementare e composti poco solubili : < 5 (ACGIH 2024) Soggetti esposti a composti di Nichel solubili : < 30 (ACGIH 2024)

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Nichel Urine Inizio Turno Urine I.T.	7159	ICP-MS	10-11 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L	Soggetti esposti a Nichel elementare e composti poco solubili : < 5 (ACGIH 2024) Soggetti esposti a composti di Nichel solubili : < 30 (ACGIH 2024)

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
N-METILACETAMMIDE Urine Inizio Turno Urine I.T.	1257	gascromatografico	12-13 gg	ALTA SPECIALISTICA

ACCETTARE CONTESTUALMENTE AL CODICE 790 CREATININA URINE INIZIO TURNO

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/g creat.	< 30

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Normetanefrina urine 24 H acide Urine 24h	786	cromatografia liquida	10 gg	TOSSICOLOGIA

Prelevare un'aliquota di circa 10 ml di urina delle 24 h con l'indicazione della diuresi totale ed inviare in apposito contenitore di trasporto.
Risposta dopo 24 h.

VALORI DI RIFERIMENTO

µmol/24h	0,01 - 2,13

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
NSE (enolasi neuronale specifica) Siero	6519	CLIA	3 gg	SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

ug/L	< 10,0

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Numero di dibucaina Siero	3000	COLORIMETRICO	3-4 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

%	Soggetti normali: 70 - 90 % Soggetti eterozigoti: 30 - 70 % Soggetti omozigoti: < 20%

OCCHIO - ASPORTAZIONE GHIANDOLA LACRIMALE AP-OCCHIO	IN10120		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

OCCHIO - BIOPSIA BULBO OCULARE AP-OCCHIO	IN10121		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

OCCHIO - BIOPSIA CONGIUNTIVALE AP-CONGIUNTIVA	IN10099		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

OCCHIO - BIOPSIA GHIANDOLA LACRIMALE AP-OCCHIO	IN10122		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

OCCHIO - BULBO OCULARE - ENUCLEAZIONE SEMPLICE AP-OCCHIO	IN10123		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
OCCHIO - ESCISSIONE NEOFORMAZIONE GHIANDOLA LACRIMALE AP-OCCHIO	IN10124		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
OCCHIO - EXENTERATIO ORBITAE AP-OCCHIO	IN10125		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Omega2 - Acidi grassi frazionati Plasma EDTA Cong al Buio	4035	gascromatografico	14-15 gg	ALTA SPECIALISTICA SERVICE

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Omocisteina Siero	6301	CLIA	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

µmol/L	< 15 15-30 iperomocisteina moderata	

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Oppiacei matrice pilifera - Valenza clinica Matrice Pilifera	1086CL	LC-MS-MS	30 gg	TOSSICOLOGIA

Il sabato è da escludere dal conteggio dei 10 giorni di refertazione.
Eseguire il prelievo secondo procedura ed inviare i campioni con catena di custodia.
Per ulteriori chiarimenti contattare il laboratorio.

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Oppiacei matrice pilifera - Valenza Medico Legale Matrice Pilifera	1086	LC-MS-MS	30 gg	TOSSICOLOGIA

Il sabato è da escludere dal conteggio dei 10 giorni di refertazione. Per lesecuzione di questo esame è necessario inviare i campioni con catena di custodia.
Per ulteriori chiarimenti contattare il laboratorio.

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Oppiacei matrice urinaria - Valenza clinica Urine	668CL	immunoenzimatico	1-2 gg	TOSSICOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Oppiacei matrice urinaria	
Interpretazione	Negativo (Cut off: 300 ng/mL)

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Oppiacei matrice urinaria - Valenza Legale Urine	668	immunoenzimatico	1-2 gg	TOSSICOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo (Cut off: 300 ng/mL)

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Oppiacei test di conferma su urine Urine	6355	Cromat. Liq. - Spettrometria di massa	20-21 gg	TOSSICOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ORTO-CRESOLO Urine Fine Turno Urine F.T.	70810	HPLC	6 gg	TOSSICOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ORTO-CRESOLO Urine/Creatinina F.T.	mg/g crea	Soggetti Esposti a Toluene :< 0,30 (ACGIH 2021)
Creatininuria	g/L	0,3 - 3,0
ORTO CRESOLO Urinario	mg/L	

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ORTO-CRESOLO Urine Inizio Turno Urine I.T.	7081	HPLC	6 gg	TOSSICOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ORTO-CRESOLO Urine/Creatinina I.T.	mg/g crea	Soggetti Esposti a Toluene :< 0,30 (ACGIH 2021)
Creatininuria	g/L	0,3 - 3,0
ORTO CRESOLO Urinario	mg/L	

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Osmolalità sierica Siero	7841	CALCOLO DERIVATO	1-2 gg	ANALISI

Provetta dedicata e tappata

VALORI DI RIFERIMENTO

	mOsm/L	270,00 - 300,00

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Osmolalità urinaria Urine	7842	CALCOLO DERIVATO	1 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

	mOsm/L	50 - 1.200

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Ossalati urine 24H Urine 24h Acidificate	6352	cromatografia liquida	10 gg	TOSSICOLOGIA

La raccolta del campione di urine delle 24 h prevede l' acidificazione delle urine stesse. L' acidificazione viene effettuata versando nel recipiente, prima di iniziare la raccolta, circa 5 ml di HCl 5 M per ogni litro di urina (4 cucchiai di acido muriatico del commercio). Prelevare un'aliquota di circa 10 ml di urina delle 24 h acidificata con l'indicazione della diuresi totale ed inviare in apposito contenitore di trasporto.

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/24h	10,0 - 40,0

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Ossalati urine Fine Turno Urine F.T.	6351	cromatografia liquida	10 gg	TOSSICOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L Popolazione Generale: < 50.0

Ossalati urine Inizio Turno Urine I.T.	6350	cromatografia liquida	10 gg	TOSSICOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L Popolazione Generale: < 50.0

OSSO - ASPORTAZIONE DI NEOFORMAZIONE OSSO AP-OSSO	IN10126		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

OSSO - BIOPSIA INCISIONALE OSSO AP-OSSO	IN10127		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

OSSO - EMIMANDIBOLECTOMIA (CON LINFOADENECTOMIA) AP-OSSO	IN10128		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

OSSO - RESEZIONE SEGMENTARIA AP-OSSO	IN10129		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
OSSO - TESTA FEMORALE ESCISSA PER ESECUZIONE PROTESI	**IN10130**		**20 gg**	

AP-OSSO

ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Osteocalcina	**6411**	**elettrochemiluminescenza**	**6 gg**	

Siero congelato

ALTA SPECIALISTICA

Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

VALORI DI RIFERIMENTO

	µg/l	Donne: 13,0-48,0 Pazienti con osteoporosi 11,0-43,0 nella fase Premenopausa 15,0-46,0 nella fase Postmenopausa Uomini: 24-70 Da anni 18 ad anni 29 14-42 Da anni 30 ad anni 50 14-46 Anni >= 51

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
OVAIO - ANNESSIECTOMIA MONO/BILAT ALLARGATA	**IN10131**		**20 gg**	

AP-OVAIO

ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
OVAIO - BIOPSIA E/O RESEZIONE CUNEIFORME OVAIA	**IN10132**		**20 gg**	

AP-OVAIO

ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
OVAIO - BIOPSIA OVARICA	**IN10133**		**20 gg**	

AP-OVAIO

ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
OVAIO - OVARIECTOMIA ALLARGATA (UTERO, OMENTO, LINFONODI) AP-OVAIO	IN10135		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
OVAIO - OVARIECTOMIA BILATERALE AP-OVAIO	IN10134		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
OVAIO - OVARIECTOMIA MONOLATERALE CON O SENZA SALPINGECTOMIA AP-OVAIO	IN10136		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
P.S.A. Siero	6514	CHEMILUMINESCENZA	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL	< 4,00	

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
PANCREAS - AGOBIOPSIA PANCREAS AP-PANCREAS	IN10137		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
PANCREAS - CAUDECTOMIA AP-PANCREAS	IN10138		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
PANCREAS - DUODENO-CEFALOPANCREASECTOMIA AP-PANCREAS	IN10139		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
PANCREAS - RESEZIONE PARZIALE PANCREAS AP-PANCREAS	IN10140		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Pannello STI 3 patogeni PCR Liquido Seminale, Secreto Prostatico, Tampone endocervicale, Tampone Uretrale, Urine I mitto, Materiale Vario	601122	PCR REAL TIME	3-4 gg	GENETICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Ricerca eseguita su:

MYCOPLASMA HOMINIS RICERCA DIRETTA	Non Rilevato
UREAPLASMA PARVUM RICERCA DIRETTA	Non Rilevato
UREAPLASMA UREALYTICUM RICERCA DIRETTA	Non Rilevato

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Pannello STI 4 patogeni PCR Liquido Seminale, Secreto Prostatico, Tampone endocervicale, Tampone Uretrale, Urine I mitto, Materiale Vario	601121	PCR REAL TIME	3-4 gg	GENETICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Ricerca eseguita su:

CHLAMYDIA TRACHOMATIS RICERCA DIRETTA	Non Rilevato
NEISSERIA GONORRHOEAE RICERCA DIRETTA	Non Rilevato
TRICHOMONAS VAGINALIS RICERCA DIRETTA	Non Rilevato
MYCOPLASMA GENITALIUM RICERCA DIRETTA	Non Rilevato

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Pannello STI 7 patogeni PCR Liquido Seminale, Secreto Prostatico, Tampone endocervicale, Tampone Uretrale, Urine I mitto, Materiale Vario	60112	PCR REAL TIME	3-4 gg	GENETICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Ricerca eseguita su:

CHLAMYDIA TRACHOMATIS RICERCA DIRETTA	Non Rilevato
NEISSERIA GONORRHOEAE RICERCA DIRETTA	Non Rilevato
TRICHOMONAS VAGINALIS RICERCA DIRETTA	Non Rilevato
MYCOPLASMA GENITALIUM RICERCA DIRETTA	Non Rilevato
MYCOPLASMA HOMINIS RICERCA DIRETTA	Non Rilevato
UREAPLASMA PARVUM RICERCA DIRETTA	Non Rilevato
UREAPLASMA UREALYTICUM RICERCA DIRETTA	Non Rilevato

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Pannello Trombofilia 3 Mutazioni (Fattore V di Leiden; Fattore II; MTHFR C677T) Sangue Inter EDTA	GENE100	PCR REAL TIME	20-21 gg	GENETICA

VALORI DI RIFERIMENTO

ESITO:
ESITO:
ESITO:

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
PAPP-A Siero	8971	Tecnologia Trace	5 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

	UI/L	Donne non gravide: <0.10 Donne gravide per settimana di gestazione: 11°: 0.63 - 3.98 12°: 1.04 - 6.56 13°: 1.54 - 9.73 14°: 2.06 - 13.00

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
PARAGANGLI - ASPORTAZIONE CHIRURGICA PARAGANGLI AP-PARAGANGLI	IN10141		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
PARAGANGLI - ASPORTAZIONE PER PATOLOGIA NEOPLASTICA AP-PARAGANGLI	IN10142		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
PARATIROIDE - BIOPSIA O AGOBIOPSIA PARATIROIDE AP-PARATIROIDE	IN10143		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
PARATIROIDE - BIOPSIA PARATIROIDI (SING.) AP-PARATIROIDE	IN10144		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
PARATIROIDE - PARATIROIDECTOMIA AP-PARATIROIDE	IN10145		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

Paratormone (PTH) Siero	641	CHEMILUMINESCENZA	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

pg/mL 12,0 - 72,0

PARVOVIRUS B19 Sangue Inter EDTA	538	REAL TIME PCR	2-3 gg	GENETICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Copie/mL Non Rilevato

Patologie genetiche cani e gatti Materiale Vario	60154		7 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi allegato

PENE - AMPUTAZIONE PENE AP-PENE	IN10147		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

PENE - BIOPSIA PENE AP-PENE	IN10148		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

Pepsinogeno I (PG I) Siero	900	CLIA	7-8 gg	SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL 30,0 - 160,0

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Pepsinogeno II (PG II) Siero	901	CLIA	7-8 gg	SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL 3,0 - 15,0

Peptide C Siero	618	CHEMILUMINESCENZA	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL 0,81 - 3,85

Peptide C Post Prandiale Siero	1382	CHEMILUMINESCENZA	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL

Percentuale di saturazione della Transferrina Siero	3321	CALCOLO DERIVATO	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

% 20 - 40

PERCLOROETILENE Ematico Sangue Intero Eparinato	769	gascromatografico	16-17 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L < 500

PERCLOROETILENE Urine Fine Turno Urine F.T.	7691	gascromatografico	20-21 gg	ALTA SPECIALISTICA

Utilizzare una provetta da 10 mL con fondo a U, da riempire completamente, chiusa e ben tappata, da inviare tale quale al laboratorio

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L Esposti: fino a 500

PERCLOROETILENE Urine Inizio Turno Urine I.T.	7690	gascromatografico	20-21 gg	ALTA SPECIALISTICA

Utilizzare una provetta da 10 mL con fondo a U, da riempire completamente, chiusa e ben tappata, da inviare tale quale al laboratorio

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L Esposti: fino a 500

Performance di Potenza Materiale Vario	60168		7 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi allegato

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
PERICARDIO - BIOPSIA AP-PERICARDIO	IN10149		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
PERITONEO - BIOPSIA DI MASSA INTRAADDOMINALE AP-PERITONEO	IN10151		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
PERITONEO - BIOPSIA PERITONEALE AP-PERITONEO	IN10152		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
PERITONEO - OMENTECTOMIA AP-PERITONEO	IN10153		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
PERITONEO - SACCO ERNIARIO AP-PERITONEO	IN10154		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Phenobarbital (Gardenale) Siero Cerba	670	CEDIA	3 gg	TOSSICOLOGIA SERVICE

Il prelievo non può essere effettuato in provette con gel separatore in quanto quest'ultimo può modificare il dosaggio del farmaco nel siero e quindi il risultato dell'esame effettuato con queste provette non è attendibile.

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/mL	Intervallo terapeutico : 15 - 40 > 50 Tossicità

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Piano di allenamento personalizzato Materiale Vario	**60165**		**7 gg**	

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi allegato

Piastrine in citrato Sangue Intero Citratato	**004**	**IMPEDENZIOMETRICO**	**1-2 gg**	**ANALISI**

VALORI DI RIFERIMENTO

10^9/L 140 - 450

Piastrine in EDTA Sangue Inter EDTA	**004E**	**IMPEDENZIOMETRICO**	**1-2 gg**	**ANALISI**

VALORI DI RIFERIMENTO

10^9/L 140 - 450

Piombemia Sangue Intero Eparinato	**700**	**ICP-MS**	**10-11 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/dL Soggetti esposti: < 60 µg/dl
Lavoratrici in età fertile: < 40 µg/dl
(D.Lgs. 81/2008)

PIOMBO Urine 24 ore Urine 24h	**702**	**ICP-MS**	**10-11 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/24h Esposizione professionale: < 150

PIOMBO Urine Fine Turno Urine F.T.	**7011**	**ICP-MS**	**10-11 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/g crea Esposizione professionale: < 150

PIOMBO Urine Inizio Turno Urine I.T.	**701**	**ICP-MS**	**10-11 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/g crea Esposizione professionale: < 150

Piridinolina totale urine Urine	**6322**	**gascromatografico**	**11 gg**	**TOSSICOLOGIA**

Risposta dopo 24 h

VALORI DI RIFERIMENTO

pmol/µmol creat. Maschi: 23 - 65 Femmine: 25 - 83

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Piruvatochinasi Eritrocitaria Sangue Inter EDTA	**295**	**phmetria differenziale**	**15 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

UI/g Hb 7,60 - 28,60

PLACENTA - PLACENTA, FUNICOLO E MEMBRANE AP-PLACENTA	**IN10155**	**microscopico**	**20 gg**	**ANATOMIA PATOLOGICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

PLASMINOGENO Plasma Citr. Congelato	**073**	**cromogenico**	**23-24 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

VALORI DI RIFERIMENTO

% 65 - 140

PLEURA - BIOPSIA PLEURA AP-PLEURA	**IN10156**		**20 gg**	**ANATOMIA PATOLOGICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

PLEURA - DECORTICAZIONE AP-PLEURA	**IN10157**		**20 gg**	**ANATOMIA PATOLOGICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

POLMONE - AGOBIOPSIA PLEURICA/POLMONARE AP-POLMONE	**IN10159**		**20 gg**	**ANATOMIA PATOLOGICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
POLMONE - AGOBIOPSIA PLEUROPOLMONARE TAC AP-POLMONE	IN10158		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO
Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
POLMONE - LOBECTOMIA POLMONARE SEMPLICE AP-POLMONE	IN10160		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO
Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
POLMONE - PNEUMECTOMIA (CON O SENZA LINFOADENECTOMIA) AP-POLMONE	IN10161		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO
Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
POLMONE - PNEUMECTOMIA ALLARGATA AP-POLMONE	IN10162		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO
Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
POLMONE - RESEZIONE ATIPICA POLMONARE AP-POLMONE	IN10163		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO
Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
POLMONE - RESEZIONE SEGMENTARIA POLMONARE AP-POLMONE	IN10164		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO
Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE

Porfirine totali urine 24H — 7052 — HPLC — 11-12 gg

Urine 24h

ALTA SPECIALISTICA

Porre il campione in un contenitore scuro al riparo dalla luce (es. avvolgere la provetta con carta stagnola) e conservarlo a 2 – 8 °C

VALORI DI RIFERIMENTO

Uroporfirine	µg/24h	10,00 - 40,00
Eptacarbossiporfirine	µg/24h	2,20 - 14,00
Esacarbossiporfirine	µg/24h	< 0,83
Pentacarbossiporfirine	µg/24h	0,83 - 6,66

Porfobilinogeno urine 24H — 7051 — cromatografico colorimetrico — 9-10 gg

Urine 24h

ALTA SPECIALISTICA

Porre il campione in un contenitore scuro al riparo dalla luce (es. avvolgere la provetta con carta stagnola) e conservarlo a 2 – 8 °C

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/L	< 2

Potassiemia (K) — 242 — POTENZIOMETRIA INDIRETTA — 1-2 gg

Siero

ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

	mmol/L	3,4 - 5,1

Potassio Urinario (K) (Urine 24 h) — 252 — POTENZIOMETRIA INDIRETTA — 1-2 gg

Urine 24h

ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

	mmol/24h	25 - 125

POTASSIO URINARIO SU CAMPIONE ESTEMPORANEO — 2246 — ELETTRODO IONE-SELETTIVO — 1-2 gg

Urine Estempor.

ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

	mmol/L	> 30

Potenziale biologico antiossidante — 6392 — ENZIMATICO COLORIMETRICO — 11 gg

Siero

ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

	µmol/L	> 2200 Valore ottimale 2000-2200 Valore di attenzione o Border Line 1800-2000 Stato di discreta carenza 1600-1800 Stato di carenza 1400-1600 Stato di forte carenza < 1400 Stato di fortissima carenza

Prealbumina (T.B.P.A.) — 2603 — immunoturbidimetrico — 4-5 gg

Siero

ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/dl	20 - 40

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Predisposizione al morbo celiaco - 16 marcatori Sangue Inter EDTA	GENE132		20-21 gg	GENETICA

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Predisposizione all'obesità Materiale Vario	60132		7 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi allegato

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Predisposizione genetica alla parodontite Materiale Vario	60148		7 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi allegato

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Predisposizione genetica all'Alopecia Materiale Vario	60134		7 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

AR 1
AR 2
EDA2R 1
EDA2R 2
SOD2 1
SOD2 2
Locus 20 1
Locus 20 2

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Primidone (Mysoline) Siec Cerba	673	HPLC	10 gg	TOSSICOLOGIA SERVICE

Il prelievo non può essere effettuato in provette con gel separatore in quanto quest'ultimo può modificare il dosaggio del farmaco nel siero e quindi il risultato dell'esame effettuato con queste provette non è attendibile.

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/mL	5 - 12 Concentrazione terapeutica > 15 Concentrazione tossica	

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ProBNP Siero	7980	CHEMILUMINESCENZA	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

pg/mL	Maschi: 0 - 75 anni: < 151,00 oltre i 76 anni: < 250,00	Femmine: 0 - 75 anni: < 164,00 oltre i 76 anni: < 576,00

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Procalcitonina Siero	353	CHEMILUMINESCENZA	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL	Rischio di sepsi severa o shock settico: < 0,50 Basso Rischio > 2 Alto Rischio

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Progesterone Plasmatico Siero	620	CLIA	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL	Maschi: 0,28 - 1,22	Femmine: Fase follicolare : 0,15 - 1,40 Fase ovulatoria : 4,44 - 28,03 Fase luteale : 3,34 - 25,56 Menopausa : < 0,73

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Progressive Retinal Atrophy Materiale Vario	PRA-PRCD		7 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi allegato

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Progressive Retinal Atrophy DACHSHUND Materiale Vario	PRA-RPGRIP		7 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi allegato

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Progressive Retinal Atrophy GS Materiale Vario	SLC4A3		7 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi allegato

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Prolattina Siero	617	CLIA	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL	Maschi: 2,1 - 17,7	Femmine: Donne : 2,8 - 29,2 Gravidanza : 9,7 - 208,5 Menopausa : 1,8 - 20,3

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Prolattina 120 minuti Siero	617120	CLIA	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL	Maschi: 2,1 - 17,7	Femmine: Donne : 2,8 - 29,2 Gravidanza : 9,7 - 208,5 Menopausa : 1,8 - 20,3

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Prolattina 150 minuti Siero	617150	CLIA	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL	Maschi: 2,1 - 17,7	Femmine: Donne : 2,8 - 29,2 Gravidanza : 9,7 - 208,5 Menopausa : 1,8 - 20,3

VADEMECUM GENERALE

P

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Prolattina 180 minuti Siero	617180	CLIA	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL	Maschi: 2,1 - 17,7	Femmine: Donne : 2,8 - 29,2 Gravidanza : 9,7 - 208,5 Menopausa : 1,8 - 20,3

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Prolattina 20 minuti Siero	61720	CLIA	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL	Maschi: 2,1 - 17,7	Femmine: Donne : 2,8 - 29,2 Gravidanza : 9,7 - 208,5 Menopausa : 1,8 - 20,3

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Prolattina 30 minuti Siero	61730	CLIA	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL	Maschi: 2,1 - 17,7	Femmine: Donne : 2,8 - 29,2 Gravidanza : 9,7 - 208,5 Menopausa : 1,8 - 20,3

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Prolattina 60 minuti Siero	61760	CLIA	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL	Maschi: 2,1 - 17,7	Femmine: Donne : 2,8 - 29,2 Gravidanza : 9,7 - 208,5 Menopausa : 1,8 - 20,3

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
PROLATTINA II Campione Siero	1367	CLIA	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL	Maschi: 2,1 - 17,7	Femmine: Donne : 2,8 - 29,2 Gravidanza : 9,7 - 208,5 Menopausa : 1,8 - 20,3

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
PROLATTINA III campione Siero	1368	CLIA	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL	Maschi: 2,1 - 17,7	Femmine: Donne : 2,8 - 29,2 Gravidanza : 9,7 - 208,5 Menopausa : 1,8 - 20,3

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
PROSTATA - AGOBIOPSIA PROSTATICA AP-PROSTATA	IN10165		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
PROSTATA - PROSTATECTOMIA (ENUCLEAZIONE, NODULECTOMIA) AP-PROSTATA	IN10166		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
PROSTATA - PROSTATECTOMIA EXTRAFASCIALE ALLARGATA AP-PROSTATA	IN10167		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
PROSTATA - RESEZIONE ENDOSCOPICA TRANSURETRALE (T.U.R.P.) AP-PROSTATA	IN10168	microscopico	20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Proteina C funzionale Plasma Citrato	070	Funzionale cromogenico	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

%	> 65	

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Proteina C Reattiva (PCR) Siero	101	IMMUNOTURBIDIMETRIA	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL	< 1,00	

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Proteina C Reattiva ad alta sensibilità Siero	**1010**	**IMMUNOTURBIDIMETRIA**	**1-2 gg**	**ANALISI**

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL	< 1,00	

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Proteina Cationica Eosinofila (ECP) Siero	**6653**	**chemiluminescenza**	**9-10 gg**	**ALTA SPECIALISTICA** **SERVICE**

Prelevare 10 ml di sangue intero; lasciare a temperatura ambiente per 60-120 min poi centrifugare per 10 min

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L	< 16,0	

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
PROTEINA LEGANTE IL RETINOLO Siero	**369**	**nefelometrico**	**5-6 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/l	31,0 - 72,0	

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Proteina S libera Plasma Citrato	**071**	**IMMUNOTURBIDIMETRIA**	**1-2 gg**	**ANALISI**

VALORI DI RIFERIMENTO

%	Maschi: 65 - 160	Femmine: Età fertile : 50 - 150 Menopausa : 65 - 160

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
PROTEINA S100 Siero	**439**	**CLIA**	**8-9 gg**	**SPECIALISTICA**

CONGELARE DOPO 24 ORE

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L	< 0,15	

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Proteine totali Siero	**2599**	**COLORIMETRICO**	**1-2 gg**	**ANALISI**

VALORI DI RIFERIMENTO

g/dL	5,7 - 8,2	

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Proteinuria (Urine 24 h) Urine 24h	**262**	**SPETTROFOTOMETRICO**	**1-2 gg**	**ANALISI**

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/24h	< 150	

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Proteinuria (Urine 24 h) II Campione Urine 24h	**2622**	**COLORIMETRICO**	**1-2 gg**	**ANALISI**

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/24h	< 80	

VADEMECUM GENERALE

P

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Proteinuria su campione estemporaneo Urine Estempor.	262SP	SPETTROFOTOMETRICO	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/dL	<150

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Prova di sterilità Piastra da contatto, Piastrine da PRP, Sangue Intero	B519		15 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Prova di Sterilità		
Identificazione		
Carica		
Commento		
Identificazione		
Carica		
Commento		
Identificazione		
Carica		
Commento		

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
PSA Reflex Siero	1181	CLIA	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

	ng/mL	< 4,00

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Quantiferon Kit Specifico	1951	CLIA	5 gg	INFETTIVOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

RISULTATO		Negativo
Commento:		
Risposta T - CD4 (TB1)	IU/mL	< 0,3500
Risposta T - CD4/CD8 (TB2)	IU/mL	< 0,3500
Controllo positivo (Mitogeno-Nil)	IU/mL	> 0,5000
Controllo negativo (Nil)	IU/mL	

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
RA Test Siero	102	IMMUNOTURBIDIMETRIA	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

	UI/mL	< 14

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Rame Urine 24h Urine 24h	8994	ICP-MS	10-11 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

	µg/24h	3 - 37

VADEMECUM GENERALE

R

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Rame Urine Fine Turno Urine F.T.	7241	ICP-MS	10-11 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/l < 60

Rame Urine Inizio Turno Urine I.T.	724	ICP-MS	10-11 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L < 60

Recettore solubile Interleuchina 2 Siero	429I2	chemiluminescenza	32-33 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/l 223 - 710

Recettore solubile Transferrina Siero	333	immunoturbidimetrico	13-14 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L 1,71 - 4,13

Regolazione del sonno Materiale Vario	60146		7 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi allegato

RENE - BIOPSIA RENALE AP-RENE	IN10169		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

RENE - NEFRECTOMIA RADICALE AP-RENE	IN10170		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
RENE - NEFRECTOMIA SEMPLICE AP-RENE	IN10171		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

RENE - RESEZIONE PARZIALE RENE AP-RENE	IN10172		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

RENINA DIRETTA IN CLINOSTATISMO Plasma EDTA congelato	6240	CLIA	6 gg	SPECIALISTICA

Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

Il paziente deve rimanere supino per almeno 2 ore.

VALORI DI RIFERIMENTO

µUI/ml	3,1 - 41,2	

RENINA DIRETTA IN ORTOSTATISMO Plasma EDTA congelato	624	CLIA	6 gg	SPECIALISTICA

Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

VALORI DI RIFERIMENTO

µUI/ml	4,2 - 45,6	

Resist. alla Proteina C attivata (APC-R) Plasma Citrato	072	COAGULATIVO	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

Ratio	> 1,50	

Resistenza articolare Materiale Vario	60170		7 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi allegato

Resistenza Osmotica Globulare Sangue Inter EDTA	024	SPETTROFOTOMETRICO	3 gg	SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Resistenza Osmotica Globulare	%	0 - 29
Resistenza Osmotica Globulare	%	> 71

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Reticolociti Sangue Inter EDTA	005	CITOMETRICO IN FLUORESCENZA	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

RETICOLOCITI	%	0,60 - 2,10
Reticolociti Val. Assoluto	10^9/L	34 - 102
IRF	%	2,7 - 13,8
RET-He	pg	29,3 - 35,4

RETTO - AMPUTAZIONE RETTO-SIGMA AP-RETTO	IN10173		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

RETTO - AMPUTAZIONE RETTO-SIGMA PIU' CUTE PERIANALE AP-RETTO	IN10174		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

RETTO - DIGERENTE BIOPSIA ENDOSCOPICA (SING.) AP-RETTO	IN10175		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

RETTO - POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA (SING.) AP-RETTO	IN10176		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

Ricerca Adenovirus Feci	587	IMMUNOCROMATOGRAFIA	1-2 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativa

VADEMECUM GENERALE

R

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Ricerca Adenovirus II campione Feci	5872	immunocromatografico	1-2 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativa

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Ricerca Adenovirus III campione Feci	5873	immunocromatografico	1-2 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativa

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Ricerca antigene Galattomannano di Aspergillus Siero	598	CHEMILUMINESCENZA	6 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL

Negativo: < 0,25

Dubbio: 0,25 - 0,49
Valutare l'esito in base alle condizioni cliniche del paziente. Effettuare follow up diagnostico.

Positivo: >= 0,50

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Ricerca Antigene Helicobacter Pylori FECI Feci	592	Immunodosaggio a Fluorescenza	1-2 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Ricerca Antigene Helicobacter Pylori II Camp. Feci	5922	Immunodosaggio a Fluorescenza	1-2 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL

< 2,5 negativo
>= 2,5 positivo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Ricerca Antigene Helicobacter Pylori III Camp. Feci	5923	Immunodosaggio a Fluorescenza	1-2 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL

< 2,5 negativo
>= 2,5 positivo

TOSCANA DIAGNOSTICA

VADEMECUM GENERALE

R

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Ricerca Miceti lievitiformi (Candida) nelle feci Feci	B590		5-6 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ESAME COLTURALE
Identificazione
Carica
Identificazione
Carica
Identificazione
Carica
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Ricerca Miceti lievitiformi (Candida) nelle feci II campione Feci	B5901		5-6 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ESAME COLTURALE
Identificazione
Carica
Identificazione
Carica
Identificazione
Carica
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Ricerca Miceti lievitiformi (Candida) nelle feci III campione Feci	B5902		5-6 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ESAME COLTURALE
Identificazione
Carica
Identificazione
Carica
Identificazione
Carica
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Ricerca Mycoplasmi - Ureaplasmi Urogenitali Liquido Seminale, Secreto endocervicale, Secreto Prostatico, Secreto Uretrale, Sperma, Urine	B584		3-4 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Materiale
COLTURALE
Ureaplasma urealyticum
Mycoplasma hominis

Identificazione
Carica batterica
Identificazione
Carica batterica
Commento

VADEMECUM GENERALE

R

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Ricerca Mycoplasmi - Ureaplasmi Urogenitali II campione Secreto endocervicale, Secreto Prostatico, Secreto Uretrale, Sperma, Urine	B5842		3-4 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Materiale
COLTURALE
Ureaplasma spp (urealyticum e parvum)
Mycoplasma hominis

Identificazione
Carica batterica
Identificazione
Carica batterica
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Ricerca Mycoplasmi - Ureaplasmi Urogenitali III campione Secreto endocervicale, Secreto Prostatico, Secreto Uretrale, Sperma, Urine	B5843		3-4 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Materiale
COLTURALE
Ureaplasma spp (urealyticum e parvum)
Mycoplasma hominis

Identificazione
Carica batterica
Identificazione
Carica batterica
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Ricerca rapida Streptococcus pyogenes su tampone faringeo Secreto faringeo	B503S	IMMUNOCROMATOGRAFICO	1-2 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Ricerca Rotavirus Feci	585	IMMUNOCROMATOGRAFIA	1-2 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativa

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
RICERCA S. AUREUS METICILLINO RESISTENTE Secreto Naso-Faringeo	MRSA	COLTURALE	1-2 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Materiale:
Colturale
Identificazione
Carica
Commento

VADEMECUM GENERALE

R

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Ricerca Streptococcus agalactiae Tampone Vagino-Rettale	B506		5 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

COLTURALE
Identificazione
Carica
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Rickettsia Conorii Abs IgG Siero	5320	IFA	8-9 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Titolo < 1:80 assenti

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Rickettsia Conorii Abs IgM Siero	5320M	IFA	8-9 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Titolo < 1:200 assenti

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Rilevazione COVID-19 (Tampone naso-faringeo) Secreto Naso-Faringeo	8758	PCR REAL TIME	1-2 gg	COVID-19

VALORI DI RIFERIMENTO

SARS-CoV-2 RNA
Numero passaporto

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
S.H.B.G. (Sex Hormone Binding Globulin) Siero	6190	CLIA	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

nmol/L	Maschi: 0 - 49 anni: 11,54 - 54,49 oltre i 50 anni: 17,33 - 71,50	Femmine: 0 - 49 anni: 17,90 - 138,26 oltre i 50 anni: 23,65 - 110,61	

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Scatolo Urinario Urine Mattino	8921S	HPLC	3 gg	TOSSICOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L < 10,0

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Scotch Test Feci	518	Microscopico	1-2 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

SCOTCH TEST I CAMPIONE Negativo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Scotch Test II campione Feci	5182	Microscopico	1-2 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

Scotch Test III campione Feci	5183	Microscopico	1-2 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

SELENIO Sangue intero Li-Eparina	757	ELISA	10-11 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L < 150

Sensibilità al Nichel Materiale Vario	60142		7 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi allegato

Sensibilità al sale Materiale Vario	60145		7 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi allegato

Serotonina Siero congelato	6303	HPLC	15-16 gg	ALTA SPECIALISTICA

Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L 80 - 160

Serotonina urine 24H Urine 24h	630	HPLC	12-13 gg	ALTA SPECIALISTICA

La raccolta del campione di urine delle 24 h prevede l' acidificazione delle urine stesse. L' acidificazione viene effettuata versando nel recipiente, prima di iniziare la raccolta, circa 5 ml di HCl 5 M per ogni litro di urina (4 cucchiai di acido muriatico del commercio) al fine di avere un pH a 4,00. Prelevare un'aliquota di circa 10 ml di urina delle 24 h acidificata, con l' indicazione della diuresi totale ed inviare in apposito contenitore di trasporto.
A partire dalle 48 ore precedenti l'inizio e per tutto il tempo di raccolta delle urine è necessario osservare una dieta priva dei seguenti alimenti: ananas, avocado, banane, kiwi, more, prugne rosse, melanzane, pomodori, frutta secca, caffè, tè, cioccolato. Durante questo periodo si consiglia, previa consultazione del medico, di evitare l'assunzione di farmaci, in caso contrario, è opportuno comunicare il nome dei farmaci assunti al momento dell'esame

VALORI DI RIFERIMENTO

µmol/24h 0,3 - 1,3

Sessaggio Molecolare Aviario Materiale Vario	60173		7 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi allegato

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Sideremia (Ferro Sierico) Siero	330	COLORIMETRICO	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/dL	Maschi: 65 - 175	Femmine: 50 - 170

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Sindrome di Gilbert Sangue Inter EDTA	1637	REAL TIME PCR	11-12 gg	GENETICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Sirolimus (Rapamune) (Rapamicina) Sangue Inter EDTA	499	LC-MS	7-8 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L	Limiti Valori terapeutici in funzione del tipo di trapianto e farmaci associati

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
SISTEMA NERVOSO - BIOPSIA A CIELO APERTO AP-SISTEMA NERVOSO	IN10178		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
SISTEMA NERVOSO - BIOPSIA STEREOTASSICA AP-SISTEMA NERVOSO	IN10179		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
SISTEMA NERVOSO - ESCISSIONE TUMORALE AP-SISTEMA NERVOSO	IN10180		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
SNP - BIOPSIA DI NERVO PERIFERICO AP-SNP	IN10181		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
SNP - ESCISSIONE DI NEOFORMAZIONE NERVO AP-SNP	IN10182		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
SNP - GANGLIECTOMIA SISTEMA NERVOSO PERIFERICO AP-SNP	IN10183		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Sodiemia (Na) Siero	241	POTENZIOMETRIA INDIRETTA	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

mmol/L	136 - 146

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Sodio urinario (Na) (Urine 24 h) Urine 24h	251	POTENZIOMETRIA INDIRETTA	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

mmol/24h	40 - 220

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
SODIO URINARIO SU CAMPIONE ESTEMPORANEO Urine Estempor.	2245	ELETTRODO IONE-SELETTIVO	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

mmol/L	> 20

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
SOMA - CONSULENZA CITOLOGICA AP-SOMA	IN10146	microscopico	20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Esito

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
SOMA - CONSULENZA ISTOLOGICA AP-SOMA	IN10076		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO
Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
SOMA - EGFR AP-SOMA	IN10025	microscopico	4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO
Notizie Cliniche
Esito

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
SOMA - PANNELLO LINFONODO (FINO A 6 IIC) AP-SOMA	IN10233	microscopico	20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO
Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
SOMA - PANNELLO RECETTORI DELLA MAMMELLA AP-MAMMELLA	IN10260	microscopico	20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO
Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
SOMA - PRELIEVO IN SEDE DI INTERVENTO COMPLESSO AP-SOMA	IN10023		4 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO
SOMA - PRELIEVO IN SEDE DI INTERVENTO COMPL — Vedi Allegato
Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
SOMA - VERSAMENTO/SECRETI/SCRAPING/BAL AP-SOMA	IN10192	microscopico	20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO
Notizie Cliniche
Esito

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Somatomedina C (IGF-1)	**642**	**CLIA**	**6-7 gg**	

Siero congelato

SPECIALISTICA

campione CONGELATO

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/l

Maschi:
0 - 3 anni: 15 - 189
4 - 6 anni: 47 - 231
7 - 9 anni: 55 - 222
10 - 13 anni: 95 - 460
14 - 18 anni: 211 - 512
19 - 22 anni: 112 - 395
23 - 37 anni: 84 - 298
38 - 53 anni: 64 - 238
oltre i 54 anni: 15 - 246

Femmine:
0 - 3 anni: 15 - 272
4 - 6 anni: 55 - 248
7 - 9 anni: 80 - 233
10 - 13 anni: 96 - 549
14 - 18 anni: 113 - 564
19 - 22 anni: 103 - 372
23 - 37 anni: 107 - 367
38 - 53 anni: 52 - 274
oltre i 54 anni: 17 - 244

Sordità congenita (GJB6/CX30) - Intero gene	**GENE038**		**20-21 gg**	

Sangue Inter EDTA

GENETICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Stagno urinario	**390**	**assorbimento atomico**	**22-23 gg**	

Urine

ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

ug/L

Popolazione generale:
non sono reperibili in letteratura valori di riferimento
Soggetti esposti:
non sono reperibili in letteratura valori correlabili con
un indice biologico di esposizione

Staphylococcus aureus Meticillino Resistente nel Tampone nasale con Antibiogramma	**B574**		**5-6 gg**	

Secreto Nasale

MICROBIOLOGIA

Utilizzare tampone Tappo Rosa per il prelievo del campione

VALORI DI RIFERIMENTO

COLTURALE
Identificazione

Carica batterica
Identificazione
Commento

STOMACO - DIGERENTE BIOPSIA ENDOSCOPICA (SING.)	**IN10193**		**20 gg**	

AP-STOMACO

ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
STOMACO - GASTRECTOMIA PARZIALE AP-STOMACO	IN10194		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO
Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
STOMACO - GASTRECTOMIA SUBTOTALE AP-STOMACO	IN10195		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO
Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
STOMACO - GASTRECTOMIA TOTALE AP-STOMACO	IN10196		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO
Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
STOMACO - GASTRECTOMIA TOTALE ALLARGATA AP-STOMACO	IN10197		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO
Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
STOMACO - GASTRORESEZIONE AP-STOMACO	IN10198		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO
Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
STOMACO - POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA (SING.) AP-STOMACO	IN10199		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO
Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Streptococcus Pneumoniae Ag urinario Urine	6198	Immunocromatografico	3-4 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativa

Strongyloides Stercoralis Abs Siero	1077	immunoenzimatico	12 gg	ALTA SPECIALISTICA

In caso di consegna tardiva al laboratorio il campione può essere conservato in un luogo fresco (2 - 8 °C) per un massimo di 14 giorni.
Per conservazioni maggiori ai 14 giorni congelare il campione a -20°C

VALORI DI RIFERIMENTO

< 8

SURRENE - AGOBIOPSIA SURRENE AP-SURRENE	IN10200		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

SURRENE - SURRENECTOMIA AP-SURRENE	IN10201		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

Tacrolimus (FK506) Sangue Inter EDTA	685	CLIA	8-9 gg	SPECIALISTICA SERVICE

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L < 18,0

Tampone Faringeo - Esame Colturale Meningococco Secreto faringeo	MENF		5-6 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

COLTURALE
Identificazione
Carica batterica
Ceppo Beta lattamasi
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Tampone faringeo con ricerca Streptococchi, Stafilococchi e Miceti Secreto faringeo	B5033		5-6 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

COLTURALE
Streptococcus pyogenes
Streptococcus beta emolitico (C e G)
Staphylococcus aureus
Miceti lievitiformi
Identificazione
Carica
Identificazione
Carica
Identificazione
Carica
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Tampone Faringeo esteso Secreto faringeo	B503E		6-7 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

COLTURALE
Streptococcus pyogenes
Streptococcus beta emolitico (C e G)
Streptococcus pneumoniae
Staphylococcus aureus
Enterobatteri, in particolare Escherichia coli
Pseudomonas aeruginosa
Hemophylus infleunzae
Branhamella catarrhalis
Miceti lievitiformi
Identificazione
Carica
Identificazione
Carica
Identificazione
Carica
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Tampone Nasale - Esame Colturale Meningococco Secreto Nasale	MENN		5-6 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

COLTURALE
Identificazione
Carica batterica
Ceppo Beta lattamasi
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
TBG (THYROXINE BINDING GLOBULIN) Siero	6140	CHEMILUMINESCENZA	7-8 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/mL 13,0 - 39,0

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Tempo di Protrombina (P.T.) Plasma Citrato	**016**	**Coagulativo**	**1-2 gg**	**ANALISI**

VALORI DI RIFERIMENTO

INR (International Normalised Ratio)	INR	0,8 - 1,2	Non in terapia
Ratio	Ratio	0,90 - 1,20	
Attività	%		
Tempo	Secondi		

TENUE - RESEZIONE ILEO COLICA (CON O SENZA LINFOADENECTOMIA) AP-TENUE	**IN10208**		**20 gg**	**ANATOMIA PATOLOGICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

TENUE - RESEZIONE SEGMENTARIA TENUE AP-TENUE	**IN10209**		**20 gg**	**ANATOMIA PATOLOGICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

Teofillina Siero	**678**	**immunoenzimatico**	**7-8 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

Il prelievo non può essere effettuato in provette con gel separatore in quanto quest'ultimo può modificare il dosaggio del farmaco nel siero e quindi il risultato dell'esame effettuato con queste provette non è attendibile.

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/mL	10 - 20	Concentrazione terapeutica
	> 20	Concentrazione tossica

TESSUTI MOLLI - AGOBIOPSIA TESSUTI MOLLI AP-T.MOLLI	**IN10202**		**20 gg**	**ANATOMIA PATOLOGICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

TESSUTI MOLLI - BIOPSIA ESCISS.TESSUTI MOLLI AP-T.MOLLI	**IN10204**		**20 gg**	**ANATOMIA PATOLOGICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
TESSUTI MOLLI - BIOPSIA INCIS.TESSUTI MOLLI AP-T.MOLLI	IN10205		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
TESSUTI MOLLI - ESCISSIONE ALLARGATA DI NEOFORMAZIONE TESSUTI MOLLI AP-T.MOLLI	IN10207		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Test di conferma per CRE Tampone Rettale	CCRE	immunocromatografico	3-4 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Test di gravidanza Urine Mattino	451	immunocromatografico	1 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Test di paternità - uso informativo (2 profili: padre-figlio/a) Kit Specifico	GENE150		20-21 gg	GENETICA

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Test di paternità - Valenza Legale Sang.Edta Cerba	PATLEG		22 gg	GENETICA SERVICE

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Test di suscettibilità per rischio di invecchiamento cutaneo Base Materiale Vario	60126		7 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi allegato

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Test di suscettibilità per rischio di invecchiamento cutaneo Evolution Materiale Vario	60127		7 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi allegato

Test microbiologico paradontite <multi materiale>	902		1 gg	

BIOLOGIA MOLECOLARE

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi allegato

TEST PRE-ECLAMPSIA (Dosaggio PLGF Plus e sFlt-1) Siero	1666		5 gg	

ALTA SPECIALISTICA

SERVICE

VALORI DI RIFERIMENTO

Placental Grow Factor (PLGF)	pg/mL	
Tirosin Chinasi 1fms-simile solubiles (sFlt -1)	pg/mL	
Rapporto sFlt -1/PLGF	Ratio	< 38,00

Predisposizione di esclusione per la settimana successiva

Rapporto sFlt -1/PLGF < 38

Test valido dalla 20a settimana

Test Prenatale - AURORA Sangue Inter EDTA	NIPT002	NGS	6 gg	

GENETICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

Test Prenatale - AURORA CARIOTIPO Sangue Inter EDTA	NIPT004	NGS	6 gg	

GENETICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi allegato

Test Prenatale - AURORA CARIOTIPO PLUS Sangue Inter EDTA	NIPT005	NGS	6 gg	

GENETICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi allegato

Test Prenatale - AURORA LIGHT Sangue Inter EDTA	NIPT001	NGS	6 gg	

GENETICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi allegato

VADEMECUM GENERALE

T

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Test Prenatale - AURORA PLUS Sangue Inter EDTA	NIPT003	NGS	6 gg	GENETICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi allegato

Test Rapido per ric. Dell'Antigene SARS-CoV-2 Secreto Naso-Faringeo	2200	IMMUNOCROMATOGRAFIA	1-2 gg	COVID-19

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

TESTICOLO - AGOBIOSPIA TESTICOLO AP-TESTICOLO	IN10210		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

TESTICOLO - BIOPSIA ANNESSI TESTICOLARI AP-TESTICOLO	IN10211		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

TESTICOLO - BIOPSIA BILATERALE TESTICOLO AP-TESTICOLO	IN10212		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

TESTICOLO - BIOPSIA TESTICOLARE AP-TESTICOLO	IN10213		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
TESTICOLO - EMASCULAZIONE AP-TESTICOLO	IN10214		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
TESTICOLO - ORCHIECTOMIA BILAT. PER CASTRAZIONE TERAPEUTICA AP-TESTICOLO	IN10215		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
TESTICOLO - ORCHIECTOMIA SEMPLICE AP-TESTICOLO	IN10216		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
TESTICOLO - ORCHIFUNICOLECTOMIA ALLARGATA AP-TESTICOLO	IN10217		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Testosterone libero Siero	6211	CLIA	1-2 gg	SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

pg/mL	Maschi 18-39 anni: 12.3-46.6 Maschi 40- 59 anni: 9.57-40.6 Maschi ≥60 anni: 7.72-31.4 Femmine 18-39 anni: ≤5.45 Femmine anni ≥40: ≤4.43

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Testosterone plasmatico Siero	621	CHEMILUMINESCENZA	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/dL

Uomini:
< 50 anni: 197,44 - 669,58
>=50 anni: 187,72 - 684,19

Donne:
< 50 anni: 8,38 - 35,01
>=50 anni: <7 - 35,92

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
TETRAIDROFURANO Urine Fine Turno Urine F.T.	79340	gascromatografico	17-18 gg	ALTA SPECIALISTICA

Utilizzare una provetta da 10 mL con fondo a U, da riempire completamente, chiusa e ben tappata, da inviare tale quale al laboratorio

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
TETRAIDROFURANO Urine Inizio Turno Urine I.T.	7934	gascromatografico	17-18 gg	ALTA SPECIALISTICA

Utilizzare una provetta da 10 mL con fondo a U, da riempire completamente, chiusa e ben tappata, da inviare tale quale al laboratorio

VALORI DI RIFERIMENTO

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
TIBC-Capacita' ferro legante totale Siero	3310	CALCOLO DERIVATO	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/dL Maschi: 261 - 462 Femmine: 265 - 497

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Tiocianati sierici Siero	6562	COLORIMETRICO	16 gg	TOSSICOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL

Fumatori: < 1,2
Non Fumatori: < 0,5

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
TIOCIANATI Urine Fine Turno Urine F.T.	65619	COLORIMETRICO	11 gg	TOSSICOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/g creatinina

Non esposti Non fumatori : < 3,2
Non esposti Fumatori : < 8,0

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
TIOCIANATI Urine Inizio Turno Urine I.T.	65609	COLORIMETRICO	11 gg	TOSSICOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/g creatinina

Non esposti, Non fumatori : < 3,2
Non esposti Fumatori : < 8,0

VADEMECUM GENERALE

T

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Tireoglobulina Siero	6141	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL 3,5 - 77,0

TIROIDE - AGOASPIRATO TIROIDE AP-TIROIDE	IN10219	Microscopico	20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Esito

TIROIDE - EMITIROIDECTOMIA AP-TIROIDE	IN10221		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

TIROIDE - NODULECTOMIA AP-TIROIDE	IN10222		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

TIROIDE - TIROIDECTOMIA ALLARGATA AP-TIROIDE	IN10223		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

TIROIDE - TIROIDECTOMIA TOTALE AP-TIROIDE	IN10224		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Tiroxina (T4) Siero	613	CLIA	7-8 gg	SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/dL	< 13,00

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Tiroxina libera (FT4) Siero	6130	CLIA	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/dL	0,89 - 1,76

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Titolo Antistafilolisinico (TAF) Siero	124	AGGLUTINAZIONE SU VETRINO	5 gg	SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

	Negativo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Titolo antistreptolisinico (TAS) Siero	100	IMMUNOTURBIDIMETRIA	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

UI/mL	Bambini età prescolare < 100 Bambini età scolare < 250 Adulti < 200

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Toluene Ematico Sangue intero Li-Eparina	774	gascromatografico	10-11 gg	ALTA SPECIALISTICA

UTILIZZARE PROVETTA BD TAPPO VERDE (LITIO EPARINA) PER TEST EMATICI (TIPOLOGIA VACUTAINER)

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L	< 0,02 (ACGIH 2024)

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Toluene Urine Fine Turno Urine F.T.	7741	gascromatografico	10-11 gg	ALTA SPECIALISTICA

Utilizzare provetta specifica di tipologia no vacutainer (cod. FL19627)

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L	< 0,03 (ACGIH 2024)

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Toluene Urine Inizio Turno Urine I.T.	7740	gascromatografico	10-11 gg	ALTA SPECIALISTICA

Utilizzare provetta specifica di tipologia no vacutainer (cod. SAP 500022713 TAPPO IN PLASTICA - PROVETTA FONDO A U)

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L	< 0,03 (ACGIH 2024)

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
TOPIRAMATO (Topamax) Siero	6967	Cromat. Liq. - Spettrometria di massa	8-9 gg	ALTA SPECIALISTICA

Il prelievo non può essere effettuato in provette con gel separatore in quanto quest'ultimo può modificare il dosaggio del farmaco nel siero e quindi il risultato dell'esame effettuato con queste provette non è attendibile.

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L	2,0 - 10,0

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Toxoplasma gondii DNA Sangue Inter EDTA	60080	PCR REAL TIME	2-3 gg	GENETICA

Il sangue intero in EDTA NON va congelato, bensì conservato a + 4°C.

VALORI DI RIFERIMENTO

Materiale:

Esito : Non Rilevato

Toxoplasma gondii IgG conferma Siero	11803	WESTERN BLOT	10-11 gg	ALTA SPECIALISTICA

Per una valutazione corretta, precisa ed affidabile del test di conferma è necessario richiedere contestualmente la determinazione di IgG e IgM.

VALORI DI RIFERIMENTO

TPA ANTIGENE POLIPEPTIDICO TISSUTALE Siero	6513	Elettrochemiluminescenza	3-4 gg	SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

U/L < 75,0

TPHA Siero	115	EMOAGGLUTINAZIONE	1-2 gg	INFETTIVOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

< 1:80 Negativo
>= 1:80 Positivo

TRACHEA - BIOPSIA ENDOBRONCHIALE (SING.) AP-TRACHEA	IN10225		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

TRACHEA - BIOPSIA TRACHEA AP-TRACHEA	IN10226		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

Transferrina Siero	332	IMMUNOTURBIDIMETRIA	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL Maschi: 215 - 365 Femmine: 250 - 380

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Trichomonas Vaginalis Ricerca antigene Secreto Uretrale, Secreto Vaginale, Urine	B6202	Microscopico	5 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Ricerca antigene TRICHOMONAS VAGINALIS
Materiale :

TRICLOROETANOLO (TCE) Urine Fine Turno Urine F.T.	7171	gascromatografico	10-11 gg	ALTA SPECIALISTICA

Utilizzare una provetta da 10 mL con fondo a U, da riempire completamente, chiusa e ben tappata, da inviare tale quale al laboratorio

VALORI DI RIFERIMENTO

TRICLOROETANOLO (TCE) Urine Inizio Turno Urine I.T.	717	gascromatografico	10-11 gg	ALTA SPECIALISTICA

Utilizzare una provetta da 10 mL con fondo a U, da riempire completamente, chiusa e ben tappata, da inviare tale quale al laboratorio

VALORI DI RIFERIMENTO

Trigliceridi Siero	323	ENZIMATICO COLORIMETRICO	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL Valore desiderabile <= 150

Triiodotironina (T3) Siero	612	CLIA	7-8 gg	SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL < 2,20

Triiodotironina libera (FT3) Siero	6120	CLIA	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

pg/mL 2,30 - 4,20

TRIPTASI Siero	6425	ELISA	15 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L < 11,4

TROPONINA I AD ELEVATA SENSIBILITA' Plasma Eparinato	1482	CHEMILUMINESCENZA	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

pg/mL < 45

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
TSH Siero	614	CHEMILUMINESCENZA	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

	µUI/mL	Maschi: 0 - 12 anni: 0,64 - 6,27 13 - 18 anni: 0,51 - 4,94 oltre i 19 anni: 0,55 - 4,78	Femmine: 0 - 12 anni: 0,64 - 6,27 13 - 18 anni: 0,51 - 4,94 oltre i 19 anni: 0,55 - 4,78

TSH Riflesso Siero	1177	CLIA	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

	µUI/mL	Maschi: 2 - 12 anni: 0,64 - 6,27 13 - 18 anni: 0,51 - 4,94 oltre i 19 anni: 0,55 - 4,78	Femmine: 2 - 12 anni: 0,64 - 6,27 13 - 18 anni: 0,51 - 4,94 oltre i 19 anni: 0,55 - 4,78

TUBA - BIOPSIA TUBA AP-TUBA	IN10227		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

TUBA - RESEZIONE BILATERALE (PER STERILIZZAZIONE) AP-TUBA	IN10228		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

TUBA - SALPINGECTOMIA AP-TUBA	IN10229		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

TUBA - SALPINGECTOMIA PER GRAVIDANZA EXTRAUTERINA AP-TUBA	IN10230		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Ureaplasma parvum DNA Liquido Seminale, Secreto Prostatico, Tampone endocervicale, Tampone Uretrale, Urine, Materiale Vario Se eseguito su tampone utilizzare quello con tappo rosa. Se il campione è prelevato da uretra utilizzare quello con tappo arancione	**8270**	**REAL TIME PCR**	**1-2 gg**	**GENETICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

Materiale :

Ureaplasma Parvum PCR	Non Rilevato

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
URETERE - RESEZIONE URETERALE AP-URETERE	**IN10231**		**20 gg**	**ANATOMIA PATOLOGICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
URETRA - RESEZIONE URETRALE AP-URETRA	**IN10232**		**20 gg**	**ANATOMIA PATOLOGICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Uricemia Siero	**230**	**ENZIMATICO COLORIMETRICO**	**1-2 gg**	**ANALISI**

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL	Maschi: 3,5 - 7,2	Femmine: Premenopausa : 2,6 - 6,0 Postmenopausa : 3,5 - 7,2

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Uricosuria (Urine 24 h) Urine 24h	**231**	**ENZIMATICO COLORIMETRICO**	**1-2 gg**	**ANALISI**

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/24h	250,00 - 750,00

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Uricosuria su campione estemporaneo Urine Estempor.	**2312**	**ENZIMATICO COLORIMETRICO**	**1-2 gg**	**ANALISI**

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
UTERO – BIOBSIA ENDOMETRIALE AP-UTERO	**IN10220**		**20 gg**	**ANATOMIA PATOLOGICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
UTERO - EVISCERAZIONE ANTERIORE UTERO AP-UTERO	IN10235		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO
Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
UTERO - EVISCERAZIONE POSTERIORE UTERO AP-UTERO	IN10236		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO
Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
UTERO - ISTERECTOMIA RADICALE PER NEOPLASIA AP-UTERO	IN10237		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO
Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
UTERO - ISTERECTOMIA SEMPLICE AP-UTERO	IN10238		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO
Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
UTERO - ISTEROANNESSIECTOMIA PER FIBROMATOSI AP-UTERO	IN10239		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO
Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
UTERO - MATERIALE ESPULSO SPONTANEAMENTE (UTERO) AP-UTERO	IN10240		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO
Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
UTERO - MIOMECTOMIA AP-UTERO	IN10241		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
UTERO – POLIPECTOMIA ENDOMETRIALE AP-UTERO	IN10234		5-7 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
UTERO - RASCHIAMENTO ENDOMETRIALE AP-UTERO	IN10242		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
UTERO - SPAZZOLATO ENDOMETRIALE AP-UTERO	IN10290		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
V.E.S. (Velocità di eritrosedimentazione) Sangue Inter EDTA	010	Fotometria capillare quantitativa	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

	mm/h	Maschi: 0 - 50 anni: 2 - 28 51 - 70 anni: 2 - 37 oltre i 71 anni: 3 - 46	Femmine: 0 - 50 anni: 2 - 37 51 - 70 anni: 2 - 39 oltre i 71 anni: 3 - 46

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
VAGINA - AMPUTAZIONE VAGINA AP-VAGINA	IN10243		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
VAGINA - BIOPSIA VAGINALE AP-VAGINA	IN10244		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
VAGINA - PAP TEST MONOSTRATO AP-VAGINA	IN10271		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Esito

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
VAGINA - PAP TEST VAGINALE (vetrino) AP-VAGINA	IN10272		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Esito

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Vancomicina Siero	6956	CINETICO	4 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L 10 - 20

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
VASO - BIOPSIA DI VASO ARTERIOSO AP-VASO	IN10245		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
VASO - BIOPSIA DI VASO VENOSO AP-VASO	IN10246		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
VASO - ESCISSIONE DI M.A.V. AP-VASO	IN10247		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
VASO - RESEZIONE DI VASO ARTERIOSO AP-VASO	IN10248		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
VASO - RESEZIONE DI VASO VENOSO AP-VASO	IN10249		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
VDRL/RPR Siero	4527	AGGLUTINAZIONE SU VETRINO	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

< 1:2 Negativo
>= 1:2 Positivo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Versamenti Cavitari (esame chimico-fisico) Versamento Cavitario	2970	MICROSCOPIA	1-2 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

Materiale in esame:	
Aspetto	
Colore	
Quantità	mL
pH	
Dopo Centrifugazione	
Proteine Totali	g/100 mL
Conteggio WBC	/µL
Conteggio RBC	/µL
Esame microscopico	

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
VESCICA - BIOPSIA ENDOSCOPICA VESCICALE (SING.) AP-VESCICA	IN10250		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
VESCICA - CISTECTOMIA PARZIALE AP-VESCICA	IN10251		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
VESCICA - CISTECTOMIA RADICALE ALLARGATA AP-VESCICA	IN10252		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
VESCICA - CISTECTOMIA SEMPLICE AP-VESCICA	IN10253		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
VESCICA - RESEZIONE ENDOSCOPICA TRANSURETRALE (T.U.R.V.) AP-VESCICA	IN10254		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Virus Respiratorio Sinciziale Abs IgA Siero	1157	ELISA	3-4 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Index	Negativo < 0,9 Dubbio 0,9 - 1,1 Positivo > 1,1

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Virus Respiratorio Sinciziale Abs IgG Siero	**1156**	**ELISA**	**3-4 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

Index	< 0,9 Negativo 0,9 - 1,1 Dubbio > 1,1 Positivo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Vitamina A Siero congelato al Buio	**6617**	**cromatografia liquida**	**10 gg**	**TOSSICOLOGIA**

Centrifugare rapidamente (entro 30 min) a temperatura ambiente, separare e congelare.
Proteggere dalla luce.

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L	0,30 - 0,70

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Vitamina B 12 Siero	**661**	**CHEMILUMINESCENZA**	**1 gg**	**ANALISI**

VALORI DI RIFERIMENTO

pg/mL	200 - 910

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Vitamina B1 Ematica Sangue Intero EDTA congelato	**396**	**HPLC**	**10 gg**	**TOSSICOLOGIA**

Proteggere dalla luce, congelare il sangue intero.

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L	32 - 95

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Vitamina B2 Ematica (Idrosolubile) Sangue Int. EDTA cong. Buio	**6614**	**cromatografia liquida**	**10 gg**	**TOSSICOLOGIA**

Proteggere dalla luce, congelare il sangue intero.

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L	137 - 370

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Vitamina B6 (Pyridoxal) (Idrosolubile) Sangue Int. EDTA cong. Buio	**66170**	**HPLC**	**10 gg**	**TOSSICOLOGIA**

Centrifugare rapidamente (entro 30 min) a temperatura ambiente, separare e congelare.
Proteggere dalla luce.

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L	8,7 - 27,2

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Vitamina C Siero congelato	**6612**	**HPLC**	**3 gg**	**TOSSICOLOGIA**

Centrifugare rapidamente (entro 30 min) a temperatura ambiente, separare e congelare.
Proteggere dalla luce.

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L	4,60 - 14,90

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Vitamina D (25 OH) Siero	**6610**	**CHEMILUMINESCENZA**	**1-2 gg**	**ANALISI**

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL	< 20 Carenza 20 - 30 Da valutare in base al contesto clinico 31 - 150 Livelli sufficienti > 150 Potenziale rischio di tossicità acuta	

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Vitamina D 1-25 Diidrossi Siero	**329**	**CHEMILUMINESCENZA**	**6-10 gg**	**SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/L	19,9 - 79,3	

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Vitamina E (Liposolubile) Siero congelato al Buio	**6611**	**cromatografia liquida**	**10 gg**	**TOSSICOLOGIA**

Centrifugare rapidamente (entro 30 min) a temperatura ambiente, separare e congelare.
Proteggere dalla luce.

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L	5,0 - 20,0	

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
VON WILLEBRAND ATTIVITA' Plasma Citr. Congelato	**462**	**coagulometrico**	**9-10 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

VALORI DI RIFERIMENTO

%	50,4 - 180	

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Von Willebrand Disease Materiale Vario	**VWD**		**7 gg**	

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi allegato

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
VULVA - ASPORTAZIONE DELLA GHIANDOLA DI BARTOLINI AP-VULVA	**IN10255**		**20 gg**	**ANATOMIA PATOLOGICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
VULVA - BIOPSIA VULVARE (SING.) AP-VULVA	**IN10256**		**20 gg**	**ANATOMIA PATOLOGICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
VULVA - VULVECTOMIA PARZIALE AP-VULVA	IN10257		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
VULVA - VULVECTOMIA RADICALE (CON LINFOADENECT. INGUINALE) AP-VULVA	IN10258		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
VULVA - VULVECTOMIA SEMPLICE AP-VULVA	IN10259		20 gg	ANATOMIA PATOLOGICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Notizie Cliniche
Macroscopica
Microscopica
Diagnosi

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
VZV DNA (Varicella Zoster virus) Sangue Inter EDTA	60085	REAL TIME PCR	15 gg	GENETICA

Il sangue intero in EDTA NON va congelato, bensì conservato a 2-8°C

VALORI DI RIFERIMENTO

Non rilevato

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Waaler-Rose Siero	103	immunologico	5 gg	ANALISI

VALORI DI RIFERIMENTO

UI/mL Negativo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Weil-Felix Siero	166	agglutinazione	5-6 gg	ALTA SPECIALISTICA

se negativo risposta dopo 24 h
se positivo risposta dopo 48 h

VALORI DI RIFERIMENTO

Proteus OX 2 < 1:80
Proteus OX 19 < 1:80
Proteus OX K < 1:80

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
West Nile Virus Abs IgG Siero	6203	immunoenzimatico	10-11 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
West Nile Virus Abs IgM Siero	**6204**	**immunoenzimatico**	**10-11 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

Widal-Wright Siero	**109**	**agglutinazione**	**5-6 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

Se negativo risposta dopo 24 h.
Se positivo risposta dopo 48 h.

VALORI DI RIFERIMENTO

Salmonella Typhi Ag H	< 1:40
Salmonella Typhi Ag O	< 1:40
Salmonella Paratyphi A Ag O	< 1:40
Salmonella Paratyphi B Ag H	< 1:40
Salmonella Paratyphi C Ag H	< 1:40
Brucella melitensis	< 1:40
Salmonella Paratyphi A Ag H	< 1:40
Salmonella Paratyphi B Ag O	< 1:40
Salmonella Paratyphi C Ag O	< 1:40

X-Fragile (FRAXA) Sangue Inter EDTA	**GENE040**		**20-21 gg**	**GENETICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

XILENE Urine Fine Turno Urine F.T.	**8974**	**gascromatografico**	**10-11 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/l Soggetti Esposti: < 100

XILENE Urine Inizio Turno Urine I.T.	**8973**	**gascromatografico**	**10-11 gg**	**ALTA SPECIALISTICA**

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/l Soggetti Esposti: < 100

Yersinia nelle feci esame colturale Feci	**B589**	**COLTURALE**	**5-6 gg**	**MICROBIOLOGIA**

VALORI DI RIFERIMENTO

ESAME COLTURALE
Identificazione
Carica
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Yersinia nelle feci esame colturale II Campione Feci	B5892		5-6 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Materiale :
COLTURALE
Identificazione

Carica batterica
Identificazione
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Yersinia nelle feci esame colturale III Campione Feci	B5893		5-6 gg	MICROBIOLOGIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Materiale :
COLTURALE
Identificazione

Carica batterica
Identificazione
Commento

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Zinco ematico Siero	7160	COLORIMETRICO	10 gg	TOSSICOLOGIA

UTILIZZARE PROVETTE SENZA GEL SEPARATORE

VALORI DI RIFERIMENTO

	µg/dL	Popolazione generale : 80 - 160

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Zinco Urine F.T. Urine F.T.	7161	ICP-MS	10-11 gg	ALTA SPECIALISTICA SERVICE

VALORI DI RIFERIMENTO

	µmol/l	1 - 20

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Zinco Urine I.T. Urine I.T.	716	ICP-MS	10-11 gg	ALTA SPECIALISTICA SERVICE

VALORI DI RIFERIMENTO

	µmol/l	1 - 20

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Zincoprotoporfirine Eritrocitarie Sangue Inter EDTA	703	Fluorimetrico	19-20 gg	ALTA SPECIALISTICA

VALORI DI RIFERIMENTO

	µg/g HB	Popolazione Generale: < 2.5 Soggetti Esposti: < 12.0

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Zonulina Sierica Siero congelato	**1383**	**ELISA**	**23-24 gg**	

ALTA SPECIALISTICA

Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/ml	20 - 48