

Informativa Ricerca Sostanze d'Abuso Valenza Medico Legale

TD-SGI-INF072_00

Premessa

La ricerca di sostanze d'abuso consente di accertare l'eventuale assunzione e/o esposizione a sostanze stupefacenti avvenuta nei giorni (urine) o nei mesi (matrice pilifera) che precedono la raccolta del campione.

La concentrazione di alcol etilico nel sangue è un indicatore dell'abuso acuto di bevande alcoliche. Il valore di CDT è alterato in caso di abuso alcolico cronico.

L'etilglucuronide (EtG) è un indicatore del consumo recente (urine) ovvero cronico (capelli) di alcol.

La raccolta di urine non comporta rischi per il paziente. L'operatore sanitario verifica idoneità e autenticità del campione urinario e, dopo aver verificato che il volume disponibile sia di almeno 20 mL, lo suddivide in 2 aliquote tra loro identiche. Il prelievo del campione di matrice pilifera viene effettuato preferibilmente in zona nucale mediante taglio alla base del fusto di una ciocca del diametro di una matita (circa di 5-7 mm). È un prelievo privo di particolari rischi e indolore, ma può lasciare un piccolo inestetismo che scompare con la ricrescita dei capelli.

Il paziente deve presentarsi con capelli di lunghezza superiore a 2 cm e dichiarare se ha effettuato trattamenti cosmetici (decolorazione, tintura, permanente, trattamento anticaduta) negli ultimi mesi. Nel caso di calvizie, si procederà al prelievo di formazioni pilifere da altre zone del corpo, a seconda della disponibilità (petto, ascelle, pube). In caso di alopecia l'ente richiedente può prescrivere, per l'accertamento dell'uso di sostanze stupefacenti, l'esecuzione di raccolte urinarie ripetute in giorni diversi.

Il prelievo di sangue prevede il riempimento di due distinte provette e viene effettuato mediante puntura di una vena periferica, preferibilmente alla piega del gomito, utilizzando apposito materiale sterile. Tale procedura non comporta alcun particolare rischio, ma può causare una lieve e transitoria sensazione dolorosa al momento della puntura. È inoltre possibile che, intorno alla sede di prelievo, si formi un ematoma circoscritto causato dallo stravasamento di sangue, con conseguente variazione del colore della cute che può perdurare anche sino a due settimane. Il problema può essere evitato o comunque limitato comprimendo il punto di prelievo per qualche minuto, a prelievo completato, con un batuffolo di cotone idrofilo. Dalla data di ricevimento del referto e comunque entro i limiti previsti dalla normativa vigente, il paziente ha facoltà di richiedere l'analisi di revisione (contro-analisi), anche presso altra struttura autorizzata, assumendosene l'onere economico.

Gli accertamenti su urine, capelli/peli e sangue sono eseguiti secondo le modalità e le procedure stabilite dalla normativa vigente.

Data e luogo: _____

Il Paziente

L'Operatore Sanitario

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.