

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

IGIENE E LAVAGGIO DELLE MANI

Istruzione di lavoro per tutte le strutture della rete
Area 05 – Sicurezza

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-IDL003_00	00	12/04/2026	7
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSPP / DS	AD – Francesco Epifani	Distribuzione a tutto il personale	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Iacopo Cupelli	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
12/04/2026	12/04/2026	12/04/2026

Sommario

1. Scopo e campo di applicazione.....	3
2. Riferimenti normativi.....	3
3. Termini e definizioni.....	3
4. I cinque momenti dell'igiene delle mani (WHO).....	3
5. Lavaggio con acqua e sapone antisettico.....	4
5.1 Quando utilizzare il lavaggio con acqua e sapone.....	4
5.2 Tecnica in 11 passaggi.....	4
6. Frizione con gel idroalcolico.....	4
6.1 Quando utilizzare il gel idroalcolico.....	4
6.2 Tecnica in 8 passaggi.....	5
7. Lavaggio chirurgico delle mani.....	5
8. Cura delle mani e prerequisiti.....	5
9. Prodotti e dotazioni.....	5
10. Locandina operativa per l'affissione.....	6
11. Indicatori di processo.....	6
12. Storico delle revisioni.....	6

1. Scopo e campo di applicazione

La presente Istruzione di Lavoro definisce le modalità corrette di igiene delle mani per tutto il personale delle strutture della rete Toscana Diagnostica.

L'igiene delle mani è la misura di prevenzione delle infezioni più semplice ed efficace disponibile: riduce la trasmissione di microrganismi tra operatore e paziente, tra paziente e paziente, e protegge l'operatore stesso dall'esposizione ad agenti biologici.

Nel contesto diagnostico, dove ogni giorno migliaia di campioni biologici vengono manipolati e centinaia di pazienti vengono accolti per prelievi ed esami, l'igiene delle mani non è un gesto accessorio: è il fondamento della sicurezza clinica.

La presente IDL si applica a tutte le sedi operative e a tutto il personale (sanitario, tecnico, amministrativo, di pulizia, di accettazione).

La locandina operativa allegata (Sezione 10) è destinata all'affissione in tutti gli ambulatori, le sale prelievo, i laboratori e i servizi igienici delle strutture.

2. Riferimenti normativi

Norma / Riferimento	Ambito
OMS – WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care (2009)	Linee guida globali sull'igiene delle mani nelle strutture sanitarie: i 5 momenti, le tecniche, i prodotti
OMS – “Clean Care is Safer Care”	Programma mondiale per la promozione dell'igiene delle mani nelle strutture sanitarie
D.Lgs. 81/2008, Titolo X	Esposizione ad agenti biologici: misure di prevenzione
ISO 45001:2018, cl. 8.1	Pianificazione e controllo operativo: misure di igiene
ISO 7101:2023	Qualità nelle organizzazioni sanitarie – sicurezza del paziente
EN 1500:2013	Disinfettanti e antisettici chimici: lavaggio igienico delle mani – metodo di prova
EN 12791:2016	Disinfettanti e antisettici chimici: trattamento chirurgico delle mani
TD-SGI-PRO007	Procedura Rischio Biologico e Sanificazione

3. Termini e definizioni

Igiene delle mani: termine generale che comprende il lavaggio con acqua e sapone, la frizione con gel idroalcolico e il lavaggio chirurgico. È la singola misura più efficace per prevenire la trasmissione di infezioni.

Flora transitoria: microrganismi acquisiti per contatto con pazienti, superfici o materiali contaminati. Possono essere rimossi con il lavaggio o la frizione. Comprendono potenziali patogeni (*S. aureus*, gram-negativi, virus).

Flora residente: microrganismi normalmente presenti sulla cute delle mani (strati profondi dell'epidermide). Non vengono rimossi dal lavaggio ordinario ma possono essere ridotti dal lavaggio chirurgico.

Frizione alcolica: applicazione di un prodotto a base alcolica (gel, soluzione o schiuma con alcol al 60-80%) sulle mani, senza uso di acqua, per la riduzione della carica microbica.

I 5 momenti (WHO): framework dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che identifica i 5 momenti in cui l'igiene delle mani è indispensabile nell'assistenza sanitaria.

4. I cinque momenti dell'igiene delle mani (WHO)

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha identificato 5 momenti fondamentali in cui l'igiene delle mani è obbligatoria. Nel contesto di Toscana Diagnostica, i 5 momenti si declinano come segue:

N.	Momento WHO	Applicazione in Toscana Diagnostica
1	Prima del contatto con il paziente	Prima di ogni prelievo venoso, capillare o arterioso. Prima di posizionare il paziente per un esame di diagnostica per immagini. Prima di qualsiasi contatto diretto con il paziente (visita specialistica, medicazione, ECG).
2	Prima di una manovra aseptica	Prima di preparare il sito di prelievo con l'antisettico. Prima di manipolare dispositivi sterili (aghi, siringhe, cateteri). Prima di preparare mezzi di contrasto per iniezione. Prima di manipolazioni in ambiente sterile (cappe microbiologiche).
3	Dopo esposizione a liquido biologico	Dopo il contatto con sangue, siero, urine, liquidi biologici o campioni diagnostici. Dopo la rimozione dei guanti utilizzati per la manipolazione di materiale biologico. Dopo il contatto con contenitori di rifiuti a rischio infettivo.
4	Dopo il contatto con il paziente	Dopo ogni prelievo. Dopo il contatto con la cute integra del paziente (stretta di mano, posizionamento). Dopo aver assistito il paziente.
5	Dopo il contatto con ciò che circonda il paziente	Dopo aver toccato lettini, braccioli, superfici della sala prelievo, apparecchiature diagnostiche, cartelle, tastiere, telefoni nelle aree di contatto con i pazienti.

5. Lavaggio con acqua e sapone antisettico

5.1 Quando utilizzare il lavaggio con acqua e sapone

Il lavaggio con acqua e sapone antisettico è obbligatorio: quando le mani sono visibilmente sporche o contaminate da materiale biologico; dopo l'uso dei servizi igienici; prima e dopo i pasti; all'inizio e alla fine del turno di lavoro; dopo il contatto con pazienti con infezioni da *Clostridioides difficile* o da microrganismi sporigeni (le spore non sono eliminate dal gel idroalcolico); in caso di sversamento di materiale biologico sulle mani.

5.2 Tecnica in 11 passaggi

La durata complessiva del lavaggio deve essere di almeno 40-60 secondi:

Passo	Azione
1	Bagnare le mani con acqua corrente tiepida.
2	Applicare una quantità sufficiente di sapone antisettico (una erogazione dalla pompa dispenser, circa 3-5 ml).
3	Strofinare palmo contro palmo per distribuire il sapone uniformemente.
4	Strofinare il palmo destro sopra il dorso sinistro, intrecciando le dita, e viceversa.
5	Strofinare palmo contro palmo con le dita intrecciate, insistendo sugli spazi interdigitali.
6	Strofinare il dorso delle dita contro il palmo opposto, tenendo le dita strette (movimento avanti-indietro).
7	Strofinare con movimento rotatorio il pollice sinistro stretto nel palmo destro, e viceversa.
8	Strofinare con movimento rotatorio avanti e indietro le punte delle dita della mano destra nel palmo della mano sinistra, e viceversa, insistendo sui polpastrelli e sul letto ungueale.
9	Strofinare con movimento rotatorio ciascun polso.
10	Risciacquare accuratamente sotto acqua corrente, procedendo dalle punte delle dita verso i polsi.
11	Asciugare accuratamente con salvietta monouso in carta. Utilizzare la salvietta per chiudere il rubinetto (se non a pedale o a sensore), quindi smaltirla nel cestino.

6. Frizione con gel idroalcolico

6.1 Quando utilizzare il gel idroalcolico

La frizione con gel idroalcolico è il metodo di elezione per l'igiene delle mani quando le mani non sono visibilmente sporche. È più rapido, più efficace sulla flora transitoria e meno irritante per la cute rispetto al lavaggio con acqua e sapone. Deve essere utilizzato in tutti i 5 momenti WHO quando le mani sono visibilmente pulite. Il gel idroalcolico non è efficace contro le spore (*Clostridioides difficile*): in questi casi è obbligatorio il lavaggio con acqua e sapone.

6.2 Tecnica in 8 passaggi

La durata complessiva della frizione deve essere di almeno 20-30 secondi:

Passo	Azione
1	Applicare una quantità sufficiente di gel idroalcolico nel palmo di una mano (una erogazione dalla pompa, circa 3 ml). Le mani devono essere asciutte.
2	Strofinare palmo contro palmo per distribuire il prodotto.
3	Strofinare il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita, e viceversa.
4	Strofinare palmo contro palmo con le dita intrecciate, insistendo sugli spazi interdigitali.
5	Strofinare il dorso delle dita contro il palmo opposto, tenendo le dita strette.
6	Strofinare con movimento rotatorio il pollice sinistro stretto nel palmo destro, e viceversa.
7	Strofinare con movimento rotatorio le punte delle dita della mano destra nel palmo della mano sinistra, e viceversa.
8	Continuare a strofinare fino a completa asciugatura del prodotto. Non asciugare con salviette e non risciacquare.

7. Lavaggio chirurgico delle mani

Il lavaggio chirurgico è riservato al personale che esegue procedure invasive sterili (biopsie ecoguidate, procedure interventistiche) e non rientra nella pratica quotidiana dei punti prelievo e dei laboratori. Esso prevede: rimozione di anelli, braccialetti, orologi; lavaggio con acqua e sapone antisettico fino ai gomiti per almeno 2-3 minuti, con particolare attenzione al letto ungueale (spazzolino sterile monouso); risciacquo procedendo dalle punte delle dita verso i gomiti; asciugatura con telo sterile monouso. In alternativa, dopo il lavaggio iniziale, può essere eseguita la frizione chirurgica con prodotto alcolico conformemente alla norma EN 12791. Il lavaggio chirurgico è documentato nel protocollo operativo della procedura specifica.

8. Cura delle mani e prerequisiti

L'efficacia dell'igiene delle mani richiede il rispetto di alcuni prerequisiti essenziali:

- Unghie corte, pulite e prive di smalto. Le unghie artificiali o ricostruite sono vietate per tutto il personale sanitario e tecnico a contatto con pazienti o campioni biologici.
- Rimozione di anelli, braccialetti, orologi da polso e altri gioielli prima dell'inizio del turno nelle aree cliniche e di laboratorio. La fede nuziale liscia è tollerata, ma si raccomanda la rimozione durante i prelievi e le procedure con guanti.
- Cura della cute delle mani: utilizzo regolare di crema idratante (alla fine del turno o durante le pause) per prevenire la dermatite da contatto, che compromette l'integrità della barriera cutanea e aumenta la colonizzazione batterica.
- Copertura con cerotto impermeabile di eventuali tagli, abrasioni o lesioni cutanee sulle mani.
- I guanti non sostituiscono l'igiene delle mani: le mani devono essere igienizzate prima di indossare i guanti e dopo averli rimossi.

9. Prodotti e dotazioni

Ogni punto di erogazione nelle strutture Toscana Diagnostica deve essere dotato come segue:

Area	Dotazione obbligatoria	Note
Sale prelievo	Lavandino a pedale/sensore, sapone antisettico dispenser, salviette monouso, gel idroalcolico a parete, cestino rifiuti	Gel anche al letto/poltrona del paziente

Laboratorio (ogni bancone)	Lavandino, sapone antisettico, salviette monouso, gel idroalcolico	Gel a ogni postazione di lavoro
Accettazione / Front office	Gel idroalcolico al bancone, dispenser per il pubblico nella sala d'attesa	Sapone nei servizi igienici adiacenti
Diagnostica per immagini	Lavandino in sala, sapone antisettico, salviette, gel	Gel a parete accanto all'apparecchiatura
Servizi igienici (personale e pazienti)	Sapone liquido, salviette monouso, cestino	Locandina lavaggio mani affissa
Aree di pausa / Ristoro	Sapone liquido, salviette monouso	Locandina igiene mani affissa

Il responsabile di struttura verifica mensilmente la disponibilità e il corretto funzionamento dei dispenser, la presenza delle salviette e del gel, e segnala tempestivamente la necessità di reintegro.

10. Locandina operativa per l'affissione

La locandina allegata alla presente IDL è destinata all'affissione permanente in tutte le sale prelievo, gli ambulatori, i laboratori, i servizi igienici e le aree di pausa di ogni struttura della rete. La locandina è disponibile anche in formato digitale nel sistema documentale del SGI e può essere stampata in formato A3 o A4 a colori. La locandina riporta il logo di Toscana Diagnostica, la sintesi visiva della tecnica di lavaggio delle mani e di frizione con gel idroalcolico, i 5 momenti WHO e il riferimento alla presente IDL.

Il file della locandina è allegato come documento separato: Locandina_Lavaggio_Mani_TD.html (stampabile in formato A3/A4 da browser).

11. Indicatori di processo

Consumo di gel idroalcolico per 1.000 prestazioni: indicatore proxy dell'aderenza all'igiene delle mani. Obiettivo: trend in crescita fino a stabilizzazione.

Consumo di sapone antisettico per 1.000 prestazioni: monitoraggio complementare. Obiettivo: trend stabile.

Disponibilità prodotti (audit mensile): percentuale di punti di erogazione con dotazione completa e funzionante. Obiettivo: 100%.

Affissione locandina (audit trimestrale): percentuale di aree con locandina affissa, integra e leggibile. Obiettivo: 100%.

Osservazione diretta compliance (audit semestrale): percentuale di aderenza ai 5 momenti WHO rilevata mediante osservazione diretta a campione. Obiettivo: ≥ 80%.

Formazione erogata: percentuale di personale formato sulla presente IDL. Obiettivo: 100% entro 6 mesi dalla prima emissione.

12. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione modifiche	Approvazione
00	12/04/2026	Prima emissione	Francesco Epifani