

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

CONSENSO INFORMATO PER L'INIEZIONE INTRAMUSCOLARE O SOTTOCUTANEA

Modulo di consenso informato per la somministrazione
di iniezioni intramuscolari o sottocutanee

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-INF012_00	00	27/04/2026	3
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSGI	Direzione Generale	Interno	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Rosetta Greco	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
27/04/2026	27/04/2026	27/04/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

Consenso per iniezione di	
Nome e Cognome	
Data di nascita	
Luogo di nascita	
Indirizzo residenza	
Telefono	
Email	

Informazioni sulla Procedura

Il paziente è stato informato in merito alle modalità di esecuzione della procedura di iniezione intramuscolare o sottocutanea. Possono verificarsi complicanze locali quali arrossamento, dolore, gonfiore, indurimento, prurito e ecchimosi nel sito di iniezione.

Informazioni sul Farmaco

Il paziente si procura il farmaco prescritto dal medico curante. Il paziente è responsabile della corretta conservazione del farmaco.

Nome commerciale	
Principio attivo	
Dosaggio	
Lotto	
Scadenza	
Prescrizione medica allegata (Si/No)	

Anamnesi Clinica

Allergie	
Allergia al farmaco da iniettare (Si/No)	
Farmaci in uso	
Patologie in atto	
Precedenti reazioni avverse (Si/No)	
Gravidanza (Si/No)	
Settimana gravidanza	
Allattamento (Si/No)	

Modalità di Iniezione

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

Sede dell'iniezione:

Sede	
	Braccio destro (deltoide)
	Braccio sinistro (deltoide)
	Gluteo destro
	Gluteo sinistro
	Coscia destra
	Coscia sinistra
	Altra sede

Via somministrazione: IM / SC

Istruzioni Post-Procedura

In caso di gonfiore, applicare ghiaccio sulla zona. Movimentare l'arto per 5-10 minuti dopo l'iniezione. Evitare sforzi dell'arto interessato per almeno 24 ore. Monitorare la sede dell'iniezione. Contattare il medico in caso di reazioni avverse significative.

Possibili Effetti Collaterali

Tipo di effetto	Descrizione
Effetti locali comuni	Arrossamento, dolore, gonfiore, indurimento, prurito, ecchimosi
Effetti generali rari	Malessere, febbre lieve, reazioni allergiche

Firme

Ruolo	Firma	Data
Firma Paziente	Data	
Firma Medico	Data	
Firma Tutore (se minore)	Data	