

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

INFORMATIVA AL PAZIENTE MOC - MINERALOMETRIA OSSEA COMPUTERIZZATA

Istruzioni di preparazione per l'esecuzione
della MOC (densitometria ossea)

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-INF029_00	00	27/04/2026	2
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSGI	Direzione Generale	Interno	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Rosetta Greco	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
27/04/2026	27/04/2026	27/04/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

Descrizione dell'esame

La MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata), nota anche come densitometria ossea, è un esame che misura la densità minerale ossea per rilevare osteoporosi o altre anomalie della densità ossea. L'esame utilizza basse dosi di radiazioni ed è non invasivo.

Preparazione

Nessuna preparazione particolare è richiesta.

Indicazioni per donne in età fertile

L'esame deve essere eseguito necessariamente entro i primi 10 giorni del ciclo mestruale (dopo l'inizio della mestruazione). Se non è possibile rispettare questa finestra temporale, la gravidanza deve essere esclusa mediante test specifico prima di procedere. L'esame non è eseguibile in caso di gravidanza confermata o sospetta.

Che cosa portare

Prescrizione medica (obbligatoria), carta di identità e tessera sanitaria, esami MOC precedenti se disponibili (importante per confronto). Per le donne: informare il personale del primo giorno dell'ultimo ciclo mestruale.

Durante l'esame

Dovrà stendersi su un lettino specifico e rimanere immobile per qualche minuto mentre l'apparecchiatura scansiona la zona da analizzare (solitamente colonna lombare e collo del femore). Non si avverte dolore durante l'esame. L'esposizione a radiazioni è minima. Durata: generalmente 10-15 minuti.

Dopo l'esame

Non ci sono effetti collaterali. È possibile riprendere le normali attività immediatamente.