

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

INFORMATIVA AL PAZIENTE RETTOCOLONSCOPIA

Informativa e consenso per l'esecuzione
della rettocolonsopia diagnostica e operativa

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-INF036_00	00	27/04/2026	4
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSGI	Direzione Generale	Interno	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Rosetta Greco	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
27/04/2026	27/04/2026	27/04/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

Che cos'è la rettocolonscopia

La rettocolonscopia è un esame diagnostico che consente al medico di vedere all'interno del grosso intestino (colon) e di individuare la presenza di malattie infiammatorie intestinali o altre patologie. L'indagine viene effettuata dal medico specialista coadiuvato da personale infermieristico specializzato. È possibile eseguire l'esame in sedazione attraverso farmaci somministrati dall'anestesista.

Indicazioni

Il medico con l'introduzione del colonscopio ha una visione nitida e precisa del vostro intestino (se la preparazione è stata correttamente effettuata): questo gli consente di individuare la presenza di alterazioni della mucosa. La colonscopia consente anche il trattamento di alcune lesioni, come i polipi intestinali, che possono essere asportati durante la colonscopia con diverse tecniche (polipectomia).

Esecuzione

Dopo aver acquisito il consenso del paziente, si posiziona un accesso venoso periferico e si monitorizzano la frequenza cardiaca, la saturazione d'ossigeno e la pressione arteriosa. L'indagine è eseguita con l'ausilio del colonscopio, strumento flessibile del diametro di circa 1 cm dotato di telecamera. L'esame dura da 30 a 60 minuti. Qualora lo ritenga opportuno, il medico potrà prelevare nel corso dell'esame piccoli frammenti di tessuto (biopsie) per l'esame istologico.

Complicanze

Complicanza	Frequenza	Note
Complicanze cardio-respiratorie	0,9%	Legate principalmente alla sedazione
Emorragia	0,1-0,6%	Generalmente di modesta entità, autolimitante
Perforazione (diagnostica)	0,01-0,08%	Rara, richiede trattamento chirurgico
Perforazione (operativa)	0,1%	Più frequente durante polipectomia

Preparazione con PICOPREP

Quattro giorni prima dell'esame non mangiare: cibi integrali, frutta, verdura, legumi ed alimenti contenenti semi.

Esame al mattino (ore 8-12:30)

Giorno	Ora	Istruzione
Giorno precedente	Colazione	Colazione normale
Giorno precedente	Pranzo	Carne, formaggio, pesce, patate
Giorno precedente	Ore 16:00	2 buste PICOPREP in 500 ml acqua; nelle 3 ore successive bere 1 litro liquidi chiari
Giorno precedente	Ore 20:00	2 buste PICOPREP in 500 ml acqua; nelle 2 ore successive bere 1 litro liquidi chiari

Giorno	Ora	Istruzione
Giorno precedente	Cena	100 gr di carne ai ferri
Giorno esame	Mattina	Non fare colazione; fino a 3 ore prima bere acqua/the/camomilla con zucchero

Necessario acquistare 2 confezioni di PICOPREP.

Esame al pomeriggio (ore 14-19)

Giorno	Ora	Istruzione
Giorno precedente	Pranzo	Pranzo normale
Giorno precedente	Ore 21:00	2 buste PICOPREP in 500 ml acqua; nelle 3 ore successive bere 1 litro liquidi chiari
Giorno precedente	Cena	Carne, formaggio, pesce, patate
Giorno esame	Ore 7:00	Colazione con the, caffè e 1-2 fette biscottate
Giorno esame	Ore 8:00	2 buste PICOPREP in 500 ml acqua; nelle 2 ore successive bere 1 litro liquidi chiari
Giorno esame		Non pranzare; fino a 3 ore prima bere acqua/the/camomilla con zucchero

Necessario acquistare 2 confezioni di PICOPREP.

Preparazione con CLENSIA

Esame al mattino (ore 8-12:30)

Giorno	Ora	Istruzione
Giorno precedente	Colazione	Colazione normale
Giorno precedente	Pranzo	Carne, formaggio, pesce, patate
Giorno precedente	Ore 16:00	2 buste grandi + 2 piccole CLENSIA in 1 litro acqua; bere 1/2 litro liquidi chiari
Giorno precedente	Ore 20:00	2 buste grandi + 2 piccole CLENSIA in 1 litro acqua; bere 1/2 litro liquidi chiari
Giorno precedente	Cena	100 gr di carne ai ferri
Giorno esame	Mattina	Non fare colazione; fino a 3 ore prima bere acqua/the/camomilla con zucchero

Necessario acquistare 1 confezione di CLENSIA.

Esame al pomeriggio (ore 14-19)

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

Giorno	Ora	Istruzione
Giorno precedente	Pranzo	Pranzo normale
Giorno precedente	Ore 21:00	2 buste grandi + 2 piccole CLENSIA in 1 litro acqua; bere 1/2 litro liquidi chiari
Giorno precedente	Cena	Carne, formaggio, pesce, patate
Giorno esame	Ore 7:00	Colazione con the, caffè e 1-2 fette biscottate
Giorno esame	Ore 8:00	2 buste grandi + 2 piccole CLENSIA in 1 litro acqua; bere 1/2 litro liquidi chiari
Giorno esame		Non pranzare; fino a 3 ore prima bere acqua/the/camomilla con zucchero

Necessario acquistare 1 confezione di CLENSIA.

Pazienti in terapia anticoagulante/antiaggregante

In caso di assunzione di farmaci anticoagulanti o antiaggreganti (Coumadin, Cardioaspirina, Aspirina, Ticlopidina, Clopidogrel, Plavix, Xarelto, Eliquis, Dabigatran, Apixaban, Pradaxa, Lixiana, ecc.), è necessario contattare il proprio medico curante, il quale dovrà valutare la possibilità di sospendere la cura o di sostituirla con farmaci diversi e poi rivalutare l'attività coagulativa.

Sedazione

Per limitare il disagio e l'eventuale dolore è possibile eseguire la sedazione. La sedazione può essere cosciente (leggermente sedato, responsivo) o profonda (completamente addormentato). Entrambe le tipologie sono gestite dal medico anestesista. La sedazione deve essere richiesta in sede di prenotazione.

Se sono stati somministrati farmaci sedativi non si potrà allontanarsi dalla struttura fino alla completa scomparsa degli effetti. Sarà controindicata la guida di veicoli per il resto della giornata. È indispensabile presentarsi accompagnati.

Prescrizioni, esami precedenti e terapie

Per l'esecuzione dell'esame è necessaria la richiesta medica con espresso il quesito diagnostico. Portare precedenti indagini strumentali (ecografie, RX, ecc.) e di laboratorio e segnalare terapie in atto.

Nota: l'esame non può essere eseguito insieme a RX "Apparato Digerente", dopo il quale occorre un intervallo di almeno 2 giorni.