

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

INFORMATIVA AL PAZIENTE RM PROSTATA BIPARAMETRICA

Istruzioni di preparazione per l'esecuzione
della RM prostatica biparametrica

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-INF043_00	00	27/04/2026	2
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSGI	Direzione Generale	Interno	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Rosetta Greco	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
27/04/2026	27/04/2026	27/04/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

Che cosa è la RM Prostata Biparametrica

La risonanza magnetica prostatica biparametrica è un esame diagnostico senza mezzo di contrasto che utilizza due sequenze funzionali (T2 pesata e diffusione DWI) per la valutazione della ghiandola prostatica. È indicata per la ricerca e la caratterizzazione di lesioni prostatiche sospette.

1. Preparazione all'esame

Istruzione	Dettaglio
Digiuno	Non richiesto
Preparazione intestinale	Eseguire un microclisma (clistere piccolo) 2-3 ore prima dell'esame
Vescica	Non urinare nell'ora precedente l'esame (vescica moderatamente piena)
Astinenza	Astenersi da eiaculazione nelle 72 ore precedenti l'esame
Arrivo	Presentarsi 15 minuti prima dell'esame

2. Controindicazioni

La risonanza magnetica non può essere eseguita in portatori di pacemaker, clips chirurgiche non compatibili con RM (in particolare per interventi eseguiti prima del 2000), protesi del cristallino (segnalarne la presenza) e qualunque altro dispositivo elettronico o protesico di cui è utile conoscere marca e modello per valutare la compatibilità.

Togliere eventuali lenti a contatto. Protesi dentarie metalliche sia fisse che mobili, otturazioni, perni, capsule non rappresentano controindicazioni. Le pazienti sono invitate a presentarsi senza trucco e lacca per evitare artefatti.

È controindicata l'esecuzione dell'esame per le pazienti in gravidanza (presunta o in atto) durante il primo trimestre. Per gli esami nei trimestri successivi consultarsi preventivamente con il medico radiologo.

3. Documentazione

Presentare sempre la richiesta medica. Portare il valore recente del PSA, precedenti indagini strumentali e di laboratorio e segnalare eventuali terapie in atto. La durata dell'esame è di circa 30-40 minuti.