

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

INFORMATIVA AL PAZIENTE STRISCIO VAGINALE (PAP TEST)

Istruzioni di preparazione per l'esecuzione
dello striscio vaginale

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-INF050_00	00	27/04/2026	2
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSGI	Direzione Generale	Interno	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Rosetta Greco	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
27/04/2026	27/04/2026	27/04/2026

Descrizione dell'esame

Lo striscio vaginale (PAP test) è un esame citologico fondamentale per lo screening delle alterazioni cellulari del collo dell'utero e per la prevenzione dei tumori cervicali. Il prelievo si esegue solo su appuntamento.

1. Preparazione

Istruzione	Dettaglio
Ciclo mestruale	Presentarsi preferibilmente dopo almeno 5 giorni dalla fine del ciclo. Non effettuare lo striscio durante le mestruazioni
Prodotti vaginali	Nelle 48 ore precedenti non assumere né farsi somministrare farmaci per via vaginale (candele, ovuli, pomate, gel) e non fare lavande vaginali
Rapporti sessuali	Evitare rapporti sessuali la sera precedente l'esame

2. Esecuzione dell'esame

L'esame è rapido e poco invasivo. La paziente viene posizionata in modo confortevole. Il prelievo cellulare avviene tramite un tampone e dura pochi secondi. Non vi sono limitazioni dopo l'esame; evitare l'uso di tamponi interni per almeno 24 ore.

3. Documentazione

Portare richiesta medica e precedenti esami citologici.