

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

INFORMATIVA AL PAZIENTE TAC ENTEROGRAFIA

Istruzioni di preparazione per l'esecuzione
della TAC enterografica con mezzo di contrasto

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-INF053_00	00	27/04/2026	2
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSGI	Direzione Generale	Interno	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Rosetta Greco	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
27/04/2026	27/04/2026	27/04/2026

Descrizione dell'esame

La TAC enterografia è un esame tomografico che valuta l'intestino tenue utilizzando mezzo di contrasto per ottenere immagini ad alta risoluzione. L'esame viene sempre eseguito con contrasto iodato.

Preparazione

Indicazione	Dettaglio
Digiuno	Da cibi solidi e liquidi nelle 5 ore precedenti l'esame
METFORMINA	Sospenderne l'assunzione 48 ore prima e 48 ore dopo l'esame
Altri farmaci	Prendere regolarmente eventuali medicinali in uso
Arrivo	Presentarsi accompagnati e 1 ora prima della prenotazione

Esami preliminari

È necessario eseguire il dosaggio della CREATININEMIA (da non oltre 3 mesi dalla data dell'esame, altrimenti effettuare in Toscana Diagnostica S.r.l. 1 ora prima della TAC).

Controindicazioni e allergie

Se il paziente soffre di fenomeni allergici, contattare Toscana Diagnostica S.r.l. per valutare una eventuale preparazione antiallergica.

Indicazioni per donne in età fertile

L'indagine può essere eseguita entro i primi 10 giorni dall'inizio del ciclo mestruale. Trascorsi 10 giorni, l'esame può essere effettuato SOLO se c'è stata astensione dai rapporti o se questi sono stati protetti. In caso di rapporti non protetti attendere il successivo ciclo mestruale prima di fissare l'appuntamento, oppure eseguire il test beta HCG e presentarsi in struttura con i risultati (il test deve essere eseguito soltanto se sono passati almeno 15 giorni dal rapporto non protetto).

Si precisa che l'esame non potrà essere eseguito in caso di gravidanza certa o presunta.

Che cosa aspettarsi

Prima dell'esame è necessario bere una soluzione di ISOCOLAN diluita in acqua (1,5 litri nell'arco di 30 minuti), seguita da 20 minuti di attesa. Durante la TAC vengono somministrati mezzo di contrasto e BUSCOPAN per rilassare le anse intestinali (in caso di Ipertrofia Prostatica o di Glaucoma il medico di reparto valuterà se procedere alla somministrazione). La durata totale è di 2-3 ore.

Note post-esame

Bere abbondanti quantità di liquidi per facilitare l'eliminazione del contrasto.