

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

BREATH TEST AL FRUTTOSIO MALASSORBIMENTO DEL FRUTTOSIO

Diagnosi del malassorbimento del fruttosio
Informativa al paziente: preparazione e procedura

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-INF077_00	00	01/06/2026	2
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSGI	Direzione Generale	Interno	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Rosetta Greco	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
01/06/2026	01/06/2026	01/06/2026

H2 Breath Test per la diagnosi del malassorbimento del FRUTTOSIO

COS'È IL FRUTTOSIO

Il fruttosio è uno zucchero presente in natura e si può trovare in alimenti quali alcuni tipi di verdure, frutta e cereali. Il fruttosio è uno zucchero che molte persone faticano ad assorbire efficacemente.

A COSA SERVE IL BREATH AL FRUTTOSIO

Il breath test al fruttosio è un metodo non invasivo per determinare l'intolleranza al fruttosio che si manifesta con diarrea, flatulenza e dolori addominali.

INDICAZIONI

L'H2 Breath Test è indicato per la diagnosi di malassorbimento del fruttosio.

COMPONENTI DEL KIT

1 Flacone contenente 25 g di fruttosio

9 buste singole per insufflare

PREPARAZIONE DEL PAZIENTE PER L'ESECUZIONE DELL' H2 BREATH TEST

Il test va eseguito a digiuno.

Nei 4/5 giorni precedenti l'esame il paziente non deve assumere farmaci a base di antibiotici, fermenti lattici e lassativi (20 giorni per farmaci a base di antibiotici)

Il medico deve assicurarsi che il paziente non abbia in corso una diarrea importante.

Il paziente il giorno prima dell'esame deve alimentarsi esclusivamente con:

COLAZIONE: una tazza di tè

PRANZO: un piatto di riso bollito condito con poco olio

CENA: un petto di pollo/tacchino grigliato/lesso oppure pesce lesso.

Dalle ore 21.00 del giorno precedente l'esame deve osservare un digiuno completo (può bere liberamente acqua non gasata).

Dalle ore 7.00 del giorno dell'esame il paziente deve restare a digiuno, non lavarsi i denti, non fumare, non deve svolgere attività fisica.

Durante l'esecuzione del test non è consentito fumare, bere, mangiare, masticare chewing gum o caramelle o svolgere attività fisica stancante.

Procedura per la raccolta del campione di espirato

Raccolta del campione Basale:

- Far soffiare in una busta (tempo 0)
- Apporre l'etichetta di riconoscimento del paziente relativa al Tempo 0
- Far ingerire al paziente la soluzione di 25 g di fruttosio (1 g/kg corporeo nei bambini, fino ad un massimo di 25 g) disciolti in 200 ml di acqua non gasata
- Eseguire l'operazione come per il prelievo basale ogni 30 minuti per una durata totale di 4 ore (8 campioni + 1 basale da effettuare prima della somministrazione del substrato).