

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

BREATH TEST AL LATTULOSIO TEMPO DI TRANSITO ORO-CECALE (OCTT)

Misurazione del Tempo di Transito Oro-cecale e SIBO
Informativa al paziente: preparazione e procedura

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-INF078_00	00	01/06/2026	2
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSGI	Direzione Generale	Interno	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Rosetta Greco	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
01/06/2026	01/06/2026	01/06/2026

H2 Breath Test per la misurazione del Tempo di Transito Oro-cecale (OCTT)

TEMPO DI TRANSITO ORO-CECALE (OCTT)

La misurazione del Tempo di Transito Oro-cecale (OCTT) serve a valutare il tempo che il cibo ingerito impiega per raggiungere l'intestino, tempo che può risultare ridotto in caso di diarrea da ipermotilità o aumentato in caso di sintomi dispeptici in caso di stipsi o lento svuotamento gastrico.

H2 BREATH TEST

L'H2 Breath Test è una tecnica che trova molte applicazioni, come lo studio della capacità di assorbimento ileale. Questo Test è frequentemente inserito tra le indagini eseguite per diagnosticare il malassorbimento a determinati carboidrati.

INDICAZIONI

L'H2 Breath Test al Lattulosio è utilizzato per la diagnosi di alterazione del Tempo di Transito Oro-cecale (OCTT) e SIBO.

COMPONENTI DEL KIT

1 Flacone predosato di Lattulosio 16ml (8ml per i bambini)

17 buste singole per insufflare

Preparazione del paziente per l'esecuzione dell'H2 Breath test

Il test va eseguito a digiuno.

Nei 4/5 giorni precedenti l'esame il paziente non deve assumere farmaci a base di antibiotici, fermenti lattici e lassativi (20 giorni per farmaci a base di antibiotici)

Il medico deve assicurarsi che il paziente non abbia in corso una diarrea importante

Il paziente il giorno prima dell'esame deve alimentarsi esclusivamente con:

COLAZIONE: una tazza di tè

PRANZO: un piatto di riso bollito condito con poco olio

CENA: un petto di pollo/tacchino grigliato/lesso oppure pesce lesso.

Dalle ore 21.00 del giorno precedente l'esame deve osservare un digiuno completo (può bere liberamente acqua non gasata).

Dalle ore 7.00 del giorno dell'esame il paziente deve restare a digiuno, non lavarsi i denti, non fumare, non deve svolgere attività fisica.

- Durante l'esecuzione del test non è consentito fumare, bere, mangiare, masticare chewing gum o caramelle o svolgere attività fisica stancante.

Procedura per la raccolta del campione di espirato

Raccolta del campione Basale:

- Far soffiare in una busta (tempo 0)
- Apporre l'etichetta di riconoscimento del paziente relativa al Tempo 0
- Far ingerire al paziente la soluzione di 16ml di lattulosio (8ml nei bambini)
- Eseguire l'operazione come per il prelievo basale ogni 15 minuti per una durata totale di 4 ore (16 campioni + 1 basale da effettuare prima della somministrazione del substrato)