

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

CONSENSO INFORMATO PER TERAPIA INFILTRATIVA

Modulo di consenso informato per l'esecuzione
di infiltrazioni articolari e periarticolari

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-MOD150_00	00	27/04/2026	2
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSGI	Direzione Generale	Interno	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Rosetta Greco	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
27/04/2026	27/04/2026	27/04/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

Dati del paziente

Cognome e Nome	
Data di nascita	
Codice Fiscale	
Diagnosi	
Prodotto somministrato	
Lotto n.	
Data trattamento	

1. Che cosa è la terapia infiltrativa

La terapia infiltrativa è una procedura mini-invasiva che consiste nell'iniezione diretta di farmaci (antinfiammatori non steroidei, corticosteroidi, anestetici locali, acido ialuronico) all'interno delle articolazioni o nella zona periarticolare per ridurre il dolore, l'infiammazione e migliorare la funzionalità articolare.

2. Indicazioni

La terapia infiltrativa è indicata per il trattamento di artrosi articolare, artrite reumatoide e altre patologie infiammatorie articolari, borsiti, tendiniti, epicondiliti (gomito del tennista) e fascite plantare.

3. Modalità di esecuzione

La procedura viene generalmente eseguita in regime ambulatoriale. Previa accurata preparazione della cute, la somministrazione avviene mediante l'introduzione di un ago fino alle sedi anatomiche interessate. Se necessario, la zona da infiltrare viene identificata mediante ecografia per assicurare la corretta localizzazione dell'iniezione.

4. Rischi e possibili complicanze

Sebbene la procedura sia mini-invasiva e generalmente sicura, anche con la migliore esecuzione e rispettando tutte le precauzioni necessarie, possono verificarsi: dolore, gonfiore, calore e rossore nella sede di iniezione (moderati e transitori), ematoma, reazioni allergiche alle sostanze utilizzate (locali o generalizzate), infezioni locali o intrarticolari, reazioni vasovagali. Nonostante i vantaggi dimostrati dal trattamento, è possibile che la degenerazione articolare permanga e che i sintomi e le limitazioni possano ripresentarsi dopo un periodo di tempo variabile.

5. Espressione del consenso

Dichiaro di aver ricevuto informazioni comprensibili dal Medico Specialista relative alle mie condizioni cliniche, al trattamento indicato, ai benefici attesi e ai rischi di complicanze.

Scelta	Barrare
Acconsento a eseguire l'infiltrazione	☐
Non acconsento a eseguire l'infiltrazione	☐

Ruolo	Firma	Data
Paziente (o genitore/tutore)		
Medico Specialista		