

SEZIONE A – ANALISI MICROBIOLOGICA CLASSICA

DATI ANAGRAFICI E STRUTTURA RICHIEDENTE			
Struttura / Medico richiedente			
Cognome		Nome	
Data di nascita		Luogo di nascita	
Codice fiscale		Email	
Indirizzo di residenza		Telefono	
Data prelievo		Data invio campione	

TAMPONE IN TERRENO DI TRASPORTO

Tampone con terreno di trasporto liquido: può essere inviato un unico tampone per più analisi (si ricorda di inviare tutte le etichette). In caso di positività viene sempre eseguito l'antibiogramma (ad eccezione della Gardnerella vaginalis).

Cod.	☐	Esame
BATT	☐	BATTERIOSCOPICO
LATTOB	☐	LATTOBACILLI
TV	☐	TAMPONE VAGINALE (analisi di germi comuni e miceti, escluso Gardnerella v., Trichomonas v., Neisseria g., Chlamydia t., Mycoplasma)
TE	☐	TAMPONE ENDOCERVICALE (analisi di germi comuni e miceti, escluso Gardnerella v., Trichomonas v., Neisseria g., Chlamydia t., Mycoplasma)
TU	☐	TAMPONE URETRALE (analisi di germi comuni e miceti, escluso Gardnerella v., Trichomonas v., Neisseria g., Chlamydia t., Mycoplasma)
4TVR	☐	TAMPONE VAGINO/RETTALE — Ricerca Streptococcus agalactiae (GBS). Settimana di gestazione: _____
TVU	☐	TAMPONE VULVARE (analisi di germi comuni e miceti, escluso Gardnerella v., Trichomonas v., Neisseria g., Chlamydia t., Mycoplasma)
TEND	☐	TAMPONE ENDOMETRIALE (analisi di germi comuni e miceti, escluso Gardnerella v., Trichomonas v., Neisseria g., Chlamydia t., Mycoplasma)
TCV	☐	TAMPONE CERVICO-VAGINALE (analisi di germi comuni e miceti)
TR	☐	TAMPONE RETTALE (analisi di germi comuni e miceti)
TRKPC	☐	TAMPONE RETTALE — KPC ed Enterobatteri Carbapenemi resistenti
TRVRE	☐	TAMPONE RETTALE — Ricerca colturale per VRE
GAR	☐	Analisi colturale GARDNERELLA VAGINALIS. Sede del prelievo: _____
NEI	☐	Neisseria Gonorrhoeae T. ENDOCERVICALE Analisi colturale
NEIU	☐	Neisseria Gonorrhoeae T. URETRALE Analisi colturale
ICOU1	☐	Mycoplasma hominis — Ureaplasma spp T. URETRALE Analisi colturale
ICOU	☐	Mycoplasma hominis — Ureaplasma spp T. ENDOCERVICALE Analisi colturale
TFC	☐	TAMPONE FARINGEO COMPLETO (analisi di germi comuni e miceti)
TILIN	☐	TAMPONE LINGUALE (analisi di germi comuni e miceti)
TAURD	☐	TAMPONE AURICOLARE DESTRO (analisi di germi comuni e miceti)
TAURS	☐	TAMPONE AURICOLARE SINISTRO (analisi di germi comuni e miceti)
TOCU	☐	TAMPONE OCULARE SINISTRO (analisi di germi comuni e miceti)
TOU	☐	TAMPONE OCULARE DESTRO (analisi di germi comuni e miceti)
TCO	☐	TAMPONE CAVO ORALE (analisi di germi comuni e miceti)
TNAS	☐	TAMPONE NASALE (analisi di germi comuni e miceti)
TCUT	☐	TAMPONE CUTANEO (analisi di germi comuni e miceti). Sede del prelievo: _____
TFER	☐	Tampone da Ferita Analisi colturale incluso antibiogramma
TUL	☐	TAMPONE GENERICO (analisi di germi comuni e miceti). Sede del prelievo: _____

TAMPONE A SECCO O IN TERRENO DI TRASPORTO LIQUIDO (COPAN)

TRIV	☐	TRICHOMONAS VAGINALIS RICERCA DIRETTA
------	--------------------------	---------------------------------------

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

TD-SGI-DEX007_00 - Rev. 00 - Richiesta per Analisi Esterne Microbiologia

TAMPONE IN TERRENO DI TRASPORTO LIQUIDO (COPAN)

TV1	☐	TAMPONE SECRETO VAGINALE ricerca di germi comuni con antibiogramma, lieviti e trichomonas, incluso esame microscopico
TU1	☐	TAMPONE SECRETO URETRALE ricerca di germi comuni (compresi Micoplasmi, Neisseria, antibiogramma e batterioscopico), lieviti e ricerca Trichomonas
TE1	☐	TAMPONE SECRETO ENDOCERVICALE ricerca di germi comuni (compresi Micoplasmi, Neisseria e antibiogramma), lieviti e ricerca Trichomonas

☐ **ANTIMICOGRAMMA**

Eseguito solo su richiesta del medico. NB: i farmaci testati in laboratorio si riferiscono a dosaggi per uso endovenoso.

CONTENITORE STERILE CON TAPPO A VITE

ESP	☐	ESPETTORATO (analisi di germi comuni e miceti)
SPE	☐	SPERMIOCOLTURA (analisi di germi comuni e miceti)
ICOU2	☐	Mycoplasma hominis — Ureaplasma spp URINE Analisi colturale
ICOU3	☐	Mycoplasma hominis — Ureaplasma spp L. SEMINALE Analisi colturale
NEIS	☐	Neisseria Gonorrhoeae L. SEMINALE Analisi colturale

PORTAGERM

☐	LIQUIDO SINOVIALE (analisi di germi comuni aerobi e anaerobi e miceti)
--------------------------	--

NB: in caso di invio del campione in contenitori differenti non sarà possibile procedere con la ricerca di batteri anaerobi.

Note	
Data	
Firma medico / operatore sanitario	

SEZIONE B – ANALISI MICROBIOLOGICA MOLECOLARE

DATI ANAGRAFICI E LABORATORIO/MEDICO RICHIEDENTE			
Laboratorio / Medico richiedente			
Cognome		Nome	
Data di nascita		Luogo di nascita	
Codice fiscale		Email	
Indirizzo di residenza		Telefono	
Data prelievo		Data invio campione	

SINGOLA RICERCA (tampone a secco o terreno liquido COPAN)	PACCHETTI DI MOLECOLARE (tampone a secco o terreno liquido COPAN)
☐ CHLAMYDIA TRACHOMATIS ☐ GARDNERELLA VAGINALIS ☐ MYCOPLASMA GENITALIUM ☐ MYCOPLASMA HOMINIS ☐ NEISSERIA GONORRHOEAE ☐ TRICHOMONAS VAGINALIS ☐ TREPONEMA PALLIDUM ☐ UREAPLASMA UREALYTICUM ☐ UREAPLASMA PARVUM ☐ CANDIDA ALBICANS In caso di esito positivo NON è possibile eseguire antibiogramma.	☐ PROFILO MST1 (C. trachomatis, M. genitalium, N. gonorrhoeae, T. vaginalis) ☐ PROFILO 6BATT, CERVICITI E URETRITI (C. trachomatis, M. genitalium, M. hominis, N. gonorrhoeae, T. vaginalis, U. urealyticum e parvum) ☐ VAGINOSI BATTERICHE (quantizzazione: Lactobacillus spp, Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae) ☐ CANDITEST (C. Albicans, C. glabrata, C. krusei) In caso di esito positivo NON è possibile eseguire antibiogramma.

MATERIALE / SEDE PRELIEVO (per singola ricerca)	PACCHETTI MISTI (colturale e molecolare)
☐ Tampone a secco/terreno liquido cervicale ☐ Tampone a secco/terreno liquido uretrale ☐ Tampone a secco/terreno liquido vaginale ☐ Tampone a secco/terreno liquido vulvare ☐ Liquido seminale ☐ Urine (mitto intermedio) in provetta sterile ☐ Tampone a secco/terreno liquido congiuntivale ☐ Altro: _____	☐ PROFILO 8BATT — analisi classica di germi comuni e miceti Antibiogramma eseguito in caso di positività, antimicogramma NON incluso — ricerca molecolare di C. trachomatis, M. genitalium, M. hominis, N. gonorrhoeae, T. vaginalis, U. urealyticum e parvum, G. vaginalis In caso di esito positivo NON è possibile eseguire antibiogramma. Per l'esecuzione è obbligatorio l'invio di: 1 singolo tampone in terreno liquido (COPAN) oppure 2 tamponi: — 1 cervico-vaginale in terreno di coltura COPAN — 1 cervico-vaginale a secco

Note	
Data	
Firma medico / operatore sanitario	

Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione modifiche	Approvazione
00	15/04/2026	Prima emissione SGI (integra modulo Analisi Microbiologica Laboratorio Esterno)	Francesco Epifani