

Raccolta delle Urine delle 24 Ore (Non Trattate)

La raccolta delle urine delle 24 ore deve essere eseguita per numerosi analiti tra cui:

- Alluminio, Amilasuria, Acido Urico, Acido 5-idrossiindolacetico, Acido omovanillico, Acido vanilmandelico, Adrenalina-Noradrenalina urinaria, Alfa 1 Microglobulina urine 24h, Aldosterone Urinario, Arsenico, B2 Microglobulina, Cadmio, Calcio Urinario, Cobalto, Cromo, Catene leggere kappa e lambda (proteinuria di Bence-Jones), 17-Chetosteroidi, Cistina urine 24h, Citrato urine 24h, Clearance dell'urea, Clearance della creatinina, Cloro urinario, Coproporfirine, Cortisolo urinario, Cotinina urina 24h, Creatinina urine 24h, Cross links, Dopamina urinaria, Elettroforesi proteine urinarie, Ferro urine 24h, Fosforo Urinario, Glicosuria, Idrossiprolinuria 24h, Immunofissazione urinaria, Iodio urinario, Magnesio Urinario, Mercurio, Metanefrine urinarie, Metossitiramina, Microalbuminuria 24h, Nichel Urine 24h, Normetanefrine urinarie, Peptide C urinario, Piombo Urine 24h, Porfirine totali, Potassio urinario, Proteinuria, Rame urine 24h, Sodio urinario, Uroporfirine urine 24h, Urea urine 24h, Serotonina Urine 24h.

Note particolari per analiti specifici:

Acido vanilmandelico: a partire dalle 48 ore precedenti l'inizio e per tutto il tempo di raccolta delle urine è necessario osservare una dieta priva dei seguenti alimenti: avocado, banane, kiwi, frutta secca, caffè, tè, cioccolato. Durante questo periodo si consiglia, previa consultazione del medico, di evitare l'assunzione di farmaci; in caso contrario, è opportuno comunicare il nome dei farmaci assunti al momento dell'esame.

17-Chetosteroidi: a partire dalle 48 ore precedenti l'inizio e per tutto il tempo di raccolta delle urine è necessario osservare una dieta priva dei seguenti alimenti: ananas, avocado, banane, kiwi, more, prugne rosse, melanzane, pomodori, frutta secca, caffè, tè, cioccolato. Durante questo periodo si consiglia, previa consultazione del medico, di evitare l'assunzione di farmaci.

Idrossiprolinuria 24h: a partire dalle 48 ore precedenti l'inizio e per tutto il tempo di raccolta delle urine evitare i seguenti alimenti: carne, derivati della carne, brodo ed estratti di carne, prodotti contenenti gelatina, pesce, dolci, uova. Durante questo periodo si consiglia, previa consultazione del medico, di evitare l'assunzione di farmaci.

Coproporfirine, Porfirine totali, Uroporfirine: mantenere il contenitore al riparo dalla luce per tutta la durata della raccolta e fino alla consegna.

Metanefrine urinarie: nelle 48 ore precedenti evitare cibi contenenti vaniglia, agrumi, caffè, tè, cioccolato, banane. Segnalare l'assunzione di farmaci antiipertensivi, antidepressivi e decongestionanti nasali.

Materiale necessario:

1 tanica urine 24h (reperibile in farmacia) e 1 contenitore urine (non sterile).

Modalità di raccolta:

1. Cominciare la raccolta svuotando completamente la vescica, scartando quindi le urine della prima minzione del mattino, e segnando l'ora di inizio raccolta (esempio ore 7:00);
2. Raccogliere in un recipiente tutte le urine della giornata e della notte, avendo cura di non dimenticare nessuna minzione;
3. Il mattino successivo terminare la raccolta con le urine emesse alla stessa ora del giorno precedente (esempio ore 7:00) nello stesso contenitore;
4. Al termine della raccolta mescolare accuratamente le urine delle 24h;
5. Versare una quantità (min. 50 ml) nel contenitore;
6. Annotare sul contenitore la quantità totale raccolta nella tanica urine 24h;
7. Consegnare il campione in Struttura per il Laboratorio.

N.B.: le urine devono essere conservate in un luogo fresco (2-8 °C) durante tutto il periodo della raccolta. Se anche una sola minzione viene dimenticata o perduta, la raccolta deve essere ripetuta interamente.

12. Raccolta delle Urine delle 24 Ore Acidificate

La raccolta delle urine delle 24 ore acidificate deve essere eseguita per il seguente analita: Ossalati Urine 24h.

Materiale necessario: 1 tanica urine 24h (reperibile in farmacia) e 1 contenitore urine (non sterile) da consegnare in Struttura per il Laboratorio.

Modalità di raccolta:

1. Cominciare la raccolta svuotando completamente la vescica, scartando quindi le urine della prima minzione del mattino, e segnando l'ora di inizio raccolta (esempio ore 7:00);
2. Sul fondo del contenitore di raccolta delle urine porre 2 cucchiaini da tavola colmi di acido muriatico in commercio alla concentrazione del 10-12% e aggiungere le urine emesse nella giornata e nella notte mescolando accuratamente dopo ogni aggiunta;
3. Il mattino successivo terminare la raccolta con le urine emesse alla stessa ora del giorno precedente (esempio ore 7:00) nello stesso contenitore;
4. Al termine della raccolta mescolare accuratamente le urine delle 24h;
5. Versare una quantità (min. 50 ml) nel contenitore;
6. Annotare sul contenitore la quantità totale raccolta e consegnare il campione in Struttura per il Laboratorio.

N.B.: le urine devono essere conservate in un luogo fresco durante il periodo di raccolta.

ATTENZIONE: USARE LA MASSIMA CAUTELA DURANTE L'UTILIZZO DI ACIDO MURIATICO IN QUANTO FORTEMENTE CORROSIVO ED IRRITANTE. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto cutaneo lavare abbondantemente con acqua corrente. In caso di contatto oculare lavare con acqua per almeno 15 minuti e consultare immediatamente un medico. Conservare fuori dalla portata dei bambini.