

1. Préambule

Le présent document fournit les instructions opérationnelles pour la correcte collecte des échantillons biologiques de la part des patients de Toscana Diagnostica S.r.l. Le respect des indications rapportées est fondamental pour garantir la fiabilité des résultats analytiques et la validité diagnostique des examens.

Les conteneurs à usage unique pour la collecte des échantillons sont fournis gratuitement par Toscana Diagnostica ou sont disponibles en pharmacie. En cas de doutes sur les modalités de préparation ou collecte, le patient est invité à contacter le Point de Prélèvement ou le Laboratoire d'Analyses.

2. Prélèvement de Sang Veineux

Pour le prélèvement de sang veineux le patient doit:

Observer un jeûne de 8-12 heures avant le prélèvement;
Éviter de soutenir des efforts physiques dans les 12 heures précédentes;
Ne pas fumer dans la période entre le réveil et l'effectuation du prélèvement;
Ne pas consommer d'alcool dans les 12 heures précédentes le prélèvement.

3. Glycémie Pré Prandiale

Le prélèvement doit être exécuté à distance de 2 heures du petit-déjeuner.

4. Glycémie Post Prandiale

Le prélèvement doit être exécuté à distance de 2 heures du repas de midi.

5. Courbe Glycémique et Courbe Glycémique en Grossesse

Le/la patient/e doit:

Se présenter à l'ouverture du Point de Prélèvement;
Être à jeûn depuis au moins 8 heures et pas plus de 14 heures avant le prélèvement.
Le/la patient/e NE DOIT PAS modifier son régime alimentaire dans les 3 jours précédents l'examen et doit maintenir son activité physique habituelle. Après avoir exécuté le prélèvement basal pour la détermination de la glycémie et vérifiée l'aptitude à l'examen, au/à la patient/e est administrée la quantité de solution de glucose prévue par la prescription médicale ou par le type de courbe, qui doit être consommée dans les 5 minutes. Le/la patient/e doit rester sur place pour toute la durée prévue par le type de courbe prescrite par le médecin traitant.

Schéma des Courbes Glycémiques:

Courbe glycémique grossesse (cod. 1166): 75 g glucose — Points: Basale | 60' | 120'

Courbe de charge de glucose 75 g (cod. 1079): 75 g glucose — Points: Basale | 30' | 60' | 90' | 120' | 150'

Courbe insulinémique (cod. 6533): 75 g glucose — Points: Basale | 30' | 60' | 90' | 120'

Note: en fonction de la demande du médecin les points de la courbe insulinémique peuvent être modifiés.

6. Médicaments

Le/la patient/e doit se présenter au Point de Prélèvement à jeûn pour le prélèvement avant l'assunzione des médicaments du matin.

7. Collecte pour Examen Urinaire Complet

Laver avec précision les génitaux externes. Pour l'examen des urines complet collecter un échantillon des premières urines du matin en écartant le premier jet. Utiliser des conteneurs à usage unique fournis gratuitement par Toscana Diagnostica ou disponibles en pharmacie. Chez les femmes il est conseillé d'attendre au moins trois jours à partir de la fin du cycle menstruel. Fermer très bien le conteneur avec le bouchon approprié après avoir collecté une quantité d'urine égale à la limite MAX du conteneur (50 mL).

L'échantillon doit être livré dans le plus bref délai possible à partir de la collecte.

8. Collecte Urine pour Urinoculture

L'urine doit être collectée dans un conteneur stérile à large ouverture. L'examen s'effectue sur la première urine du matin en suivant la technique du "jet intermédiaire" avec la procédure suivante:

Se laver avec précision les mains;

Laver avec précision les génitaux externes avec de l'eau et du savon, rincer;

Les femmes doivent maintenir écartées avec une main les grandes lèvres et les hommes doivent maintenir complètement rétractée la peau du gland pendant les opérations de nettoyage et de collecte de l'échantillon;

Écarter le premier jet d'urine;

Collecter l'urine suivante directement dans le conteneur;

Écarter le dernier jet d'urine;

Fermer rapidement le conteneur au terme de la collecte en contrôlant d'avoir collecté une quantité d'urine égale à la limite MAX du conteneur (50 mL);

Livrer dans le plus bref délai possible; si la livraison au Laboratoire est différée, l'échantillon d'urines doit être conservé au réfrigérateur jusqu'à un maximum de 24 heures.

Il est nécessaire d'avoir suspendu l'éventuelle thérapie antibiotique depuis au moins une semaine sauf indication contraire du médecin traitant.

9. Collecte Urine pour Urinoculture chez les Patients Pédiatriques

Laver avec précision les mains avec de l'eau et du savon;

Nettoyer avec précision les génitaux externes;

Appliquer le sachet stérile (disponible en pharmacie) en le faisant bien adhérer à la peau;

Laisser "in situ" le sachet pour pas plus de 60-90 minutes; si nécessaire procéder à sa substitution et répéter l'opération;

Dès que la miction s'est produite, retirer le sachet, le refermer avec précision, le placer fermé sans transvaser dans un conteneur en plastique stérile pour urinoculture et livrer dans le plus bref délai possible au Laboratoire/Point de Prélèvement. Si la livraison au Laboratoire est différée, l'échantillon d'urines doit être conservé au réfrigérateur jusqu'à un maximum de 24 heures.

10. Collecte des Urines des 24 Heures (Non Traitées)

TD-SGI-INF003_00 · Rev. 00 · Information Patient Collecte Echantillons FR

La collecte des urines des 24 heures doit être exécutée pour nombreux analytes parmi lesquels: Aluminium, Amylasuria, Acide Urique, Acide 5-hydroxyindolacétique, Acide homovanillique, Acide vanillmandelique, Adrénaline-Noradrénaline urinaire, Alfa 1 Microglobuline, Aldostérone Urinaire, Arsenic, B2 Microglobuline, Cadmium, Calcium Urinaire, Cobalt, Chrome, Chaînes légères kappa et lambda, 17-Cétostéroïdes, Cystine, Citrate, Clairance de l'urée et de la créatinine, Chlore urinaire, Coproporphyrines, Cortisol urinaire, Cotinine, Créatinine, Cross links, Dopamine urinaire, Électrophorèse protéines urinaires, Fer, Phosphore Urinaire, Glycosurie, Hydroxyprolinuria, Immunofixation urinaire, Iode urinaire, Magnésium Urinaire, Mercure, Méтанéphrines urinaires, Méthoxytyramina, Microalbuminuria, Nickel, Normétanéphrines urinaires, Peptide C urinaire, Plomb, Porphyrines totales, Potassium urinaire, Protéinuria, Cuivre, Sodium urinaire, Uroporphyrines, Urée, Sérotonine.

Notes particulières pour analytes spécifiques:

Acide vanillmandelique: à partir des 48 heures précédentes le début et pour tout le temps de collecte des urines il est nécessaire d'observer un régime alimentaire dépourvu des aliments suivants: avocat, bananes, kiwi, fruits secs, café, thé, chocolat. Pendant cette période il est conseillé, après consultation du médecin, d'éviter l'assunzione de médicaments; en cas contraire, il est opportun de communiquer le nom des médicaments assumés au moment de l'examen.

17-Cétostéroïdes: à partir des 48 heures précédentes le début et pour tout le temps de collecte des urines il est nécessaire d'observer un régime alimentaire dépourvu des aliments suivants: ananas, avocat, bananes, kiwi, mûres, prunes rouges, aubergines, tomates, fruits secs, café, thé, chocolat. Pendant cette période il est conseillé, après consultation du médecin, d'éviter l'assunzione de médicaments.

Hydroxyprolinuria 24h: à partir des 48 heures précédentes le début et pour tout le temps de collecte des urines éviter les aliments suivants: viande, dérivés de la viande, bouillon et extraits de viande, produits contenant gélatine, poisson, bonbons, œufs. Pendant cette période il est conseillé, après consultation du médecin, d'éviter l'assunzione de médicaments.

Coproporphyrines, Porphyrines totales, Uroporphyrines: maintenir à l'abri de la lumière.

Pour la collecte des urines il est nécessaire: 1 bidon urines 24h (disponible en pharmacie) et 1 conteneur urines (non stérile).

Modalités de collecte:

Commencer la collecte en vidant complètement la vessie, écartant donc les urines de la première miction du matin, et notant l'heure de début collecte (exemple 7:00);

Collecter dans un récipient toutes les urines de la journée et de la nuit;

Le matin suivant terminer la collecte avec les urines émises à la même heure du jour précédent (exemple 7:00) dans le même conteneur;

Au terme de la collecte mélanger avec précision les urines des 24h;

Verser une quantité (min. 50 ml) dans le conteneur;

Rapporter sur le même la quantité totale collectée du bidon urines 24h et livrer l'échantillon dans la Structure pour le Laboratoire.

N.B.: les urines doivent être conservées dans un lieu frais pendant la période de collecte.

11. Collecte des Urines des 24 Heures Acidifiées

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

TD-SGI-INF003_00 · Rev. 00 · Information Patient Collecte Echantillons FR

La collecte des urines des 24 heures acidifiées doit être exécutée pour l'analyte suivant: Oxalates Urines 24h.

Pour la collecte des urines il est nécessaire: 1 bidon urines 24h (disponible en pharmacie) et 1 conteneur urines (non stérile) à livrer dans la Structure pour le Laboratoire.

Modalités de collecte:

Commencer la collecte en vidant complètement la vessie, écartant donc les urines de la première miction du matin, et notant l'heure de début collecte (exemple 7:00);

Sur le fond du conteneur de collecte des urines placer 2 cuillerées à table remplies d'acide chlorhydrique en commerce à la concentration du 10-12% et ajouter les urines émises dans la journée et dans la nuit en mélanger avec précision après chaque ajout;

Le matin suivant terminer la collecte avec les urines émises à la même heure du jour précédent (exemple 7:00) dans le même conteneur;

Au terme de la collecte mélanger avec précision les urines des 24h;

Verser une quantité (min. 50 ml) dans le conteneur;

Rapporter sur le même la quantité totale collectée du bidon urines 24h et livrer l'échantillon dans la Structure pour le Laboratoire.

N.B.: les urines doivent être conservées dans un lieu frais pendant la période de collecte.

ATTENTION: UTILISER LA MAXIMUM PRUDENCE PENDANT L'UTILISATION D'ACIDE CHLORHYDRIQUE EN TANT QUE FORTEMENT CORROSIF ET IRRITANT.

12. Collecte des Fèces pour Coprosculture, Recherche de Parasites, Examen Complet

Les fèces doivent être collectées avec la cuillère normale présente dans les conteneurs courants en commerce dans la quantité égale à une noix. En cas de livraison tardive au Laboratoire l'échantillon peut être conservé au réfrigérateur jusqu'à la livraison (jusqu'à un maximum de 24 heures). Il est rappelé que:

Pour l'examen parasitologique il est conseillable d'exécuter l'examen sur trois échantillons de fèces du matin collectées en jours différents et livrées chaque jour;

Pour la coprosculture il est nécessaire d'avoir suspendu l'éventuelle thérapie antibiotique depuis au moins une semaine sauf indication contraire du médecin traitant; pendant la collecte il faut faire attention à ne pas contaminer les fèces ni avec l'eau des sanitaires ni avec l'urine pour ne pas compromettre l'issue microbiologique. En cas de livraison tardive au Laboratoire l'échantillon peut être conservé au réfrigérateur jusqu'à la livraison en laboratoire (jusqu'à un maximum de 24 heures); Pour l'examen complet il est nécessaire d'utiliser un conteneur stérile et collecter les éventuelles parties muqueuses ou hémorragiques et livrer dans le plus bref délai possible au Laboratoire. En cas de livraison tardive au Laboratoire l'échantillon peut être conservé au réfrigérateur jusqu'à la livraison en laboratoire (jusqu'à un maximum de 24 heures).

13. Scotch Test

Exécuter le matin sans avoir effectué des opérations hygiéniques. Utiliser du scotch transparent en appuyant la partie adhésive du ruban à l'orifice anal et en appliquant une légère pression pendant 30 secondes. Étendre le ruban adhésif sur la surface du verre de lame précédemment fourni par le Laboratoire en évitant la formation de plis. La collecte doit être effectuée le même jour de la livraison.

Les œufs de *Enterobius Vermicularis* sont collants et très infectieux, par conséquent, pendant toutes les phases de collecte il est conseillé de porter des gants de protection.

14. Collecte Fèces pour Recherche Sang Occulte et Calprotectine Fécale

Les fèces pour la recherche du sang occulte et calprotectine doivent être collectées à travers le conteneur libéré par le Laboratoire, en suivant les instructions annexées. Il est rappelé:

Maintenir le conteneur hors de la portée des enfants;
Le liquide contenu dans le conteneur ne doit pas être ingéré et ne doit pas entrer en contact avec les yeux ou avec les muqueuses. Le tube a été expressément conçu pour éviter la fuite du liquide. Se tourner immédiatement vers le médecin si un contact s'est vérifié;
Effectuer le prélèvement immédiatement après la défécation;
Si demandé, noter sur le conteneur: Date Collecte (D), Code d'identification échantillon (ID), Nom Patient (N);
Ne pas insérer le conteneur ou partie de celui-ci dans l'anus;
Ne pas effectuer la collecte des fèces en cas de diarrhée, pendant les règles, en cas de saignement du rectum (par ex. hémorroïdes ou autres causes) ou si contaminées par l'urine;
Utiliser le dispositif une fois seule;
Ne pas ouvrir ou ne pas tenter d'ouvrir le bouchon transparent;
En cas d'utilisation d'un support pour la collecte de l'échantillon, suivre les instructions rapportées sur le même. Successivement suivre la procédure de collecte de l'échantillon à partir du point 3.

Instructions pour la collecte:

Placer du papier hygiénique dans le sanitaire;
Déféquer en correspondance du papier hygiénique. Si possible s'asseoir à l'envers;
Dévisser le bouchon vert pourvu de baguette;
Insérer la baguette de prélèvement en quatre points différents et strier en croix sur la surface. Les rainures doivent être recouvertes;
Replacer et visser fermement le bouchon vert pourvu de baguette. Ne pas réouvrir;
Conserver le dispositif de prélèvement au réfrigérateur et à l'obscurité. Rendre le dispositif de prélèvement au plus tôt pour l'analyse.

15. Collecte Fèces: Élastase Fécale

Les fèces pour la recherche de l'élastase fécale doivent être collectées à travers le conteneur libéré par le Laboratoire ou disponible en pharmacie. Il est rappelé:

Maintenir le conteneur hors de la portée des enfants;
Effectuer le prélèvement immédiatement après la défécation;
Ne pas effectuer la collecte des fèces en cas de diarrhée, pendant les règles, en cas de saignement du rectum (par ex. hémorroïdes ou autres causes) ou si contaminées par l'urine;
Utiliser le dispositif une fois seule.

Instructions pour la collecte:

Placer du papier hygiénique dans le sanitaire;
Déféquer en correspondance du papier hygiénique. Si possible s'asseoir à l'envers;
Dévisser le bouchon bleu et avec la spatule appropriée présente dans le conteneur prélever une petite quantité de fèces. Ne pas remplir le conteneur;

TD-SGI-INF003_00 · Rev. 00 · Information Patient Collecte Echantillons FR

Visser avec soin le bouchon du conteneur et le conserver au réfrigérateur;
Livrer l'échantillon collecté au centre de prélèvement dans la journée.

16. Tampon Vaginal et Vagino-Rectal

La patiente:

Doit s'abstenir des rapports sexuels dans les 24 heures précédentes l'examen;
Doit avoir suspendu chaque thérapie antibiotique et antifongique depuis au moins une semaine;
Ne doit pas avoir exécuté des irrigations vaginales dans les 24 heures précédentes l'examen;
Le prélèvement ne peut pas être exécuté pendant le cycle menstruel (sauf cas où la symptomatologie aiguë rend indispensable le prélèvement aussi dans cette période).

Limitativement au tampon vaginal, propédeutique à la culture, il est nécessaire que dans le laboratoire parvienne une lame à frais, effectuée au moment du prélèvement, accompagnée du module relatif adéquatement compilé. Au contraire, pour le tampon vagino-rectal, n'est pas prévu la lame à frais.

17. Tampon Cervical et Endocervical

La patiente:

Doit s'abstenir des rapports sexuels dans les 24 heures précédentes l'examen;
Doit avoir suspendu chaque thérapie avec antibiotiques depuis au moins une semaine et ne doit pas avoir exécuté des irrigations vaginales dans les 24 heures précédentes l'examen;
Le prélèvement ne peut pas être exécuté pendant le cycle menstruel (sauf cas où la symptomatologie aiguë rend indispensable le prélèvement aussi dans cette période).

18. Tampon Urétral

La patiente:

Doit s'abstenir des rapports sexuels dans les 24 heures précédentes l'examen;
Doit avoir suspendu chaque thérapie antibiotique et antifongique depuis au moins une semaine;
Ne doit pas avoir exécuté des irrigations vaginales dans les 24 heures précédentes l'examen;
Ne doit pas avoir les règles;
Ne doit pas avoir uriné dans les trois heures précédentes.

Le patient:

Doit s'abstenir des rapports sexuels dans les 24 heures précédentes l'examen;
Doit avoir suspendu chaque thérapie antibiotique et antifongique depuis au moins une semaine;
Ne doit pas avoir uriné dans les 3 heures précédentes.

19. Collecte d'Expectorations pour Examen de Culture

Exécuter la collecte le matin À JEÛN dans un conteneur stérile à large ouverture; se rincer avec précision la cavité orale avec quelques gargarismes effectués avec de l'eau; exécuter une expiration profonde en collectant l'expectoration directement dans le conteneur stérile. Il est important que l'échantillon ne soit pas constitué de salive et il est fondamental de livrer au Point de Prélèvement dans une heure du prélèvement.

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

20. Collecte d'Expectorations pour Examen Cytologique sur Trois Échantillons

Pour la collecte il est recommandé d'exécuter scrupuleusement les instructions suivantes:

Au réveil, se rincer la cavité orale avec de l'eau;
Tousser profondément;
Collecter l'expectoration directement dans le conteneur;
Se rincer avec précision la cavité orale avec quelques gargarismes effectués avec de l'eau;
Exécuter une expiration profonde (ne doit pas être collectée la salive);
Collecter l'expectoration directement dans le conteneur fourni par le laboratoire;
Répéter l'ensemble de la procédure pendant trois jours consécutifs en conservant les conteneurs dans un lieu frais.

ATTENTION: la solution présente dans le conteneur pour la collecte de l'échantillon a fonction de CONSERVANT; par conséquent, ne doit pas être jetée ni dispersée dans l'environnement. Certaines substances composant le conservant à l'état pur résultent toxiques ou inflammables. Elles cependant sont présentes à concentration négligeable dans la solution finale, conférant caractéristiques de NON TOXICITÉ et de NON INFLAMMABILITÉ. Il est conseillé cependant de: conserver les conteneurs fermés, à température ambiante (15-25°C) loin de sources de chaleur et de flamme, ne pas ingérer, éviter le contact avec la peau et yeux et conserver hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau et solution ophtalmique décongestionnante. En cas d'ingestion boire beaucoup d'eau, éviter des émétiques, lait ou charbon, consulter un médecin en présentant ce feuillet. Les trois échantillons, doivent être livrés en Laboratoire, accompagnés par la documentation concernant: symptômes, interventions précédentes, examens histologiques, cytologiques, radiologiques, échographiques du conduit respiratoire et les thérapies exécutées.

21. Prélèvement de Matériel Cervico-Vaginal pour Exécution PAP Test

La patiente:

Doit s'abstenir des rapports sexuels dans les 48 heures précédentes l'examen;
Ne doit pas avoir exécuté des thérapies topiques ou des irrigations vaginales dans les 24 heures précédentes l'examen;
Le prélèvement peut être exécuté jusqu'à 5 jours avant le cycle menstruel et seulement 5 jours après la fin du même.

Pour l'examen du liquide séminal et pour les échantillons biologiques non expressément mentionnés il est recommandé de contacter le Laboratoire.

22. Spermoculture

Le patient doit s'abstenir des rapports sexuels dans les 24h précédentes l'examen; le patient doit avoir cessé l'éventuelle thérapie antibiotique depuis au moins une semaine; le prélèvement doit être précédé d'un nettoyage avec précision des génitaux externes et des mains; la collecte du sperme doit s'effectuer par masturbation directement dans un conteneur stérile. En cas de semina tardive le matériel doit être conservé au réfrigérateur au maximum pour 24 heures.

23. Examen Cytologique Urinaire sur Trois Échantillons

Pour la collecte il est recommandé d'exécuter scrupuleusement les instructions suivantes:

Éliminer la première urine du matin;

Boire environ un litre d'eau ou autre boisson non alcoolisée et non gazeuse;

Se laver avec précision les génitaux;

Après avoir bu, collecter dans le conteneur fourni par le laboratoire;

Répéter l'ensemble de la procédure pendant trois jours consécutifs en conservant les conteneurs dans un lieu frais.

Au terme des 3 jours de collecte livrer au laboratoire les 3 échantillons et la fiche d'acceptation adéquatement compilée dans chacune de ses parties. Une collecte précise des informations cliniques est substantielle pour un diagnostic cytologique correct.

ATTENTION: la solution présente dans le conteneur pour la collecte de l'échantillon a fonction de CONSERVANT; par conséquent, ne doit pas être jetée ni dispersée dans l'environnement. Certaines substances composant le conservant à l'état pur résultent toxiques ou inflammables. Il est conseillé cependant de: conserver les conteneurs fermés, à température ambiante (15-25°C) loin de sources de chaleur et de flammes, ne pas ingérer, éviter le contact avec la peau et yeux et conserver hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau et solution ophtalmique décongestionnante. En cas d'ingestion boire beaucoup d'eau, éviter des émétiques, lait ou charbon, consulter un médecin en présentant ce feuillet.

24. Expectoration pour Collecte de Cellules Néoplastiques

L'expectoration doit être collectée le matin à jeûn.

25. Breath Test

25.1 Qu'est-ce que le Breath Test

Le Breath Test, ou test du respir, est un examen non invasif utilisé pour le diagnostic des intolérances alimentaires (lactose, glucose, sorbitol), ou dans le soupçon de contamination bactérienne (lactulose). Le test permet de déterminer les altérations du système gastro-entérique et est dirigé à ceux qui cherchent une réponse aux symptômes souvent difficiles à interpréter comme l'air dans le ventre qui peine à passer, la diarrhée, la digestion "mauvaise" ou lente, le gonflement, la constipation, la flatulence et une mauvaise digestion.

Le Breath Test à l'urée est une enquête qui s'exécute pour diagnostiquer l'infection gastroduodénale par *Helicobacter Pylori*.

25.2 Typologies de Breath Test

Breath Test LACTOSE: L'H2 Breath Test est indiqué pour déterminer le malabsorption au lactose. L'intolérance au lactose est la forme plus commune de malabsorption des hydrates de carbone et touche les personnes de tous les âges. La cause de ce malabsorption est due à la carence de lactase, normalement présente dans le petit intestin. Dans les conditions normales le lactose après l'ingestion vient clivé par les lactases intestinales en glucose et galactose qui viennent absorbés au niveau jéuno-iléal; dans le cas où il y ait une carence de lactase, le lactose atteint le côlon inaltéré où vient fermenté par la flore bactérienne produisant divers gaz parmi lesquels hydrogène, méthane et anhydride carbonique qui en partie passent dans la circulation ématique et éliminés à travers l'air des poumons.

Breath Test LACTULOSE: L'H2 Breath Test au Lactulose est utilisé pour le diagnostic de l'altération du Temps de Transit Oro-cæcal (OCTT) et SIBO. La mesure du Temps de Transit Oro-cæcal sert à évaluer le temps que l'aliment ingéré emploie pour atteindre l'intestin, temps qui peut résulter réduit en cas de diarrhée par hypermotilité ou augmenté en cas de symptômes dyspeptiques en cas de constipation ou lent vidage gastrique.

Breath Test GLUCOSE: L'H2 Breath Test est indiqué pour le diagnostic de la suraccumulation bactérienne dans l'intestin mince. Le syndrome de suraccumulation bactérienne est très fréquent, récidive en nombreuses pathologies organiques mais se rencontre aussi souvent dans le syndrome de l'intestin irritable (IBS) ou chez les patients qui assument chroniquement des médicaments (anti-acides, inhibiteurs de la pompe protéique) ou qui ont subi des interventions chirurgicales sur l'abdomen ou dans l'âge avancé.

Breath Test FRUCTOSE: L'H2 Breath Test est indiqué pour le diagnostic du malabsorption du fructose. Le fructose est un sucre présent dans la nature et peut se rencontrer dans les aliments tels que certains types de légumes, fruits et céréales. Le breath test au fructose est une méthode non invasive pour déterminer l'intolérance au fructose qui se manifeste avec diarrhée, flatulence et douleurs abdominales.

Breath Test HELICOBACTER PYLORI: Le test est indiqué pour évaluer la présence de Helicobacter pylori dans la muqueuse gastrique. L'Helicobacter Pylori est un bactérium qui trouve l'habitat idéal de croissance et réplication à l'intérieur de l'estomac humain. Ce microorganisme est considéré le seul capable de résister à l'acidité de l'environnement gastrique; cette caractéristique est conférée par la marquée capacité de produire uréase, une enzyme qui clive l'urée en acide carbonique et ammoniacque. De cette manière l'uréase neutralise les acides gastriques en créant un micro-environnement favorable à la réplication du bactérium.

25.3 Préparation au Breath Test pour lactose, lactulose, glucose, sorbitol, fructose

Le schéma de préparation:

Le test doit être exécuté à jeûn;

Aux 4/5 jours précédentes l'examen le patient ne doit pas assumer les médicaments à base d'antibiotiques, ferments lactiques et lassatifs (20 jours pour les médicaments à base d'antibiotiques);

Le médecin doit s'assurer que le patient n'ait en cours une diarrhée importante;

Le patient le jour avant l'examen doit s'alimenter exclusivement avec: PETIT-DÉJEUNER: une tasse de thé; DÉJEUNER: une assiette de riz bouilli conditionné avec peu d'huile; DÎNER: un blanc de poulet/dinde grillé/bouilli ou poisson bouilli;

À partir des heures 21.00 du jour précédent l'examen DOIT observer un jeûne complet (peut boire librement de l'eau non gazeuse);

À partir des heures 7.00 du jour de l'examen le patient DOIT rester à jeûn, ne pas se laver les dents, ne pas fumer, ne doit pas accomplir l'activité physique;

Il est conseillé d'exécuter des rinçages de la cavité orale avec chlorhexidine au 0,2% dans les 30 minutes précédentes au prélèvement basal;

Pendant l'exécution du test ne est pas consentis de fumer, boire, manger, mâcher chewing gum ou bonbons ou accomplir l'activité physique fatigante.

25.4 Préparation au Breath Test Urée (Helicobacter Pylori)

TD-SGI-INF003_00 · Rev. 00 · Information Patient Collecte Echantillons FR

Pour garantir une adéquate exactitude du test il est indispensable de suivre les instructions sous-énumérées:

Dans les dernières 4 semaines ne doivent pas avoir été assumés les antibiotiques et les inhibiteurs de la pompe protéique (PPI);

Dans la semaine précédente l'examen ne doivent pas être assumés les gastro-protecteurs;

Le matin de l'examen il faut respecter le jeûne; 2 heures avant l'examen peut on boire seulement de l'eau minérale non gazeuse;

Le jour antécédent l'examen il est nécessaire de suivre le régime alimentaire suivant: PETIT-DÉJEUNER: café d'orge, thé, biscuits secs ou pain toasté; DÉJEUNER: riz ou pâtes conditionné avec l'huile ou parmesan reggiano; APRÈS-MIDI: café d'orge, thé, biscuits secs ou pain toasté; DÎNER: viande blanche (poulet, lapin ou dinde), poisson, riz conditionné avec l'huile;

Ne pas se laver les dents;

Si c'est un fumeur devra s'abstenir du fum au moins à partir de la soirée précédente.