

1. Introducción

Este documento proporciona las instrucciones operativas para la correcta recogida de muestras biológicas por parte de los pacientes de Toscana Diagnostica S.r.l. El cumplimiento estricto de las instrucciones aquí indicadas es fundamental para garantizar la fiabilidad de los resultados analíticos y la validez diagnóstica de los exámenes.

Los contenedores desechables para la recogida de muestras se proporcionan de forma gratuita por Toscana Diagnostica o están disponibles en las farmacias. En caso de dudas sobre los procedimientos de preparación o recogida, se invita a los pacientes a ponerse en contacto con el Punto de Extracción o el Laboratorio de Análisis.

2. Recogida de Sangre Venosa

Para la recogida de sangre venosa, el paciente debe:

Observar un ayuno de 8-12 horas antes de la recogida;
Evitar esfuerzos físicos intensos en las 12 horas previas;
No fumar entre el momento del despertar y el momento de la recogida;
No consumir alcohol en las 12 horas previas a la recogida.

3. Glucemia Preprandial

La recogida debe realizarse 2 horas después del desayuno.

4. Glucemia Postprandial

La recogida debe realizarse 2 horas después de la comida del mediodía.

5. Curva Glucémica y Curva Glucémica en el Embarazo

El/la paciente debe:

Presentarse en la apertura del Punto de Extracción;
Haber ayunado durante al menos 8 horas y no más de 14 horas antes de la recogida.
El/la paciente NO debe modificar su dieta en los 3 días anteriores al examen y debe mantener su actividad física habitual. Después de realizar la recogida basal para la determinación de glucemia y verificada la idoneidad del examen, se administra al/a la paciente la cantidad de solución de glucosa prescrita por el médico o según el tipo de curva, que debe consumirse en 5 minutos. El/la paciente debe permanecer en la consulta durante toda la duración prescrita según el tipo de curva ordenada por el médico.

Esquema de Curvas Glucémicas:

Curva glucémica en el embarazo (código 1166): 75 g glucosa — Puntos: Basal | 60' | 120'
Curva de carga de glucosa 75 g (código 1079): 75 g glucosa — Puntos: Basal | 30' | 60' | 90' | 120' | 150'

Curva insulinémica (código 6533): 75 g glucosa — Puntos: Basal | 30' | 60' | 90' | 120'

Nota: según la solicitud del médico, los puntos de la curva insulinémica pueden modificarse.

6. Medicamentos

El/la paciente debe presentarse en el Punto de Extracción en ayunas para la recogida de sangre antes de tomar los medicamentos de la mañana.

7. Recogida para Análisis de Orina Completo

Lavar los genitales externos minuciosamente. Para el análisis de orina completo, recoger una muestra de la primera orina de la mañana, descartando el primer chorro. Utilizar contenedores desechables proporcionados de forma gratuita por Toscana Diagnostica o disponibles en las farmacias. Se recomienda a las mujeres esperar al menos tres días después del final del ciclo menstrual. Cerrar el contenedor firmemente con la tapa después de recoger orina hasta la línea MAX del contenedor (50 mL).

La muestra debe entregarse en el menor tiempo posible desde su recogida.

8. Recogida de Orina para Urocultivo

La orina debe recogerse en un contenedor estéril de boca ancha. El examen se realiza en la primera orina de la mañana siguiendo la técnica del "chorro intermedio" con el siguiente procedimiento:

Lavar las manos minuciosamente;
Lavar los genitales externos minuciosamente con agua y jabón, enjuagar;
Las mujeres deben mantener separados los grandes labios con una mano y los hombres deben mantener completamente retraído el prepucio durante la limpieza y la recogida de la muestra;
Descartar el primer chorro de orina;
Recoger la orina siguiente directamente en el contenedor;
Descartar el último chorro de orina;
Cerrar rápidamente el contenedor al final de la recogida, asegurándose de haber recogido una cantidad de orina hasta la línea MAX del contenedor (50 mL);
Entregar en el menor tiempo posible; si la entrega al Laboratorio se retrasa, la muestra de orina debe conservarse en el frigorífico un máximo de 24 horas.
Es necesario haber suspendido cualquier terapia antibiótica al menos una semana antes, a menos que el médico indique lo contrario.

9. Recogida de Orina para Urocultivo en Pacientes Pediátricos

Lavar las manos minuciosamente con agua y jabón;
Limpiar minuciosamente los genitales externos del niño;
Aplicar la bolsa de recogida estéril (disponible en las farmacias) asegurándose de que se adhiera bien a la piel;
Dejar la bolsa en su lugar durante no más de 60-90 minutos; si es necesario, reemplazarla y repetir el procedimiento;
Una vez se haya producido la micción, retirar la bolsa, cerrarla cuidadosamente, colocarla cerrada sin transferir en un contenedor de plástico estéril para urocultivo y entregar en el menor tiempo posible al Laboratorio/Punto de Extracción. Si la entrega al Laboratorio se retrasa, la muestra de orina debe conservarse en el frigorífico un máximo de 24 horas.

10. Recogida de Orina de 24 Horas (Sin Tratar)

TD-SGI-INF005_00 · Rev. 00 · Informacion Paciente Recogida Muestras ES

La recogida de orina de 24 horas debe realizarse para numerosos analitos incluyendo: Aluminio, Amilasuria, Ácido Úrico, Ácido 5-Hidroxindolacético, Ácido Homovanílico, Ácido Vanilmandelico, Adrenalina-Noradrenalina Urinaria, Alfa 1 Microglobulina, Aldosterona Urinaria, Arsénico, B2 Microglobulina, Cadmio, Calcio Urinario, Cobalto, Cromo, Cadenas Ligeras Kappa y Lambda, 17-Cetosteroides, Cistina, Citrato, Aclaramiento de Urea y Creatinina, Cloruro Urinario, Coproporfirias, Cortisol Urinario, Cotinina, Creatinina, Entrecruzamientos, Dopamina Urinaria, Electroforesis de Proteínas Urinarias, Hierro, Fosforo Urinario, Glucosuria, Hidroxiprolinuria, Inmunofijación Urinaria, Yodo Urinario, Magnesio Urinario, Mercurio, Metanefrina Urinaria, Metoxitiramina, Microalbuminuria, Níquel, Normetanefrina Urinaria, Péptido C Urinario, Plomo, Porfirias Totales, Potasio Urinario, Proteinuria, Cobre, Sodio Urinario, Uroporfirias, Urea, Serotonina.

Notas especiales para analitos específicos:

Ácido Vanilmandelico: a partir de las 48 horas previas al inicio y durante todo el período de recogida de orina es necesario observar una dieta exenta de los siguientes alimentos: aguacate, plátanos, kiwi, frutas secas, café, té, chocolate. Durante este período se recomienda, previa consulta con el médico, evitar la toma de medicamentos; en caso contrario, es conveniente comunicar los nombres de los medicamentos tomados en el momento del examen.

17-Cetosteroides: a partir de las 48 horas previas al inicio y durante todo el período de recogida de orina es necesario observar una dieta exenta de los siguientes alimentos: piña, aguacate, plátanos, kiwi, moras, ciruelas rojas, berenjenas, tomates, frutas secas, café, té, chocolate. Durante este período se recomienda, previa consulta con el médico, evitar la toma de medicamentos.

Hidroxiprolinuria 24h: a partir de las 48 horas previas al inicio y durante todo el período de recogida de orina evitar los siguientes alimentos: carne, derivados de la carne, caldo y extractos de carne, productos que contengan gelatina, pescado, dulces, huevos. Durante este período se recomienda, previa consulta con el médico, evitar la toma de medicamentos.

Coproporfirias, Porfirias Totales, Uroporfirias: mantener protegido de la luz.

Para la recogida de orina es necesario: 1 recipiente de orina 24h (disponible en farmacia) y 1 contenedor de orina (no estéril).

Procedimiento de recogida:

Comenzar la recogida vaciando completamente la vejiga, descartando la primera orina de la mañana, y anotando la hora de inicio de la recogida (por ejemplo, las 7:00);

Recoger toda la orina producida durante el día y la noche en un recipiente;

A la mañana siguiente, finalizar la recogida con la orina emitida a la misma hora del día anterior (por ejemplo, las 7:00) en el mismo contenedor;

Al final de la recogida, mezclar minuciosamente la orina de las 24h;

Verter una cantidad (mín. 50 ml) en el contenedor;

Anotar en el mismo la cantidad total recogida del recipiente de orina 24h y entregar la muestra en la estructura al Laboratorio.

N.B.: la orina debe conservarse en un lugar fresco durante todo el período de recogida.

11. Recogida de Orina de 24 Horas Acidificada

La recogida de orina de 24 horas acidificada debe realizarse para el siguiente analito: Oxalatos Urinarios 24h.

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

Para la recogida de orina es necesario: 1 recipiente de orina 24h (disponible en farmacia) y 1 contenedor de orina (no estéril) a entregar en la estructura al Laboratorio.

Procedimiento de recogida:

Comenzar la recogida vaciando completamente la vejiga, descartando la primera orina de la mañana, y anotando la hora de inicio de la recogida (por ejemplo, las 7:00);
Colocar 2 cucharadas soperas llenas de ácido muriático disponible comercialmente a una concentración del 10-12% en el fondo del contenedor de recogida de orina y añadir la orina emitida durante el día y la noche, mezclando minuciosamente después de cada adición;
A la mañana siguiente, finalizar la recogida con la orina emitida a la misma hora del día anterior (por ejemplo, las 7:00) en el mismo contenedor;
Al final de la recogida, mezclar minuciosamente la orina de las 24h;
Verter una cantidad (mín. 50 ml) en el contenedor;
Anotar en el mismo la cantidad total recogida del recipiente de orina 24h y entregar la muestra en la estructura al Laboratorio.

N.B.: la orina debe conservarse en un lugar fresco durante el período de recogida.

ATENCIÓN: USAR LA MÁXIMA CAUTELA DURANTE EL USO DE ÁCIDO MURIÁTICO YA QUE ES ALTAMENTE CORROSIVO E IRRITANTE.

12. Recogida de Heces para Coprocultivo, Búsqueda de Parásitos, Análisis Completo

Las heces deben recogerse con la cucharilla normalmente presente en los contenedores comerciales en cantidad equivalente a una nuez. En caso de entrega tardía al Laboratorio, la muestra puede conservarse en el frigorífico hasta su entrega (máximo 24 horas). Se recuerda que: Para el examen parasitológico es recomendable realizar el examen en tres muestras de heces de la mañana recogidas en días diferentes y entregadas cada día;
Para el coprocultivo es necesario haber suspendido cualquier terapia antibiótica al menos una semana antes, a menos que el médico indique lo contrario; durante la recogida se debe prestar atención a no contaminar las heces con agua del sanitario ni con orina para no comprometer el resultado microbiológico. En caso de entrega tardía al Laboratorio, la muestra puede conservarse en el frigorífico hasta su entrega en laboratorio (máximo 24 horas);
Para el análisis completo es necesario utilizar un contenedor estéril y recoger posibles partes mucosas o hemáticas y entregar en el menor tiempo posible al Laboratorio. En caso de entrega tardía al Laboratorio, la muestra puede conservarse en el frigorífico hasta su entrega en laboratorio (máximo 24 horas).

13. Prueba del Adhesivo (Scotch Test)

Realizar por la mañana sin haber realizado maniobras higiénicas. Utilizar cinta adhesiva transparente colocando la parte adhesiva de la cinta en la abertura anal y aplicando una ligera presión durante 30 segundos. Extender la cinta adhesiva sobre la superficie del portaobjetos previamente proporcionado por el Laboratorio evitando la formación de pliegues. La recogida debe realizarse el mismo día de la entrega.

Los huevos de *Enterobius Vermicularis* son pegajosos y muy infecciosos; por lo tanto, durante todas las fases de recogida se recomienda usar guantes protectores.

14. Recogida de Heces para Búsqueda de Sangre Oculta y Calprotectina Fecal

Las heces para la búsqueda de sangre oculta y calprotectina deben recogerse usando el contenedor proporcionado por el Laboratorio, siguiendo las instrucciones adjuntas. Se recuerda:

Mantener el contenedor fuera del alcance de los niños;
El líquido contenido en el contenedor no debe ingerirse y no debe entrar en contacto con los ojos o las mucosas. El tubo ha sido expresamente diseñado para evitar la fuga de líquido. Consulte inmediatamente con un médico si ha ocurrido un contacto;
Realizar la recogida inmediatamente después de la defecación;
Si se solicita, anotar en el contenedor: Fecha de Recogida (D), Código de Identificación de la Muestra (ID), Nombre del Paciente (N);
No insertar el contenedor o parte del mismo en el ano;
No recoger heces en caso de diarrea, durante la menstruación, en caso de sangrado rectal (p. ej. hemorroides u otras causas) o si están contaminadas por orina;
Utilizar el dispositivo una sola vez;
No abrir ni intentar abrir el tapón transparente;
En caso de usar un soporte para la recogida de la muestra, seguir las instrucciones indicadas en el mismo. A continuación, seguir el procedimiento de recogida de muestra a partir del paso 3.

Instrucciones de recogida:

Colocar papel higiénico dentro del sanitario;
Defecar sobre el papel higiénico. Si es posible, sentarse al revés;
Desenroscar el tapón verde provisto de varilla;
Insertar la varilla de recogida en cuatro puntos diferentes y raspar en patrón de cruz sobre la superficie. Los surcos deben estar cubiertos;
Reponer y apretar bien el tapón verde provisto de varilla. No volver a abrir;
Conservar el dispositivo de recogida en el frigorífico y a oscuras. Devolver el dispositivo de recogida lo antes posible para el análisis.

15. Recogida de Heces: Elastasa Fecal

Las heces para la búsqueda de elastasa fecal deben recogerse usando el contenedor proporcionado por el Laboratorio o disponible en las farmacias. Se recuerda:

Mantener el contenedor fuera del alcance de los niños;
Realizar la recogida inmediatamente después de la defecación;
No recoger heces en caso de diarrea, durante la menstruación, en caso de sangrado rectal (p. ej. hemorroides u otras causas) o si están contaminadas por orina;
Utilizar el dispositivo una sola vez.

Instrucciones de recogida:

Colocar papel higiénico dentro del sanitario;
Defecar sobre el papel higiénico. Si es posible, sentarse al revés;
Desenroscar el tapón azul y con la paleta proporcionada en el contenedor recoger una pequeña cantidad de heces. No llenar el contenedor;
Apretar cuidadosamente el tapón del contenedor y conservarlo en el frigorífico;
Entregar la muestra recogida en el centro de extracción antes del final del día.

16. Hisopo Vaginal y Vagino-Rectal

La paciente:

Debe abstenerse de relaciones sexuales en las 24 horas previas al examen;
Debe haber suspendido cualquier terapia antibiótica y antimicótica al menos una semana antes;
No debe haber realizado irrigaciones vaginales en las 24 horas previas al examen;
La recogida no puede realizarse durante el ciclo menstrual (excepto en casos donde la sintomatología aguda haga indispensable la recogida también en este período).

Limitadamente al hisopo vaginal, propedéutico al cultivo, es necesario que en laboratorio llegue una preparación en fresco, realizada en el momento de la recogida, acompañada del relativo módulo debidamente cumplimentado. Por el contrario, para el hisopo vagino-rectal, no se prevé la preparación en fresco.

17. Hisopo Cervical y Endocervical

La paciente:

Debe abstenerse de relaciones sexuales en las 24 horas previas al examen;
Debe haber suspendido cualquier terapia con antibióticos al menos una semana antes y no debe haber realizado irrigaciones vaginales en las 24 horas previas al examen;
La recogida no puede realizarse durante el ciclo menstrual (excepto en casos donde la sintomatología aguda haga indispensable la recogida también en este período).

18. Hisopo Uretral

Paciente femenino:

Debe abstenerse de relaciones sexuales en las 24 horas previas al examen;
Debe haber suspendido cualquier terapia antibiótica y antimicótica al menos una semana antes;
No debe haber realizado irrigaciones vaginales en las 24 horas previas al examen;
No debe tener la menstruación;
No debe haber orinado en las tres horas previas.

Paciente masculino:

Debe abstenerse de relaciones sexuales en las 24 horas previas al examen;
Debe haber suspendido cualquier terapia antibiótica y antimicótica al menos una semana antes;
No debe haber orinado en las 3 horas previas.

19. Recogida de Esputo para Examen de Cultivo

Realizar la recogida por la mañana EN AYUNAS en un contenedor estéril de boca ancha; enjuagar minuciosamente la cavidad oral con algunos gárgaras realizados con agua; realizar una espiración profunda recogiendo el esputo directamente en el contenedor estéril. Es importante que la muestra no esté constituida por saliva y es fundamental entregar en el Punto de Extracción dentro de una hora de la recogida.

20. Recogida de Esputo para Examen Citológico en Tres Muestras

Para la recogida se recomienda seguir escrupulosamente las siguientes instrucciones:

Al despertar, enjuagar la cavidad oral con agua;
Toser profundamente;
Recoger el esputo directamente en el contenedor;
Enjuagar minuciosamente la cavidad oral con algunos gárgaras realizados con agua;
Realizar una espiración profunda (no se debe recoger saliva);
Recoger el esputo directamente en el contenedor proporcionado por el laboratorio;
Repetir todo el procedimiento durante tres días consecutivos, conservando los contenedores en un lugar fresco.

ATENCIÓN: la solución presente en el contenedor para la recogida de la muestra tiene función de CONSERVANTE; por lo tanto, no debe ser descartada ni dispersada en el ambiente. Algunas sustancias componentes del conservante en estado puro resultan tóxicas o inflamables. Sin embargo, están presentes en concentraciones despreciables en la solución final, confiriendo características de NO TOXICIDAD y de NO INFLAMABILIDAD. Se recomienda: conservar los contenedores cerrados, a temperatura ambiente (15-25°C) lejos de fuentes de calor y de llama, no ingerir, evitar el contacto con la piel y los ojos y mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lavar abundantemente con agua y solución oftálmica descongestiva. En caso de ingestión, beber mucha agua, evitar eméticos, leche o carbón, consultar a un médico presentando este documento. Las tres muestras deben entregarse en el Laboratorio, acompañadas de la documentación relativa a: síntomas, intervenciones previas, exámenes histológicos, citológicos, radiológicos, ecográficos del tracto respiratorio y terapias realizadas.

21. Recogida de Material Cervicovaginal para Realización de Prueba de Papanicolaou

La paciente:

Debe abstenerse de relaciones sexuales en las 48 horas previas al examen;
No debe haber realizado terapias tópicas o irrigaciones vaginales en las 24 horas previas al examen;
La recogida puede realizarse hasta 5 días antes del ciclo menstrual y solamente 5 días después del final del mismo.

Para el examen del líquido seminal y para las muestras biológicas no expresamente mencionadas se recomienda contactar con el Laboratorio.

22. Espermatocultivo

El paciente debe abstenerse de relaciones sexuales en las 24h previas al examen; debe haber cesado cualquier terapia antibiótica al menos una semana antes; la recogida debe ser precedida por una limpieza minuciosa de los genitales externos y de las manos; la recogida del semen debe ocurrir mediante masturbación directamente en un contenedor estéril. En caso de procesamiento tardío, el material debe conservarse en el frigorífico un máximo de 24 horas.

23. Examen Citológico Urinario en Tres Muestras

Para la recogida se recomienda seguir escrupulosamente las siguientes instrucciones:

Eliminar la primera orina de la mañana;
Beber aproximadamente un litro de agua u otra bebida no alcohólica y no gasificada;
Lavarse minuciosamente los genitales;

TD-SGI-INF005_00 · Rev. 00 · Informacion Paciente Recogida Muestras ES

Después de beber, recoger en el contenedor proporcionado por el laboratorio;
Repetir todo el procedimiento durante tres días consecutivos, conservando los contenedores en un lugar fresco.

Al final de los 3 días de recogida, entregar al laboratorio las 3 muestras y la hoja de aceptación debidamente cumplimentada en cada una de sus partes. Una recopilación precisa de la información clínica es sustancial para un diagnóstico citológico correcto.

ATENCIÓN: la solución presente en el contenedor para la recogida de la muestra tiene función de CONSERVANTE; por lo tanto, no debe ser descartada ni dispersada en el ambiente. Algunas sustancias componentes del conservante en estado puro resultan tóxicas o inflamables. Se recomienda: conservar los contenedores cerrados, a temperatura ambiente (15-25°C) lejos de fuentes de calor y de llamas, no ingerir, evitar el contacto con la piel y los ojos y mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lavar abundantemente con agua y solución oftálmica descongestiva. En caso de ingestión, beber mucha agua, evitar eméticos, leche o carbón, consultar a un médico presentando este documento.

24. Esputo para Recogida de Células Neoplásicas

El esputo debe recogerse por la mañana en ayunas.

25. Prueba de Aliento (Breath Test)

25.1 ¿Qué es la Prueba de Aliento?

La Prueba de Aliento, o test del respiro, es un examen no invasivo utilizado para el diagnóstico de intolerancias alimentarias (lactosa, glucosa, sorbitol), o cuando se sospecha contaminación bacteriana (lactulosa). La prueba identifica alteraciones del sistema gastrointestinal y está dirigida a aquellos que buscan respuestas a síntomas que a menudo son difíciles de interpretar como aire atrapado en el abdomen, diarrea, digestión lenta o deficiente, hinchazón, estreñimiento, flatulencia e indigestión.

La Prueba de Aliento con Urea es una investigación realizada para diagnosticar la infección gastroduodenal por *Helicobacter Pylori*.

25.2 Tipos de Prueba de Aliento

Prueba de Aliento LACTOSA: La Prueba de H₂ del Aliento está indicada para determinar el malabsorción de lactosa. La intolerancia a la lactosa es la forma más común de malabsorción de carbohidratos que afecta a personas de todas las edades. La causa es una deficiencia de lactasa, normalmente presente en el intestino delgado. En condiciones normales, la lactosa se descompone por lactasas intestinales en glucosa y galactosa que se absorben a nivel yeyunal-ileal; en casos de deficiencia de lactasa, la lactosa llega al colon sin alterar donde es fermentada por la flora bacteriana produciendo varios gases incluyendo hidrógeno, metano y dióxido de carbono, que en parte entran en el torrente sanguíneo y se eliminan a través del aire exhalado.

Prueba de Aliento LACTULOSA: La Prueba de H₂ del Aliento con Lactulosa se utiliza para diagnosticar alteraciones en el Tiempo de Tránsito Orocecal (TTOC) y SIBO. La medición del TTOC evalúa el tiempo que los alimentos ingeridos tardan en llegar al intestino, que puede reducirse en casos de diarrea por hipermovilidad o aumentarse en casos de síntomas dispépticos con estreñimiento o vaciado gástrico lento.

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

Prueba de Aliento GLUCOSA: La Prueba de H₂ del Aliento está indicada para diagnosticar el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. El síndrome de sobrecrecimiento bacteriano es muy frecuente, ocurriendo en muchas patologías orgánicas pero también frecuentemente en el Síndrome del Intestino Irritable (SII) o en pacientes que toman medicamentos crónicamente (antiácidos, inhibidores de la bomba de protones) o que han sido sometidos a cirugía abdominal o en edad avanzada.

Prueba de Aliento FRUCTOSA: La Prueba de H₂ del Aliento está indicada para diagnosticar malabsorción de fructosa. La fructosa es un azúcar que se encuentra naturalmente y se puede encontrar en alimentos como algunas verduras, frutas y cereales. La prueba de aliento con fructosa es un método no invasivo para determinar la intolerancia a la fructosa que se manifiesta con diarrea, flatulencia y dolor abdominal.

Prueba de Aliento HELICOBACTER PYLORI: La prueba está indicada para evaluar la presencia de *Helicobacter pylori* en la mucosa gástrica. *Helicobacter Pylori* es una bacteria que encuentra su entorno ideal de crecimiento y replicación dentro del estómago humano. Este microorganismo se considera el único capaz de resistir la acidez del ambiente gástrico; esta característica es conferida por su marcada capacidad de producir ureasa, una enzima que descompone la urea en ácido carbónico y amoníaco. De esta manera, la ureasa neutraliza los ácidos gástricos creando un microambiente favorable para la replicación bacteriana.

25.3 Preparación para la Prueba de Aliento de Lactosa, Lactulosa, Glucosa, Sorbitol, Fructosa

Protocolo de preparación:

La prueba debe realizarse en ayunas;

En los 4-5 días previos a la prueba, el paciente no debe tomar antibióticos, probióticos y laxantes (20 días para antibióticos);

El médico debe asegurar que el paciente no tiene diarrea significativa;

El día anterior a la prueba, el paciente debe comer exclusivamente: DESAYUNO: una taza de té;

COMIDA: un plato de arroz hervido con poco aceite; CENA: pechuga de pollo/pavo asada/hervida o pescado hervido;

Desde las 21:00 del día anterior, el paciente DEBE observar ayuno completo (puede beber agua sin gas libremente);

Desde las 7:00 del día de la prueba, el paciente DEBE permanecer en ayunas, no cepillarse los dientes, no fumar, y no ejercitarse;

Se recomienda enjuagues de la cavidad oral con clorhexidina al 0,2% en los 30 minutos antes de la recogida basal;

Durante la prueba, no se permite fumar, beber, comer, masticar chicle o caramelos, o realizar actividad física extenuante.

25.4 Preparación para la Prueba de Aliento con Urea (*Helicobacter Pylori*)

Para garantizar la precisión adecuada de la prueba, deben seguirse las siguientes instrucciones:

Los antibióticos e inhibidores de la bomba de protones (IBP) no deben haber sido tomados en las últimas 4 semanas;

Los agentes gastroprotectores no deben tomarse en la semana previa a la prueba;

Debe observarse ayuno la mañana del día de la prueba; solo se puede consumir agua mineral sin gas 2 horas antes de la prueba;

TD-SGI-INF005_00 · Rev. 00 · Informacion Paciente Recogida Muestras ES

El día anterior a la prueba, debe seguirse la siguiente dieta: DESAYUNO: café de cebada, té, galletas secas o pan tostado; COMIDA: arroz o pasta con aceite o queso Parmesano; TARDE: café de cebada, té, galletas secas o pan tostado; CENA: carne blanca (pollo, conejo o pavo), pescado, arroz con aceite;

No cepillarse los dientes;

Si es fumador, debe abstenerse de fumar al menos desde la noche anterior.