

1. Introdução

Este documento fornece as instruções operacionais para a correta coleta de amostras biológicas pelos pacientes da Toscana Diagnostica S.r.l. A observância rigorosa das instruções aqui contidas é essencial para garantir a confiabilidade dos resultados analíticos e a validade diagnóstica dos exames.

Os recipientes descartáveis para coleta de amostras são fornecidos gratuitamente pela Toscana Diagnostica ou estão disponíveis em farmácias. Em caso de dúvidas quanto aos procedimentos de preparação ou coleta, os pacientes são convidados a entrar em contato com o Posto de Coleta ou o Laboratório de Análises.

2. Coleta de Sangue Venoso

Para a coleta de sangue venoso, o paciente deve:

Observar um jejum de 8-12 horas antes da coleta;
Evitar atividades físicas intensas nas 12 horas anteriores;
Não fumar entre o despertar e o momento da coleta;
Não consumir álcool nas 12 horas antes da coleta.

3. Glicemia em Jejum

A coleta deve ser realizada 2 horas após o café da manhã.

4. Glicemia Pós-Prandial

A coleta deve ser realizada 2 horas após a refeição do meio-dia.

5. Curva Glicêmica e Curva Glicêmica na Gravidez

O paciente deve:

Chegar ao Posto de Coleta no horário de abertura;
Estar em jejum por pelo menos 8 horas e no máximo 14 horas antes da coleta.
O paciente NÃO deve modificar sua dieta nos 3 dias anteriores ao exame e deve manter sua atividade física habitual. Após realizar a coleta basal para a determinação da glicemia e verificar a aptidão para o exame, o paciente receberá a quantidade de solução de glicose prescrita pelo médico ou de acordo com o tipo de curva, que deve ser consumida dentro de 5 minutos. O paciente deve permanecer na unidade durante toda a duração prescrita pelo tipo de curva solicitado pelo médico assistente.

Esquema de Curvas Glicêmicas:

Curva glicêmica na gravidez (código 1166): 75 g de glicose — Pontos: Basal | 60' | 120'
Curva de sobrecarga de glicose 75 g (código 1079): 75 g de glicose — Pontos: Basal | 30' | 60' | 90' | 120' | 150'
Curva insulinêmica (código 6533): 75 g de glicose — Pontos: Basal | 30' | 60' | 90' | 120'
Nota: os pontos da curva insulinêmica podem ser modificados conforme solicitado pelo médico.

6. Medicamentos

O paciente deve comparecer ao Posto de Coleta em jejum para a coleta de sangue antes da ingestão dos medicamentos matutinos.

7. Coleta de Urina Completa

Lave os genitais externos cuidadosamente. Para o exame de urina completa, colete uma amostra das primeiras urinas da manhã, descartando o primeiro jato. Use recipientes descartáveis fornecidos gratuitamente pela Toscana Diagnostica ou disponíveis em farmácias. Recomenda-se às mulheres que aguardem pelo menos três dias após o término da menstruação. Feche o recipiente com firmeza com a tampa após coletar urina até a linha MAX do recipiente (50 mL).

A amostra deve ser entregue o mais breve possível após a coleta.

8. Coleta de Urina para Urocultura

A urina deve ser coletada em um recipiente estéril com abertura ampla. O exame é realizado na primeira urina da manhã seguindo a técnica do "jato intermediário" com o seguinte procedimento:

Lave as mãos cuidadosamente;
Lave os genitais externos cuidadosamente com água e sabão, enxágue;
As mulheres devem manter os grandes lábios afastados com uma mão e os homens devem manter a pele do pênis completamente retraída durante a limpeza e coleta da amostra;
Descarte o primeiro jato de urina;
Colete a urina seguinte diretamente no recipiente;
Descarte o último jato de urina;
Feche o recipiente rapidamente ao final da coleta, garantindo uma quantidade de urina até a linha MAX do recipiente (50 mL);
Entregue o mais breve possível; se a entrega ao Laboratório for atrasada, a amostra de urina deve ser armazenada em refrigerador por no máximo 24 horas.
Qualquer terapia antibiótica deve ter sido descontinuada por pelo menos uma semana, salvo indicação contrária do médico assistente.

9. Coleta de Urina para Urocultura em Pacientes Pediátricos

Lave as mãos cuidadosamente com água e sabão;
Limpe cuidadosamente os genitais externos da criança;
Aplique o saco estéril para coleta (disponível em farmácias) garantindo que adira bem à pele;
Deixe o saco no local por no máximo 60-90 minutos; se necessário, substitua-o e repita o procedimento;
Assim que ocorrer a micção, remova o saco, lacre-o cuidadosamente, coloque-o lacrado — sem transferir — em um recipiente de plástico estéril para urocultura e entregue o mais breve possível ao Laboratório/Posto de Coleta. Se a entrega ao Laboratório for atrasada, a amostra de urina deve ser armazenada em refrigerador por no máximo 24 horas.

10. Coleta de Urina de 24 Horas (Não Tratada)

A coleta de urina de 24 horas deve ser realizada para diversos analitos, incluindo: Alumínio, Amilasúria, Ácido Úrico, Ácido 5-hidroxiindolacético, Ácido homovanílico, Ácido vanilmandélico, Adrenalina-Noradrenalina urinária, Alfa 1 Microglobulina, Aldosterona Urinária, Arsênico, B2

TD-SGI-INF006_00 · Rev. 00 · Informacao Paciente Coleta Amostras PT

Microglobulina, Cádmio, Cálcio Urinário, Cobalto, Cromo, Cadeias Leves Kappa e Lambda, 17-Cetosteroides, Cistina, Citrato, Depuração de Ureia e Creatinina, Cloreto Urinário, Coproporfirinas, Cortisol Urinário, Cotinina, Creatinina, Ligações Cruzadas, Dopamina Urinária, Eletroforese de Proteínas Urinárias, Ferro, Fósforo Urinário, Glicosúria, Hidroxiprolinúria, Imunofixação Urinária, Iodo Urinário, Magnésio Urinário, Mercúrio, Metanefrinas Urinárias, Metoxitiramina, Microalbuminúria, Níquel, Normetanefrinas Urinárias, Peptídeo C Urinário, Chumbo, Porfirina Total, Potássio Urinário, Proteinúria, Cobre, Sódio Urinário, Uroporfirina, Ureia, Serotonina.

Notas especiais para analitos específicos:

Ácido Vanilmandélico: a partir de 48 horas antes do início e durante todo o período de coleta de urina, deve-se observar uma dieta livre dos seguintes alimentos: abacate, banana, kiwi, frutas secas, café, chá, chocolate. Durante este período é aconselhável, após consultar o médico, evitar a ingestão de medicamentos; caso contrário, comunique os nomes dos medicamentos ingeridos no momento do exame.

17-Cetosteroides: a partir de 48 horas antes do início e durante todo o período de coleta de urina, deve-se observar uma dieta livre dos seguintes alimentos: abacaxi, abacate, banana, kiwi, amora, ameixa vermelha, beringela, tomate, frutas secas, café, chá, chocolate. Durante este período é aconselhável, após consultar o médico, evitar a ingestão de medicamentos.

Hidroxiprolinúria 24h: a partir de 48 horas antes do início e durante todo o período de coleta de urina, evite os seguintes alimentos: carne, derivados de carne, caldo e extratos de carne, produtos contendo gelatina, peixe, doces, ovos. Durante este período é aconselhável, após consultar o médico, evitar a ingestão de medicamentos.

Coproporfirinas, Porfirinas Totais, Uroporfirina: manter protegido da luz.

Materiais necessários: 1 recipiente de urina 24h (disponível em farmácias) e 1 copo de amostra de urina (não estéril).

Procedimento de coleta:

Comece a coleta esvaziando completamente a bexiga, descartando a primeira urina da manhã, e anotando a hora de início da coleta (por exemplo, 7:00 am);

Colete toda a urina passada durante o dia e a noite no recipiente;

Na manhã seguinte, termine a coleta com a urina excretada na mesma hora do dia anterior (por exemplo, 7:00 am) no mesmo recipiente;

Ao final da coleta, misture cuidadosamente a urina das 24h;

Despeje uma quantidade (mín. 50 ml) no copo de amostra;

Anote no copo a quantidade total coletada no recipiente de urina 24h e entregue a amostra ao Laboratório.

N.B.: a urina deve ser mantida em local fresco durante todo o período de coleta.

11. Coleta de Urina de 24 Horas (Acidificada)

A coleta de urina de 24 horas acidificada deve ser realizada para o seguinte analito: Oxalatos de Urina 24h.

Materiais necessários: 1 recipiente de urina 24h (disponível em farmácias) e 1 copo de amostra de urina (não estéril) a ser entregue ao Laboratório.

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

Procedimento de coleta:

Comece a coleta esvaziando completamente a bexiga, descartando a primeira urina da manhã, e anotando a hora de início da coleta (por exemplo, 7:00 am);
Coloque 2 colheres de sopa cheias de ácido clorídrico disponível comercialmente na concentração de 10-12% no fundo do recipiente de coleta de urina e adicione a urina excretada durante o dia e a noite, misturando cuidadosamente após cada adição;
Na manhã seguinte, termine a coleta com a urina excretada na mesma hora do dia anterior (por exemplo, 7:00 am) no mesmo recipiente;
Ao final da coleta, misture cuidadosamente a urina das 24h;
Despeje uma quantidade (mín. 50 ml) no copo de amostra;
Anote no copo a quantidade total coletada e entregue a amostra ao Laboratório.

N.B.: a urina deve ser mantida em local fresco durante o período de coleta.

AVISO: USE PRECAUÇÃO EXTREMA AO MANUSEAR ÁCIDO CLORÍDRICO POIS É ALTAMENTE CORROSIVO E IRRITANTE.

12. Coleta de Fezes para Coprocultura, Pesquisa de Parasitas e Exame Completo

As fezes devem ser coletadas com a pequena colher normalmente fornecida em recipientes comercialmente disponíveis, em uma quantidade do tamanho de uma noz. Se a entrega ao Laboratório for atrasada, a amostra pode ser armazenada em refrigerador até a entrega (máximo 24 horas). Observe o seguinte:

Para exame parasitológico: é aconselhável realizar o exame em três amostras de fezes da manhã coletadas em dias diferentes e entregues diariamente;

Para coprocultura: qualquer terapia antibiótica deve ter sido descontinuada por pelo menos uma semana, salvo indicação contrária do médico assistente; durante a coleta, tenha cuidado para não contaminar as fezes com água do sanitário ou urina para não comprometer o resultado microbiológico. Se a entrega ao Laboratório for atrasada, a amostra pode ser armazenada em refrigerador até a entrega (máximo 24 horas);

Para exame completo: deve-se usar um recipiente estéril, coletando qualquer porção mucosa ou hemática, e entregando o mais breve possível ao Laboratório. Se a entrega ao Laboratório for atrasada, a amostra pode ser armazenada em refrigerador até a entrega (máximo 24 horas).

13. Teste da Fita Adesiva

Realize pela manhã sem ter realizado procedimentos de higiene. Use fita adesiva transparente, colocando o lado adesivo contra a abertura anal e aplicando uma leve pressão por 30 segundos. Estenda a fita na superfície da lâmina de vidro previamente fornecida pelo Laboratório, evitando dobras. A coleta deve ser realizada no mesmo dia da entrega.

Os ovos de *Enterobius Vermicularis* são pegajosos e altamente infecciosos; portanto, recomenda-se o uso de luvas de proteção durante todas as fases da coleta.

14. Coleta de Fezes para Sangue Oculto e Calprotectina Fecal

As fezes para teste de sangue oculto e calprotectina devem ser coletadas usando o recipiente fornecido pelo Laboratório, seguindo as instruções anexadas. Observe o seguinte:

TD-SGI-INF006_00 · Rev. 00 · Informacao Paciente Coleta Amostras PT

Mantenha o recipiente fora do alcance das crianças;
O líquido dentro do recipiente não deve ser ingerido e não deve entrar em contato com olhos ou membranas mucosas. O tubo foi especificamente projetado para evitar vazamento de líquido.
Procure imediatamente um médico se ocorrer contato;
Colete a amostra imediatamente após a defecação;
Se solicitado, anote no recipiente: Data da Coleta (D), Código de Identificação da Amostra (ID), Nome do Paciente (N);
Não insira o recipiente ou qualquer parte dele no ânus;
Não colete fezes em caso de diarreia, durante a menstruação, em caso de sangramento retal (por exemplo, hemorroidas ou outras causas) ou se contaminadas por urina;
Use o dispositivo apenas uma vez;
Não abra ou tente abrir a tampa transparente;
Se estiver usando um suporte para coleta de amostra, siga as instruções no suporte. Em seguida, siga o procedimento de coleta de amostra a partir da etapa 3.

Instruções de coleta:

Coloque papel higiênico dentro do vaso sanitário;
Defeque sobre o papel higiênico. Se possível, sente-se de costas;
Desparafuse a tampa verde equipada com a vara de coleta;
Insira a vara de coleta em quatro pontos diferentes e raspe em padrão de cruz na superfície. Os sulcos devem ser cobertos;
Recoloque e aperte bem a tampa verde com a vara de coleta. Não reabra;
Armazene o dispositivo de coleta em refrigerador e no escuro. Devolva o dispositivo assim que possível para análise.

15. Coleta de Fezes: Elastase Fecal

As fezes para teste de elastase fecal devem ser coletadas usando o recipiente fornecido pelo Laboratório ou disponível em farmácias. Observe o seguinte:

Mantenha o recipiente fora do alcance das crianças;
Colete a amostra imediatamente após a defecação;
Não colete fezes em caso de diarreia, durante a menstruação, em caso de sangramento retal (por exemplo, hemorroidas ou outras causas) ou se contaminadas por urina;
Use o dispositivo apenas uma vez.

Instruções de coleta:

Coloque papel higiênico dentro do vaso sanitário;
Defeque sobre o papel higiênico. Se possível, sente-se de costas;
Desparafuse a tampa azul e use a espátula fornecida no recipiente para coletar uma pequena quantidade de fezes. Não preencha o recipiente;
Aparafuse cuidadosamente a tampa do recipiente e armazene em refrigerador;
Entregue a amostra coletada ao Posto de Coleta no mesmo dia.

16. Swab Vaginal e Vagino-Retal

A paciente (mulher):

Deve abster-se de relações sexuais por 24 horas antes do exame;

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

TD-SGI-INF006_00 · Rev. 00 · Informacao Paciente Coleta Amostras PT

Deve ter descontinuado qualquer terapia antibiótica e antifúngica por pelo menos uma semana;
Não deve ter realizado irrigação vaginal nas 24 horas antes do exame;
O teste não pode ser realizado durante a menstruação (exceto onde sintomas agudos tornem o teste indispensável durante este período).

Para o swab vaginal especificamente, destinado à cultura, uma preparação fresca úmida deve chegar ao laboratório, realizada no momento da coleta, acompanhada do formulário apropriadamente preenchido. Para o swab vagino-retal, nenhuma preparação fresca é necessária.

17. Swab Cervical e Endocervical

A paciente (mulher):

Deve abster-se de relações sexuais por 24 horas antes do exame;
Deve ter descontinuado toda terapia antibiótica por pelo menos uma semana e não deve ter realizado irrigação vaginal nas 24 horas antes do exame;
O teste não pode ser realizado durante a menstruação (exceto onde sintomas agudos tornem o teste indispensável durante este período).

18. Swab Uretral

Paciente do sexo feminino:

Deve abster-se de relações sexuais por 24 horas antes do exame;
Deve ter descontinuado qualquer terapia antibiótica e antifúngica por pelo menos uma semana;
Não deve ter realizado irrigação vaginal nas 24 horas antes do exame;
Não deve estar menstruada;
Não deve ter urinado nas três horas anteriores.

Paciente do sexo masculino:

Deve abster-se de relações sexuais por 24 horas antes do exame;
Deve ter descontinuado qualquer terapia antibiótica e antifúngica por pelo menos uma semana;
Não deve ter urinado nas 3 horas anteriores.

19. Coleta de Escarro para Exame Colturado

Colete pela manhã com O ESTÔMAGO VAZIO em um recipiente estéril com abertura ampla; enxágue cuidadosamente a cavidade oral com alguns gargarismos realizados com água; execute uma expiração profunda coletando o escarro diretamente no recipiente estéril. É importante que a amostra não consista em saliva e é essencial entregá-la ao Posto de Coleta dentro de uma hora da coleta.

20. Coleta de Escarro para Exame Citológico de Três Amostras

As seguintes instruções devem ser seguidas meticulosamente:

Ao acordar, enxágue a cavidade oral com água;
Tussa profundamente;
Colete o escarro diretamente no recipiente;
Enxágue cuidadosamente a cavidade oral com alguns gargarismos realizados com água;

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

TD-SGI-INF006_00 · Rev. 00 · Informacao Paciente Coleta Amostras PT

Execute uma expiração profunda (a saliva não deve ser coletada);
Colete o escarro diretamente no recipiente fornecido pelo laboratório;
Repita todo o procedimento por três dias consecutivos, armazenando os recipientes em local fresco.

AVISO: a solução dentro do recipiente serve como CONSERVANTE; portanto, não deve ser descartada ou dispersa no ambiente. Alguns componentes do conservante em forma pura são tóxicos ou inflamáveis. No entanto, estão presentes em concentrações negligenciáveis na solução final, conferindo características de NÃO-TOXICIDADE e NÃO-INFLAMABILIDADE. Recomenda-se, no entanto: manter os recipientes fechados, em temperatura ambiente (15-25°C) longe de fontes de calor e chamas, não ingerir, evitar contato com pele e olhos e manter fora do alcance das crianças. Em caso de contato com os olhos, lave abundantemente com água e solução oftalmológica descongestionante. Em caso de ingestão, beba bastante água, evite emética, leite ou carvão, consulte um médico apresentando este documento. As três amostras devem ser entregues ao Laboratório, acompanhadas de documentação sobre: sintomas, intervenções anteriores, exames histológicos, citológicos, radiológicos, ultrassonográficos do trato respiratório e terapias realizadas.

21. Coleta de Material Cervico-Vaginal para Realização de Teste de Papanicolau

A paciente (mulher):

Deve abster-se de relações sexuais por 48 horas antes do exame;
Não deve ter realizado terapias tópicas ou irrigação vaginal nas 24 horas antes do exame;
O teste pode ser realizado até 5 dias antes do período menstrual e apenas 5 dias após seu término.

Para análise de sêmen e para amostras biológicas não expressamente mencionadas, favor contactar o Laboratório.

22. Espermocultura

O paciente deve abster-se de relações sexuais por 24 horas antes do exame; deve ter descontinuado qualquer terapia antibiótica por pelo menos uma semana; a coleta deve ser precedida por limpeza cuidadosa dos genitais externos e das mãos; a coleta de sêmen deve ocorrer através de masturbação diretamente em um recipiente estéril. Em caso de processamento atrasado, o material deve ser armazenado em refrigerador por no máximo 24 horas.

23. Exame Citológico Urinário de Três Amostras

As seguintes instruções devem ser seguidas meticulosamente:

Descarte a primeira urina da manhã;
Beba aproximadamente um litro de água ou outra bebida não alcoólica e não gasosa;
Lave os genitais cuidadosamente;
Após beber, colete no recipiente fornecido pelo laboratório;
Repita todo o procedimento por três dias consecutivos, armazenando os recipientes em local fresco. Ao final da coleta de 3 dias, entregue as 3 amostras e o formulário de admissão adequadamente preenchido em cada seção ao laboratório. A coleta precisa de informações clínicas é essencial para diagnóstico citológico correto.

AVISO: a solução dentro do recipiente serve como CONSERVANTE; portanto, não deve ser descartada ou dispersa no ambiente. Alguns componentes do conservante em forma pura são tóxicos ou inflamáveis. Recomenda-se, no entanto: manter os recipientes fechados, em temperatura

TD-SGI-INF006_00 · Rev. 00 · Informacao Paciente Coleta Amostras PT

ambiente (15-25°C) longe de fontes de calor e chamas, não ingerir, evitar contato com pele e olhos e manter fora do alcance das crianças. Em caso de contato com os olhos, lave abundantemente com água e solução oftalmológica descongestionante. Em caso de ingestão, beba bastante água, evite emética, leite ou carvão, consulte um médico apresentando este documento.

24. Escarro para Coleta de Células Neoplásicas

O escarro deve ser coletado pela manhã em jejum.

25. Teste do Hálito

25.1 O que é o Teste do Hálito

O Teste do Hálito, ou teste da respiração, é um exame não invasivo usado para o diagnóstico de intolerâncias alimentares (lactose, glicose, sorbitol), ou quando há suspeita de contaminação bacteriana (lactulose). O teste identifica alterações do sistema gastrointestinal e é destinado àqueles que buscam respostas para sintomas que muitas vezes são difíceis de interpretar, como ar preso na barriga, diarreia, digestão lenta ou pobre, inchaço, constipação, flatulência e indigestão.

O Teste do Hálito com Ureia é uma investigação realizada para diagnosticar infecção gastroduodenal por *Helicobacter Pylori*.

25.2 Tipos de Teste do Hálito

Teste do Hálito LACTOSE: O H2 Teste do Hálito é indicado para determinar a má absorção de lactose. A intolerância à lactose é a forma mais comum de má absorção de carboidratos, afetando pessoas de todas as idades. A causa é uma deficiência de lactase, normalmente presente no intestino delgado. Em condições normais, a lactose é quebrada pelas lactases intestinais em glicose e galactose que são absorvidas no nível jejuno-ileal; em casos de deficiência de lactase, a lactose atinge o cólon inalterada, onde é fermentada pela flora bacteriana, produzindo vários gases, incluindo hidrogênio, metano e dióxido de carbono, que em parte entram na corrente sanguínea e são eliminados através do ar exalado.

Teste do Hálito LACTULOSE: O H2 Teste do Hálito com Lactulose é usado para diagnosticar alterações no Tempo de Trânsito Orocecal (TTOC) e SIBO. A medição do TTOC avalia o tempo que o alimento ingerido leva para chegar ao intestino, que pode ser reduzido em casos de diarreia por hipermotilidade ou aumentado em casos de sintomas dispépticos com constipação ou esvaziamento gástrico lento.

Teste do Hálito GLICOSE: O H2 Teste do Hálito é indicado para diagnosticar superproliferação bacteriana no intestino delgado. A síndrome de superproliferação bacteriana é muito comum, ocorrendo em muitas patologias orgânicas, mas também frequentemente na Síndrome do Intestino Irritável (IBS) ou em pacientes que tomam medicamentos cronicamente (antiácidos, inibidores de bomba de prótons) ou que sofreram cirurgia abdominal ou em idade avançada.

Teste do Hálito FRUTOSE: O H2 Teste do Hálito é indicado para diagnosticar má absorção de frutose. Frutose é um açúcar naturalmente presente encontrado em certos vegetais, frutas e cereais. O teste do hálito com frutose é um método não invasivo para determinar a intolerância à frutose, que se manifesta com diarreia, flatulência e dor abdominal.

TD-SGI-INF006_00 · Rev. 00 · Informacao Paciente Coleta Amostras PT

Teste do Hálito HELICOBACTER PYLORI: O teste é indicado para avaliar a presença de *Helicobacter pylori* na mucosa gástrica. *Helicobacter Pylori* é uma bactéria que encontra seu ambiente ideal de crescimento e replicação dentro do estômago humano. Este microrganismo é considerado o único capaz de resistir à acidez do ambiente gástrico; esta característica é conferida por sua notável capacidade de produzir urease, uma enzima que quebra a ureia em ácido carbônico e amônia. Desta forma, a urease neutraliza os ácidos gástricos, criando um microambiente favorável à replicação bacteriana.

25.3 Preparação para Teste do Hálito com Lactose, Lactulose, Glicose, Sorbitol e Frutose

Protocolo de preparação:

O teste deve ser realizado em jejum;

Nos 4-5 dias anteriores ao teste, o paciente não deve ingerir antibióticos, probióticos e laxantes (20 dias para antibióticos);

O médico deve garantir que o paciente não tenha diarreia significativa em andamento;

No dia anterior ao teste, o paciente deve comer exclusivamente: CAFÉ DA MANHÃ: uma xícara de chá; ALMOÇO: um prato de arroz cozido com um pouco de óleo; JANTAR: peito de frango/peru grelhado/cozido ou peixe cozido;

A partir das 21:00 do dia anterior, o paciente DEVE observar jejum completo (pode beber água sem gás livremente);

A partir das 7:00 da manhã do dia do teste, o paciente DEVE permanecer em jejum, não escovar os dentes, não fumar e não fazer exercício;

Recomenda-se enxaguar a cavidade oral com clorexidina a 0,2% nos 30 minutos anteriores à coleta basal;

Durante o teste, não é permitido fumar, beber, comer, mascar chiclete ou doces, ou realizar atividade física extenuante.

25.4 Preparação para Teste do Hálito com Ureia (*Helicobacter Pylori*)

Para garantir a precisão adequada do teste, as seguintes instruções devem ser observadas:

Antibióticos e inibidores de bomba de prótons (IBP) não devem ter sido ingeridos nas últimas 4 semanas;

Agentes gastroprotetores não devem ser ingeridos na semana anterior ao teste;

O jejum deve ser observado na manhã do teste; apenas água mineral sem gás pode ser consumida 2 horas antes do teste;

No dia anterior ao teste, a seguinte dieta deve ser seguida: CAFÉ DA MANHÃ: café de cevada, chá, biscoitos secos ou pão torrado; ALMOÇO: arroz ou macarrão condimentado com óleo ou parmesão; TARDE: café de cevada, chá, biscoitos secos ou pão torrado; JANTAR: carne branca (frango, coelho ou peru), peixe, arroz condimentado com óleo;

Não escove os dentes;

Se for fumante, deve abster-se de fumar pelo menos desde a noite anterior.