

## 1. Введение

Данный документ содержит операционные инструкции для правильного сбора биологических образцов пациентами Toscana Diagnostica S.r.l. Строгое соблюдение указанных инструкций является существенным для обеспечения надежности аналитических результатов и диагностической валидности исследований.

Одноразовые контейнеры для сбора образцов предоставляются бесплатно компанией Toscana Diagnostica или доступны в аптеках. В случае сомнений относительно процедур подготовки или сбора пациентов приглашают связаться с Пункт забора или Лабораторией анализов.

## 2. Забор венозной крови

Для забора венозной крови пациент должен:

Соблюдать голодание в течение 8-12 часов перед забором;  
Избегать интенсивных физических нагрузок в течение 12 часов до процедуры;  
Не курить между пробуждением и временем проведения забора;  
Не употреблять алкоголь в течение 12 часов до забора.

## 3. Глюкоза крови натощак

Забор крови должен быть выполнен через 2 часа после завтрака.

## 4. Глюкоза крови после приема пищи

Забор крови должен быть выполнен через 2 часа после полдника.

## 5. Толерантная кривая глюкозы и толерантная кривая глюкозы при беременности

Пациент должен:

Явиться в Пункт забора при его открытии;  
Соблюдать голодание не менее 8 часов и не более 14 часов перед забором.  
Пациент НЕ должен изменять свою диету в течение 3 дней, предшествующих исследованию, и должен поддерживать обычную физическую активность. После выполнения базального забора крови для определения гликемии и проверки пригодности к исследованию пациенту вводят предписанное врачом количество раствора глюкозы или в соответствии с типом кривой, который должен быть потреблен в течение 5 минут. Пациент должен оставаться на месте в течение всего времени, предписанного типом кривой, назначенной лечащим врачом.

### Схема толерантных кривых глюкозы:

Толерантная кривая глюкозы при беременности (код 1166): 75 г глюкозы — Точки: Базовая | 60' | 120'

Толерантная кривая при нагрузке глюкозой 75 г (код 1079): 75 г глюкозы — Точки: Базовая | 30' | 60' | 90' | 120' | 150'

Инсулинемическая кривая (код 6533): 75 г глюкозы — Точки: Базовая | 30' | 60' | 90' | 120'

Примечание: точки инсулинемической кривой могут быть изменены по запросу врача.

## **6. Лекарственные препараты**

Пациент должен явиться в Пункт забора натошак для забора крови перед приемом утренних лекарств.

## **7. Сбор образца для полного анализа мочи**

Тщательно вымойте наружные половые органы. Для полного анализа мочи соберите образец первой утренней мочи, отбросив начальную порцию. Используйте одноразовые контейнеры, предоставляемые бесплатно компанией Toscana Diagnostica или доступные в аптеках. Женщинам рекомендуется подождать как минимум три дня после окончания менструации. Плотнo закройте контейнер крышкой после сбора мочи до отметки MAX на контейнере (50 мл).

Образец должен быть доставлен как можно скорее после сбора.

## **8. Сбор мочи для посева (бактериологического исследования)**

Моча должна быть собрана в стерильный контейнер с широким отверстием. Исследование проводится на первой утренней моче с использованием техники "средней порции" со следующей процедурой:

Тщательно вымойте руки;

Тщательно вымойте наружные половые органы с мылом и водой, ополосните;

Женщины должны держать половые губы раздвинутыми одной рукой, а мужчины должны полностью оттягивать крайнюю плоть во время очистки и сбора образца;

Отбросьте начальную порцию мочи;

Соберите следующую порцию мочи непосредственно в контейнер;

Отбросьте последнюю порцию мочи;

Быстро закройте контейнер по завершении сбора, обеспечивая количество мочи до отметки MAX контейнера (50 мл);

Доставьте как можно скорее; если доставка в Лабораторию отсрочена, образец мочи должен храниться в холодильнике максимум 24 часа.

Любая антибиотикотерапия должна быть прекращена как минимум за неделю до исследования, если иное не указано лечащим врачом.

## **9. Сбор мочи для посева у педиатрических пациентов**

Тщательно вымойте руки с мылом и водой;

Тщательно очистите наружные половые органы ребенка;

Применяйте стерильный сборный пакет (доступен в аптеках), обеспечивая хорошее прилегание к коже;

Держите пакет на месте не более 60-90 минут; при необходимости замените его и повторите процедуру;

После мочеиспускания снимите пакет, плотно его закройте, поместите закрытым — без переливания — в стерильный пластиковый контейнер для посева мочи и доставьте как можно скорее в Лабораторию/Пункт забора. Если доставка в Лабораторию отсрочена, образец мочи должен храниться в холодильнике максимум 24 часа.

## **10. Сбор мочи за 24 часа (необработанная)**

Сбор мочи за 24 часа должен быть выполнен для многих аналитов, включая: Алюминий, Амилазурия, Мочевая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота, Гомованилиновая кислота, Ванилимандельная кислота, Уринарные катехоламины, Альфа-1 микроглобулин, Уринарный альдостерон, Мышьяк, В2 микроглобулин, Кадмий, Уринарный кальций, Кобальт, Хром, Каппа и лямбда легкие цепи, 17-кетостероиды, Цистин, Цитрат, Клиренс мочевины и креатинина, Уринарный хлорид, Копропорфирины, Уринарный кортизол, Котинин, Креатинин, Кросс-линки, Уринарный дофамин, Электрофорез уринарных белков, Железо, Уринарный фосфор, Глюкозурия, Гидроксипролинурия, Уринарная иммунофиксация, Уринарный йод, Уринарный магний, Ртуть, Уринарные метанефрины, Метокситирамин, Микроальбуминурия, Никель, Уринарные норметанефрины, Уринарный С-пептид, Свинец, Общие порфирины, Уринарный калий, Протеинурия, Медь, Уринарный натрий, Уропорфирины, Мочевина, Серотонин.

### **Специальные примечания для конкретных аналитов:**

Ванилимандельная кислота: начиная с 48 часов перед началом и на протяжении всего периода сбора мочи необходимо соблюдать диету без следующих продуктов: авокадо, бананы, киви, сухофрукты, кофе, чай, шоколад. В течение этого периода рекомендуется, после консультации с врачом, избежать приема лекарств; в противном случае целесообразно сообщить названия принимаемых лекарств во время исследования.

17-кетостероиды: начиная с 48 часов перед началом и на протяжении всего периода сбора мочи необходимо соблюдать диету без следующих продуктов: ананас, авокадо, бананы, киви, черника, красные сливы, баклажаны, помидоры, сухофрукты, кофе, чай, шоколад. В течение этого периода рекомендуется, после консультации с врачом, избежать приема лекарств.

Гидроксипролинурия за 24 часа: начиная с 48 часов перед началом и на протяжении всего периода сбора мочи избегайте следующих продуктов: мясо, мясные производные, мясной бульон и мясные экстракты, продукты, содержащие желатин, рыба, сладости, яйца. В течение этого периода рекомендуется, после консультации с врачом, избежать приема лекарств.

Копропорфирины, общие порфирины, уропорфирины: держите защищенными от света.

Необходимые материалы: 1 контейнер для сбора мочи за 24 часа (доступен в аптеках) и 1 чашка образца мочи (нестерильная).

### **Процедура сбора:**

Начните сбор, полностью опорожнив мочевой пузырь, отбросив первую утреннюю мочу и отметив время начала (например, 7:00 утра);

Соберите всю мочу, выделенную в течение дня и ночи, в контейнер;

На следующее утро завершите сбор мочой, выделенной в то же время, что и в предыдущий день (например, 7:00 утра) в том же контейнере;

По завершении сбора тщательно перемешайте мочу за 24 часа;

Перелейте количество (мин. 50 мл) в чашку образца;

Отметьте на чашке общее количество собранной мочи и доставьте образец в Лабораторию.

Примечание: моча должна храниться в прохладном месте в течение всего периода сбора.

## **11. Сбор мочи за 24 часа (подкисленная)**

TD-SGI-INF007\_00 · Rev. 00 · Informacija Pacienta Sbor Obrazcov RU

Сбор подкисленной мочи за 24 часа должен быть выполнен для следующего анализа: оксалаты мочи за 24 часа.

Необходимые материалы: 1 контейнер для сбора мочи за 24 часа (доступен в аптеках) и 1 чашка образца мочи (нестерильная) для доставки в Лабораторию.

### **Процедура сбора:**

Начните сбор, полностью опорожнив мочевого пузырь, отбросив первую утреннюю мочу и отметив время начала (например, 7:00 утра);

На дно контейнера для сбора мочи поместите 2 столовые ложки коммерчески доступной соляной кислоты концентрацией 10-12% и добавьте мочу, выделенную в течение дня и ночи, тщательно перемешивая после каждого добавления;

На следующее утро завершите сбор мочой, выделенной в то же время, что и в предыдущий день (например, 7:00 утра) в том же контейнере;

По завершении сбора тщательно перемешайте мочу за 24 часа;

Перелейте количество (мин. 50 мл) в чашку образца;

Отметьте на чашке общее количество собранной мочи и доставьте образец в Лабораторию.

Примечание: моча должна храниться в прохладном месте в течение периода сбора.

**ВНИМАНИЕ: СОБЛЮДАЙТЕ МАКСИМАЛЬНУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ, ТАК КАК ОНА СИЛЬНО КОРРОЗИВНА И РАЗДРАЖАЮЩА.**

## **12. Сбор фекалий для посева, исследования паразитов, полного исследования**

Фекалии должны быть собраны маленькой ложечкой, обычно присутствующей в коммерчески доступных контейнерах, в количестве примерно с грецкий орех. Если доставка в Лабораторию отсрочена, образец может быть сохранен в холодильнике до доставки (максимум 24 часа). Пожалуйста, обратите внимание:

Для паразитологического исследования: рекомендуется проводить исследование на трех образцах фекалий с утра, собранных в разные дни и доставленных каждый день;

Для посева фекалий: любая антибиотикотерапия должна быть прекращена как минимум за неделю до исследования, если иное не указано лечащим врачом; во время сбора следует проявлять осторожность, чтобы не загрязнить фекалии водой из унитаза или мочой, чтобы не компрометировать микробиологический результат. Если доставка в Лабораторию отсрочена, образец может быть сохранен в холодильнике до доставки (максимум 24 часа);

Для полного исследования: должен быть использован стерильный контейнер, собирая любые слизистые или геморрагические порции и доставляя как можно скорее в Лабораторию. Если доставка в Лабораторию отсрочена, образец может быть сохранен в холодильнике до доставки (максимум 24 часа).

## **13. Тест со скотчем**

Проводите утром без выполнения процедур гигиены. Используйте прозрачную клейкую ленту, прижимая клейкую сторону к анальному отверстию и применяя легкое давление в течение 30 секунд. Разверните ленту на поверхности предметного стекла, предварительно предоставленного Лабораторией, избегая складок. Сбор должен быть выполнен в тот же день доставки.

Яйца *Enterobius Vermicularis* являются липким и высокоинфекционным, поэтому рекомендуется носить защитные перчатки на всех этапах сбора.

#### **14. Сбор фекалий для исследования скрытой крови в фекалиях и фекального кальпротектина**

Фекалии для исследования скрытой крови и кальпротектина должны быть собраны с использованием контейнера, предоставленного Лабораторией, следуя приложенным инструкциям. Пожалуйста, обратите внимание:

Держите контейнер в недоступном для детей месте;

Жидкость в контейнере не должна быть проглочена и не должна контактировать с глазами или слизистыми оболочками. Трубка специально разработана для предотвращения утечки жидкости. Немедленно обратитесь к врачу, если произошел контакт;

Соберите образец сразу после дефекации;

Если требуется, отметьте на контейнере: дату сбора (D), код идентификации образца (ID), имя пациента (N);

Не вводите контейнер или его часть в анус;

Не собирайте фекалии при диарее, во время менструации, при ректальном кровотечении (например, геморроидальные узлы или другие причины) или если они загрязнены мочой;

Используйте устройство только один раз;

Не открывайте и не пытайтесь открыть прозрачную крышку;

Если используется носитель для сбора образца, следуйте инструкциям на носителе. Затем следуйте процедуре сбора образца, начиная с шага 3.

#### **Инструкции по сбору:**

Поместите туалетную бумагу в унитаз;

Дефекуйте на туалетную бумагу. По возможности сидите спиной вперед;

Отвинтите зеленую крышку с палочкой для отбора;

Вставьте палочку для отбора в четыре разные точки и скребите крестообразным узором по поверхности. Канавки должны быть покрыты;

Замените и плотно завинтите зеленую крышку с палочкой для отбора. Не открывайте повторно;

Храните сборное устройство в холодильнике и в темноте. Верните устройство как можно скорее для анализа.

#### **15. Сбор фекалий: фекальная эластаза**

Фекалии для исследования фекальной эластазы должны быть собраны с использованием контейнера, предоставленного Лабораторией или доступного в аптеках. Пожалуйста, обратите внимание:

Держите контейнер в недоступном для детей месте;

Соберите образец сразу после дефекации;

Не собирайте фекалии при диарее, во время менструации, при ректальном кровотечении (например, геморроидальные узлы или другие причины) или если они загрязнены мочой;

Используйте устройство только один раз.

#### **Инструкции по сбору:**

Поместите туалетную бумагу в унитаз;  
Дефектируйте на туалетную бумагу. По возможности сидите спиной вперед;  
Отвинтите синюю крышку и используйте прилагаемую лопатку в контейнере для сбора небольшого количества фекалий. Не переполняйте контейнер;  
Осторожно завинтите крышку контейнера и храните в холодильнике;  
Доставьте собранный образец в Пункт забора в тот же день.

## **16. Вагинальный и вагинально-ректальный мазок**

Пациент (женщина):

Должен воздерживаться от полового акта в течение 24 часов перед исследованием;  
Должен прекратить любую антибиотикотерапию и антимикотическую терапию как минимум за неделю;  
Не должен выполнять вагинальное спринцевание в течение 24 часов перед исследованием;  
Исследование не может быть выполнено во время менструации (кроме случаев, когда острые симптомы делают исследование необходимым в этот период).

Для вагинального мазка, предназначенного для посева, свежий препарат должен поступить в лабораторию, приготовленный во время сбора, сопровождаемый соответствующим заполненным бланком. Для вагинально-ректального мазка свежий препарат не требуется.

## **17. Цервикальный и эндоцервикальный мазок**

Пациент (женщина):

Должен воздерживаться от полового акта в течение 24 часов перед исследованием;  
Должен прекратить всю антибиотикотерапию как минимум за неделю и не должен выполнять вагинальное спринцевание в течение 24 часов перед исследованием;  
Исследование не может быть выполнено во время менструации (кроме случаев, когда острые симптомы делают исследование необходимым в этот период).

## **18. Уретральный мазок**

Пациент (женщина):

Должен воздерживаться от полового акта в течение 24 часов перед исследованием;  
Должен прекратить любую антибиотикотерапию и антимикотическую терапию как минимум за неделю;  
Не должен выполнять вагинальное спринцевание в течение 24 часов перед исследованием;  
Не должен иметь менструацию;  
Не должен мочиться в течение предыдущих трех часов.

Пациент (мужчина):

Должен воздерживаться от полового акта в течение 24 часов перед исследованием;  
Должен прекратить любую антибиотикотерапию и антимикотическую терапию как минимум за неделю;  
Не должен мочиться в течение предыдущих 3 часов.

## **19. Сбор мокроты для культурального исследования**

**Toscana Diagnostica S.r.l.**

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.  
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

Собирайте утром НАТОЩАК в стерильный контейнер с широким отверстием; тщательно полощите полость рта водой полосканием; выполняйте глубокое откашливание, собирая мокроту непосредственно в стерильный контейнер. Важно, чтобы образец не состоял из слюны, и необходимо доставить в Пункт забора в течение одного часа после сбора.

## **20. Сбор мокроты для трехнедельного цитологического исследования**

Следующие инструкции должны быть выполнены тщательно:

При пробуждении полощите полость рта водой;  
Кашляйте глубоко;  
Собирайте мокроту непосредственно в контейнер;  
Тщательно полощите полость рта водой полосканием;  
Выполняйте глубокое откашливание (слюна не должна быть собрана);  
Собирайте мокроту непосредственно в контейнер, предоставленный лабораторией;  
Повторяйте всю процедуру в течение трех последовательных дней, храня контейнеры в прохладном месте.

**ВНИМАНИЕ:** раствор в контейнере для сбора образца служит КОНСЕРВАНТОМ; поэтому его не следует выбрасывать или распределять в окружающей среде. Некоторые компоненты консерванта в чистом виде являются токсичными или воспламеняющимися. Однако они присутствуют в незначительных концентрациях в финальном растворе, придавая характеристики НЕТОКСИЧНОСТИ и НЕВОСПЛАМЕНЯЕМОСТИ. Тем не менее рекомендуется: хранить контейнеры закрытыми при комнатной температуре (15-25°C) вдали от источников тепла и пламени, не проглатывать, избегать контакта с кожей и глазами и хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза тщательно промойте водой и офтальмологическим раствором. При проглатывании пейте много воды, избегайте рвотных средств, молока или угля, проконсультируйтесь с врачом, представив этот документ. Три образца должны быть доставлены в Лабораторию вместе с документацией, касающейся: симптомов, предыдущих вмешательств, гистологических, цитологических, рентгенологических, ультразвуковых исследований дыхательного тракта и выполненной терапии.

## **21. Сбор цервико-вагинального материала для ПАП-теста**

Пациент (женщина):

Должен воздерживаться от полового акта в течение 48 часов перед исследованием;  
Не должен выполнять топическую терапию или вагинальное спринцевание в течение 24 часов перед исследованием;  
Исследование может быть выполнено до 5 дней перед менструальным периодом и только через 5 дней после его окончания.

Для анализа семенной жидкости и биологических образцов, специально не упомянутых, пожалуйста, обратитесь в Лабораторию.

## **22. Культура спермы**

Пациент должен воздерживаться от полового акта в течение 24 часов перед исследованием; должен прекратить любую антибиотикотерапию как минимум за неделю; сбор должен

предшествовать тщательная очистка наружных половых органов и рук; сбор спермы должен происходить путем мастурбации непосредственно в стерильный контейнер. При отсроченной обработке материал должен храниться в холодильнике максимум 24 часа.

## **23. Трехнедельное цитологическое исследование мочи**

Следующие инструкции должны быть выполнены тщательно:

Отбросьте первую утреннюю мочу;  
Пейте примерно один литр воды или другого неалкогольного, некипящего напитка;  
Тщательно вымойте половые органы;  
После питья соберите в контейнер, предоставленный лабораторией;  
Повторяйте всю процедуру в течение трех последовательных дней, храня контейнеры в прохладном месте.  
По завершении 3-дневного сбора доставьте 3 образца и форму приема надлежащим образом заполненную во всех разделах в лабораторию. Точный сбор клинической информации необходим для правильного цитологического диагноза.

**ВНИМАНИЕ:** раствор в контейнере для сбора образца служит КОНСЕРВАНТОМ; поэтому его не следует выбрасывать или распределять в окружающей среде. Некоторые компоненты консерванта в чистом виде являются токсичными или воспламеняющимися. Тем не менее рекомендуется: хранить контейнеры закрытыми при комнатной температуре (15-25°C) вдали от источников тепла и пламени, не проглатывать, избегать контакта с кожей и глазами и хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза тщательно промойте водой и офтальмологическим раствором. При проглатывании пейте много воды, избегайте рвотных средств, молока или угля, проконсультируйтесь с врачом, представив этот документ.

## **24. Мокрота для сбора неопластических клеток**

Мокрота должна быть собрана утром натощак.

## **25. Дыхательный тест**

### **25.1 Что такое дыхательный тест**

Дыхательный тест - это неинвазивное исследование, используемое для диагностики пищевых непереносимостей (лактоза, глюкоза, сорбитол), или при подозрении на бактериальное загрязнение (лактоза). Тест выявляет нарушения желудочно-кишечной системы и направлен на людей, ищущих ответы на симптомы, которые часто трудно интерпретировать, такие как вздутие живота, диарея, медленное или плохое пищеварение, вздутие, запор, метеоризм и плохое пищеварение.

Дыхательный тест на мочевины - это исследование, проводимое для диагностики гастродуоденальной инфекции *Helicobacter Pylori*.

### **25.2 Виды дыхательного теста**

Дыхательный тест ЛАКТОЗА: H2 дыхательный тест указан для определения недостаточного всасывания лактозы. Непереносимость лактозы является наиболее распространенной формой недостаточного всасывания углеводов, поражающей людей всех возрастов.

Причиной этого недостаточного всасывания является дефицит лактазы, нормально присутствующей в тонком кишечнике. В нормальных условиях лактоза после поступления расщепляется кишечной лактазой на глюкозу и галактозу, которые всасываются на уровне тонкого кишечника; в случае дефицита лактазы лактоза достигает толстого кишечника неизменной, где ферментируется кишечной флорой, производя различные газы, включая водород, метан и углекислый газ, которые частично поступают в кровоток и выводятся через дыхание.

**Дыхательный тест ЛАКТУЛОЗА:** H<sub>2</sub> дыхательный тест на лактулозу используется для диагностики нарушений время прохождения орально-слепокишечного (ОСТТ) и SIBO. Измерение ОСТТ оценивает время, необходимое пище для достижения кишечника, которое может быть сокращено при гиперподвижной диарее или увеличено при диспептических симптомах с запором или медленным опорожнением желудка.

**Дыхательный тест ГЛЮКОЗА:** H<sub>2</sub> дыхательный тест указан для диагностики избыточного роста бактерий в тонком кишечнике. Синдром избыточного роста бактерий очень распространен, встречается при многих органических патологиях, но также часто встречается при синдроме раздраженного кишечника (IBS) или у пациентов, хронически принимающих лекарства (антациды, ингибиторы протонной помпы), или у пациентов, перенесших абдоминальные хирургические вмешательства, или в пожилом возрасте.

**Дыхательный тест ФРУКТОЗА:** H<sub>2</sub> дыхательный тест указан для диагностики недостаточного всасывания фруктозы. Фруктоза - это натуральный сахар, встречающийся в некоторых овощах, фруктах и зерновых. Дыхательный тест на фруктозу - это неинвазивный метод для определения непереносимости фруктозы, которая проявляется диареей, метеоризмом и абдоминальной болью.

**Дыхательный тест HELICOBACTER PYLORI:** тест указан для оценки наличия *Helicobacter pylori* в слизистой оболочке желудка. *Helicobacter Pylori* - это бактерия, которая находит идеальную среду для роста и репликации внутри желудка человека. Этот микроорганизм считается единственным, способным выдерживать кислотность желудка; эта характеристика обусловлена ярко выраженной способностью продуцировать уреазу, фермент, который расщепляет мочевину на угольную кислоту и аммиак. Таким образом, уреазы нейтрализует желудочные кислоты, создавая микроокружение, благоприятное для репликации бактерий.

### **25.3 Подготовка к дыхательному тесту на лактозу, лактулозу, глюкозу, сорбитол, фруктозу**

Схема подготовки:

Тест должен быть проведен натощак;

За 4-5 дней до теста пациент не должен принимать антибиотики, пробиотики и слабительные средства (20 дней для антибиотиков);

Врач должен убедиться, что у пациента нет значительной текущей диареи;

День перед тестом пациент должен питаться исключительно: ЗАВТРАК: чашка чая; ОБЕД: тарелка вареного риса с небольшим количеством масла; УЖИН: грилированная/вареная грудка курицы/индейки или вареная рыба;

С 21:00 дня перед тестом пациент ДОЛЖЕН соблюдать полное голодание (может пить негазированную воду свободно);

С 7:00 дня теста пациент ДОЛЖЕН оставаться натощак, не чистить зубы, не курить и не заниматься спортом;

TD-SGI-INF007\_00 · Rev. 00 · Informacija Pacienta Sbor Obrazcov RU

Полоскание полости рта 0,2% хлоргексидином рекомендуется в течение 30 минут перед базальным сбором;

Во время теста курение, питье, еда, жевание жевательной резинки или конфет, или выполнение утомительной физической активности не разрешены.

#### **25.4 Подготовка к дыхательному тесту на мочевины (*Helicobacter Pylori*)**

Чтобы обеспечить адекватную точность теста, необходимо выполнить следующие инструкции:

Антибиотики и ингибиторы протонной помпы (ИПП) не должны приниматься в течение последних 4 недель;

Гастропротекторные средства не должны приниматься в неделю перед тестом;

Голодание должно соблюдаться утром дня теста; только негазированная минеральная вода может быть потреблена за 2 часа до теста;

День перед тестом должна соблюдаться следующая диета: ЗАВТРАК: ячменный кофе, чай, сухое печенье или подсушенный хлеб; ОБЕД: рис или макаронные изделия с маслом или пармезаном; ПОЛДНИК: ячменный кофе, чай, сухое печенье или подсушенный хлеб; УЖИН: белое мясо (курица, кролик или индейка), рыба, рис с маслом;

Не чистите зубы;

Курильщики должны воздерживаться от курения как минимум со вечера предыдущего дня.