

1. المقدمة

تقدم هذه الوثيقة التعليمات التشغيلية للجمع الصحيح للعينات البيولوجية من قبل مرضى مختبر توسكانا ديجيت. يعتبر الامتثال للتعليمات الواردة فيها أساسياً لضمان موثوقية النتائج التحليلية والصحة التشخيصية للاختبارات. يتم توفير الحاويات التي تستخدم لمرة واحدة لجمع العينات مجاناً من قبل توسكانا ديجيت أو يمكن شراؤها من الصيدلية. في حالة وجود شكوك حول طريقة التحضير أو الجمع، يُدعى المريض للاتصال بنقطة السحب أو مختبر التحليل.

2. سحب الدم الوريدي

للسحب الدم الوريدي يجب على المريض:
الصيام لمدة 8-12 ساعة قبل السحب;
تجنب ممارسة النشاط البدني الشاق في الساعات الـ 12 السابقة;
عدم التدخين في الفترة بين الاستيقاظ وإجراء السحب;
عدم تناول الكحول في الساعات الـ 12 السابقة للسحب.

3. سكر الدم قبل الطعام

يجب إجراء السحب بفاصل زمني مقدره ساعتان بعد الإفطار.

4. سكر الدم بعد الطعام

يجب إجراء السحب بفاصل زمني مقدره ساعتان بعد وجبة الغذاء.

5. منحنى سكر الدم ومنحنى سكر الدم أثناء الحمل

يجب على المريض:
الحضور عند فتح نقطة السحب;
الصيام لمدة 8 ساعات على الأقل وليس أكثر من 14 ساعة قبل السحب.
يجب على المريض عدم تغيير نظامه الغذائي في الأيام الثلاثة السابقة للاختبار والحفاظ على نشاطه البدني المعتاد. بعد إجراء السحب الأساسي لتحديد سكر الدم والتحقق من ملائمة الاختبار، يتم إعطاء المريض كمية محلول الجلوكوز المنصوص عليها في الوصفة الطبية أو نوع المنحنى، والذي يجب تناوله في غضون 5 دقائق. يجب على المريض البقاء في الموقع طوال المدة المحددة من نوع المنحنى الموصوف من قبل الطبيب المعالج.

مخطط منحنىات السكر:

منحنى سكر الدم أثناء الحمل (كود 1166): 75 غرام جلوكوز — النقاط: أساسي | 60 دقيقة | 120 دقيقة
منحنى حمل الجلوكوز 75 غرام (كود 1079): 75 غرام جلوكوز — النقاط: أساسي | 30 دقيقة | 60 دقيقة | 90 دقيقة
منحنى الأنسولين (كود 6533): 75 غرام جلوكوز — النقاط: أساسي | 30 دقيقة | 60 دقيقة | 90 دقيقة | 120 دقيقة

ملاحظة: بناءً على طلب الطبيب، قد يتم تعديل نقاط منحنى الأنسولين.

6. الأدوية

يجب على المريض الحضور إلى نقطة السحب صائماً قبل تناول الأدوية الصباحية لإجراء السحب.

7. جمع عينات الفحص الكامل للبول

اغسل الأعضاء التناسلية الخارجية بعناية. للفحص الكامل للبول، اجمع عينة من أول بول صباحي مع التخلص من الجزء الأول. استخدم حاويات تستخدم لمرة واحدة توفرها توسكانا ديجيت مجاناً أو متاحة في الصيدليات. يُنصح النساء بالانتظار ثلاثة أيام على الأقل بعد انتهاء الدورة الشهرية. أغلق الحاوية جيداً بالغطاء المرفق بعد جمع كمية بول تساوي الحد الأقصى للحاوية (50 مل). يجب تسليم العينة في أقرب وقت ممكن من الجمع.

8. جمع البول لمزرعة البول

يجب جمع البول في حاوية معقمة بفتحة واسعة. يتم إجراء الفحص على أول بول صباحي باتباع تقنية "التيار الأوسط" بالإجراء التالي:

اغسل يديك بعناية بالماء والصابون;
اغسل الأعضاء التناسلية الخارجية بعناية بالماء والصابون، اشطفها;
يجب على النساء الحفاظ على الشفرات الكبرى منفردة بيد واحدة وعلى الرجال الحفاظ على جلد حشفة;
القضيب مسحوا تماماً أثناء عمليات تنظيف الجلد وجمع العينة;
تجاهل أول تيار من البول;
اجمع البول التالي مباشرة في الحاوية;
تجاهل آخر تيار من البول;
أغلق الحاوية بسرعة عند انتهاء الجمع مع التحقق من جمع كمية بول تساوي الحد الأقصى للحاوية (50 مل);
سلم العينة في أقرب وقت ممكن; إذا كان التسليم للمختبر مؤجلاً، يجب حفظ عينة البول في الثلاجة لمدة أقصاها 24 ساعة.
من الضروري إيقاف أي علاج بالمضادات الحيوية لمدة أسبوع واحد على الأقل، ما لم يشر الطبيب المعالج إلى خلاف ذلك.

9. جمع البول لمزرعة البول لدى المرضى الأطفال

اغسل يديك بعناية بالماء والصابون;
نظف الأعضاء التناسلية الخارجية بعناية;
ضع كيس جمع معقم (متوفر في الصيدليات) مع الالتصاق جيداً بالجلد;
اترك الكيس في المكان لمدة لا تزيد عن 60-90 دقيقة; إذا لزم الأمر، قم بتغييره وإعادة العملية;
بمجرد التبول، أزل الكيس وأغلقه بعناية، ضعه في حاوية بلاستيكية معقمة لمزرعة البول بدون صب وسلم العينة في أقرب وقت ممكن للمختبر/نقطة السحب. إذا كان التسليم للمختبر مؤجلاً، يجب حفظ عينة البول في الثلاجة لمدة أقصاها 24 ساعة.

10. جمع البول لمدة 24 ساعة (غير المعالج)

يجب جمع البول لمدة 24 ساعة للعديد من المحللات بما في ذلك: الألومنيوم، أميلاز البول، حمض اليوريك، حمض 5-هيدروكسيندول الخليك، حمض الهوموفانيليك، حمض الفانيليلماندليك، الأدرينالين-النورادرينالين في البول، ألفا 1 ميكروغلوبيولين، الألدوستيرون البولي، الزرنيخ، بيتا 2 ميكروغلوبيولين، الكادميوم، الكالسيوم البولي، الكوبالت، الكروم، السلاسل الخفيفة كإبأ ولامدا، 17-الكيتوستيرويد، السيستين، السترات، تصفية اليوريا والكرياتينين، الكلور البولي، الكوبروبورفيرينات، الكورتيزول البولي، الكوتينين، الكرياتينين، الروابط المتصالية، الدوبامين البولي، الرحلان الكهربائي للبروتينات البولية، الحديد، الفوسفور البولي، الجلو كوسوريا، بول الهيدروكسيبرولين، التثبيث المناعي البولي، اليود البولي، الماغنيسيوم البولي، الزئبق، المتانفرينات البولية، الميتوكسيتيرامين، الزلال الدقيق، النيكل، النورمتانفرينات البولية، البيتين سي البولي، الرصاص، إجمالي البورفيرينات، البوتاسيوم البولي، البروتينوريا، النحاس، الصوديوم البولي، يوروبورفيرينات، اليوريا، السيروتونين.

ملاحظات خاصة لمحللات محددة:

حمض الفانيليلماندليك: بدءاً من 48 ساعة قبل البدء وطوال فترة جمع البول، من الضروري الالتزام بنظام غذائي خالٍ من الأطعمة التالية: أفوكادو، موز، كيوي، فاكهة مجففة، قهوة، شاي، شوكولاتة. خلال هذه الفترة، يُنصح بتجنب تناول الأدوية بعد التشاور مع الطبيب؛ خلاف ذلك، من المناسب إخبار اسم الأدوية المتناولة في وقت الفحص.
الكيتوستيرويد: بدءاً من 48 ساعة قبل البدء وطوال فترة جمع البول، من الضروري الالتزام بنظام غذائي خالٍ -17- من الأطعمة التالية: أناناس، أفوكادو، موز، كيوي، توت، برقوق أحمر، طماطم، فاكهة مجففة، قهوة، شاي، شوكولاتة. خلال هذه الفترة، يُنصح بتجنب تناول الأدوية بعد التشاور مع الطبيب.
بول الهيدروكسيبرولين 24 ساعة: بدءاً من 48 ساعة قبل البدء وطوال فترة جمع البول، تجنب الأطعمة التالية: لحم، منتجات اللحوم، مرق ومستخلصات اللحم، المنتجات التي تحتوي على الجيلاتين، سمك، حلويات، بيض. خلال هذه الفترة، يُنصح بتجنب تناول الأدوية بعد التشاور مع الطبيب.
الكوبروبورفيرينات والبورفيرينات الكلية واليوروبورفيرينات: احم من الضوء لجمع البول، من الضروري: 1 برطمان بول 24 ساعة (متوفر في الصيدليات) و 1 حاوية بول (غير معقمة).

طريقة الجمع:

ابدأ الجمع بإفراغ المثانة تماماً، مع استبعاد البول من أول تبول صباحي، وسجل وقت بدء الجمع (مثل الساعة 7:00);
اجمع كل بول اليوم والليل في وعاء واحد;

في صباح اليوم التالي، أنه الجمع ببول أطلقت في نفس الوقت من اليوم السابق (على سبيل المثال 7:00 صباحاً) في نفس الحاوية;
في نهاية الجمع، امزج بول 24 ساعة بعناية;
اسكب كمية (بحد أدنى 50 مل) في الحاوية;
سجل الكمية الإجمالية المجموعة من برطمان البول 24 ساعة وسلم العينة للمختبر في المؤسسة.
ملاحظة: يجب حفظ البول في مكان بارد أثناء فترة الجمع.

11. جمع البول لمدة 24 ساعة معقمة

يجب جمع البول لمدة 24 ساعة المعقمة للمحلل التالي: أملاح الأوكسالات في البول 24 ساعة لجمع البول، من الضروري: 1 برطمان بول 24 ساعة (متوفر في الصيدليات) و 1 حاوية بول (غير معقمة) لتسليمها إلى المؤسسة والمختبر.

طريقة الجمع:

ابدأ الجمع بإفراغ المثانة تماماً، مع استبعاد البول من أول تبول صباحي، وسجل وقت بدء الجمع (مثل الساعة 7:00);
في قاع حاوية جمع البول ضع ملعقتي طعام ممثلتين من حمض الميوربريك التجاري بتركيز 10-12% وأضف البول الذي طرحته في اليوم والليل مع الخلط بعناية بعد كل إضافة;
في صباح اليوم التالي، أنه الجمع ببول أطلقت في نفس الوقت من اليوم السابق (على سبيل المثال 7:00 صباحاً) في نفس الحاوية;
في نهاية الجمع، امزج بول 24 ساعة بعناية;
اسكب كمية (بحد أدنى 50 مل) في الحاوية;
سجل الكمية الإجمالية المجموعة من برطمان البول 24 ساعة وسلم العينة للمختبر في المؤسسة.
ملاحظة: يجب حفظ البول في مكان بارد أثناء فترة الجمع.

تحذير: استخدم أقصى درجات الحذر عند استخدام حمض الهيدروكلوريك لأنه يتمتع بخصائص حكومية قوية وتهيج.

12. جمع البراز لمزرعة البراز والبحث عن الطفيليات والفحص الكامل

يجب جمع البراز بملعقة صغيرة عادية موجودة في الحاويات التجارية العادية بكمية تساوي حبة جوز. في حالة التسليم المتأخر للمختبر، يمكن حفظ العينة في الثلاجة حتى التسليم (حتى أقصى 24 ساعة). يجب تذكر للفحص الطفيلي، يُنصح بإجراء الفحص على ثلاث عينات براز صباحية مجمعة في أيام مختلفة وتسليمها كل يوم لمزرعة البراز، من الضروري إيقاف أي علاج بالمضادات الحيوية لمدة أسبوع واحد على الأقل، ما لم يشر الطبيب المعالج إلى خلاف ذلك؛ أثناء الجمع، يجب الانتباه لعدم تلوث البراز بماء المراض أو البول لعدم المساس بنتيجة الفحص الميكروبيولوجي. في حالة التسليم المتأخر للمختبر، يمكن حفظ العينة في الثلاجة حتى التسليم للمختبر (حتى أقصى 24 ساعة);
للفحص الكامل، من الضروري استخدام حاوية معقمة وجمع أي أجزاء مخاطية أو دموية وتسليمها في أقرب وقت ممكن للمختبر. في حالة التسليم المتأخر للمختبر، يمكن حفظ العينة في الثلاجة حتى التسليم للمختبر (حتى أقصى 24 ساعة).

13. اختبار الكيس

قم بإجراء الاختبار في الصباح دون الاضطلاع بأي مناورات صحية. استخدم شريط لاصق شفاف بوضع الجزء اللاصق من الشريط على فتحة الشرج وتطبيق ضغط خفيف لمدة 30 ثانية. قم بفرد الشريط اللاصق على سطح الشريحة الزجاجية المقدمة مسبقاً من المختبر مع تجنب تكوين الطيات. يجب إجراء الجمع في نفس يوم الجمع لزج وشديد العدوى، لذلك، أثناء جميع مراحل الجمع يُنصح بارتداء قفازات واقية Enterobius Vermicularis بيض.

14. جمع البراز للبحث عن الدم الخفي وكالبروتكتين البراز

يجب جمع البراز للبحث عن الدم الخفي وكالبروتكتين من خلال الحاوية الصادرة عن المختبر، متبعاً التعليمات المرفقة. يجب تذكر:
أحم الحاوية بعيداً عن تناول الأطفال

يجب عدم ابتلاع السائل الموجود في الحاوية ويجب عدم ملامسته للعيون أو الأغشية المخاطية. تم تصميم الأنبوب على وجه التحديد لتجنب تسرب السوائل. استشر الطبيب على الفور إذا حدث التلامس;
أجرِ الجمع فوراً بعد التبرز;
(N) اسم المريض، (ID) رمز تحديد العينة، (D) إذا لزم الأمر، لاحظ على الحاوية: تاريخ الجمع;
لا تدخل الحاوية أو أي جزء منها في الشرج;
لا تجرِ جمع البراز في حالة الإسهال أو أثناء الحيض أو في حالة النزيف من المستقيم (مثل البواسير أو أسباب أخرى) أو إذا كانت ملوثة بالبول;
استخدم الجهاز مرة واحدة فقط;
لا تفتح أو تحاول فتح الغطاء الشفاف;
في حالة استخدام جهاز دعم لجمع العينة، اتبع التعليمات المرفقة معه. بعد ذلك، اتبع إجراء جمع العينة بدءاً من النقطة 3.

تعليمات الجمع:

ضع ورق التواليت داخل المرحاض;
تبرز على ورق التواليت. إذا أمكن، اجلس بشكل معاكس
افك غطاء أخضر يحتوي على قضيب;
أدخل قضيب الجمع في أربع نقاط مختلفة واسحب على السطح على شكل صليب. يجب تغطية الأخاديس;
أعد وأغلق بإحكام الغطاء الأخضر الذي يحتوي على قضيب لا تفتح مجدداً;
احتفظ بجهاز الجمع في الثلاجة وفي الظلام. أعد جهاز الجمع في أسرع وقت ممكن للتحليل.

15. جمع البراز: الإيلاستيز البرازي

يجب جمع البراز للبحث عن الإيلاستيز البرازي من خلال الحاوية الصادرة عن المختبر أو المتاحة في الصيدليات.
يجب تذكر:
احمِ الحاوية بعيداً عن متناول الأطفال;
أجرِ الجمع فوراً بعد التبرز;
لا تجرِ جمع البراز في حالة الإسهال أو أثناء الحيض أو في حالة النزيف من المستقيم (مثل البواسير أو أسباب أخرى) أو إذا كانت ملوثة بالبول;
استخدم الجهاز مرة واحدة فقط.

تعليمات الجمع:

ضع ورق التواليت داخل المرحاض;
تبرز على ورق التواليت. إذا أمكن، اجلس بشكل معاكس
افك الغطاء الأزرق وباستخدام المكشطة المنصوصة عليها في الحاوية اجمع كمية صغيرة من البراز لا تملأ الحاوية;
أغلق بحذر غطاء الحاوية واحفظه في الثلاجة;
سلم العينة المجموعة إلى مركز السحب خلال اليوم.

16. جمع المسحة المهبلية والمسحة المهبلية-المستقيمية

يجب على المريضة:
الامتناع عن العلاقات الجنسية في الـ 24 ساعة السابقة للفحص;
إيقاف أي علاج بالمضادات الحيوية والأدوية المضادة للفطريات لمدة أسبوع واحد على الأقل;
عدم إجراء غسيل مهبل في الـ 24 ساعة السابقة للفحص;
لا يمكن إجراء الجمع أثناء الحيض (إلا في الحالات التي تجعل الأعراض الحادة الجمع ضرورياً حتى في هذه الفترة) فقط بخصوص المسحة المهبلية المعدة للثقافة، من الضروري أن يصل إلى المختبر شريحة طازجة تم إجراؤها في وقت الجمع، مصحوبة بالنموذج ذي الصلة المملوء بشكل صحيح. على العكس من ذلك، بالنسبة للمسحة المهبلية-المستقيمية، لا توجد شريحة طازجة.

17. جمع المسحة العنقية والمسحة داخل عنق الرحم

يجب على المريضة:
الامتناع عن العلاقات الجنسية في الـ 24 ساعة السابقة للفحص;

TD-SGI-INF009_00 · Rev. 00 · Patient Information Sample Collection AR

إيقاف أي علاج بالمضادات الحيوية لمدة أسبوع واحد على الأقل وعدم إجراء غسيل مهبل في الـ 24 ساعة السابقة للفحص;
لا يمكن إجراء الجمع أثناء الحيض (إلا في الحالات التي تجعل الأعراض الحادة الجمع ضروريًا حتى في هذه الفترة)

18. جمع المسحة الإحليلية

يجب على المريضة:

الامتناع عن العلاقات الجنسية في الـ 24 ساعة السابقة للفحص;
إيقاف أي علاج بالمضادات الحيوية والأدوية المضادة للفطريات لمدة أسبوع واحد على الأقل;
عدم إجراء غسيل مهبل في الـ 24 ساعة السابقة للفحص;
عدم وجود الحيض;
عدم التبول في الساعات الثلاث السابقة.

يجب على المريض:

الامتناع عن العلاقات الجنسية في الـ 24 ساعة السابقة للفحص;
إيقاف أي علاج بالمضادات الحيوية والأدوية المضادة للفطريات لمدة أسبوع واحد على الأقل;
عدم التبول في الساعات الـ 3 السابقة.

19. جمع البلغم لفحص الثقافة

قم بإجراء الجمع في الصباح صائماً في حاوية معقمة بفتحة واسعة؛ شطف تجويف الفم بعناية ببعض المضمضات التي تتم بالماء؛ قم بإجراء زفير عميق مع جمع البلغم مباشرة في الحاوية المعقمة. من المهم أن تتكون العينة من البلغم وليس اللعاب وأنه من الضروري تسليمها إلى نقطة السحب في غضون ساعة واحدة من الجمع.

20. جمع البلغم لفحص خلوي على ثلاث عينات

بخصوص الجمع يُنصح بالامتثال بدقة للتعليمات التالية:

عند الاستيقاظ، شطف تجويف الفم بالماء؛

سعال عميق؛

جمع البلغم مباشرة في الحاوية؛

شطف تجويف الفم بعناية ببعض المضمضات التي تتم بالماء؛

قم بإجراء زفير عميق (يجب عدم جمع اللعاب)؛

جمع البلغم مباشرة في الحاوية المقدمة من المختبر؛

كرر الإجراء بأكمله لثلاثة أيام متتالية مع الحفاظ على الحاويات في مكان بارد.

تنبيه: المحلول الموجود في الحاوية لجمع العينة له وظيفة حافظة؛ لذلك، يجب عدم رميه أو تشتيته في البيئة. بعض المواد التي تشكل الحافظة في حالتها النقية قد تكون سامة أو قابلة للاشتعال. ومع ذلك، فهي موجودة بتركيز مهمل في المحلول النهائي، مما يعطيها خصائص عدم السمية وعدم قابلية الاشتعال. ومع ذلك، يُنصح بـ: الاحتفاظ بالحاويات مغلقة، في درجة حرارة الغرفة (15-25 درجة مئوية) بعيداً عن مصادر الحرارة والنار، عدم الابتلاع، تجنب ملامسة الجلد والعينين والاحتفاظ بعيداً عن متناول الأطفال. في حالة ملامسة العينين، شطف بكثرة بالماء وبمحلول عيني مخفف. في حالة الابتلاع، شرب كمية كبيرة من الماء، تجنب القيء واللبن أو الفحم، استشر الطبيب مع تقديم هذه الوثيقة. يجب تسليم العينات الثلاث إلى المختبر، مصحوبة بالوثائق المتعلقة بـ: السيتولوجية والإشعاعية والموجات فوق الصوتية للجهاز، 组织学 والأعراض والعمليات السابقة والفحوصات التنفسي والعلاجات التي تم إجراؤها.

21. جمع المادة عنق الرحم المهبلي لإجراء اختبار مسحة عنق الرحم

يجب على المريضة:

الامتناع عن العلاقات الجنسية في الـ 48 ساعة السابقة للفحص؛

عدم إجراء العلاجات الموضعية أو غسيل مهبل في الـ 24 ساعة السابقة للفحص؛

يمكن إجراء الجمع حتى 5 أيام قبل الحيض و فقط 5 أيام بعد انتهائه.

بخصوص فحص السائل المنوي والعينات البيولوجية غير المذكورة صراحة، يُنصح بالاتصال بالمختبر.

22. مزرعة السائل المنوي

يجب على المريض الامتناع عن العلاقات الجنسية في الـ 24 ساعة السابقة للفحص؛ يجب على المريض إيقاف أي علاج بالمضادات الحيوية لمدة أسبوع واحد على الأقل؛ يجب أن يسبق الجمع تنظيف دقيق للأعضاء التناسلية

والأيدي؛ يجب أن يحدث جمع السائل المنوي عن طريق الاستمنااء مباشرة في حاوية معقمة. في حالة الزراعة المتأخرة يجب حفظ المادة في الثلاجة لمدة أقصاها 24 ساعة.

23. فحص خلوي بولي على ثلاث عينات

بخصوص الجمع يُنصح بالامتثال بدقة للتعليمات التالية:

القضاء على أول بول صباحي

شرب حوالي لتر واحد من الماء أو مشروب غير كحولي وغير فوار

غسل الأعضاء التناسلية بعناية

بعد الشرب، جمع البول في الحاوية المقدمة من المختبر

كرر الإجراء بأكمله لثلاثة أيام متتالية مع الحفاظ على الحاويات في مكان بارد

في نهاية فترة الجمع لمدة 3 أيام، سلم العينات الثلاث إلى المختبر وورقة الاستقبال المملوءة بشكل كامل في كل قسم. جمع دقيق للمعلومات السريرية أساسي لتشخيص خلوي صحيح

تنبيه: المحلول الموجود في الحاوية لجمع العينة له وظيفة حافظة؛ لذلك، يجب عدم رميه أو تشيته في البيئة.

بعض المواد التي تشكل الحافظة في حالتها النقية قد تكون سامة أو قابلة للاشتعال. يُنصح بـ: الاحتفاظ بالحاويات مغلقة، في درجة حرارة الغرفة (15-25 درجة مئوية) بعيداً عن مصادر الحرارة والنار، عدم الابتلاع، تجنب ملامسة الجلد والعينين والاحتفاظ بعيداً عن متناول الأطفال. في حالة ملامسة العينين، شطف بكثرة بالماء وبمحلول عيني مخفف. في حالة الابتلاع، شرب كمية كبيرة من الماء، تجنب القيء واللين أو الفحم، استشر الطبيب مع تقديم هذه الوثيقة.

24. البلغم لجمع الخلايا الورمية

يجب جمع البلغم صباحاً صائماً

25. اختبار الزفير

25.1 ما هو اختبار الزفير

اختبار الزفير أو اختبار التنفس هو فحص غير اجتياحي يُستخدم لتشخيص عدم تحمل الطعام (اللاكتوز والجلوكوز والسوربيتول) أو في الاشتباه في التلوث البكتيري (اللاكتولوز). يسمح الاختبار بتحديد التغييرات في الجهاز المعدي المعوي ويوجه إلى أولئك الذين يسعون للحصول على إجابة للأعراض التي غالباً ما يصعب تفسيرها مثل الهواء في البطن الذي يبطئ مروره والإسهال والهضم "السيء" أو البطيء والانتفاخ والإمساك والانتفاخ وسوء الهضم.

اختبار الزفير بالبولية هو فحص يتم إجراؤه لتشخيص العدوى المعوية الاثني عشرية الناجمة عن الملوية البوابية.

25.2 أنواع اختبار الزفير

للزفير مؤشر لتحديد سوء امتصاص اللاكتوز. عدم تحمل اللاكتوز هو شكل أكثر H2 اختبار الزفير باللاكتوز: اختبار شيوفاً من سوء امتصاص الكربوهيدرات ويؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار. السبب في سوء الامتصاص هذا يرجع إلى نقص اللاكتاز الموجود عادة في الأمعاء الدقيقة. في الظروف العادية، يتم تقسيم اللاكتوز بعد الابتلاع بواسطة اللاكتاز المعوي إلى جلوكوز وجلاكتوز يتم امتصاصهما على مستوى اللفائفي؛ في حالة نقص اللاكتاز، يصل اللاكتوز إلى القولون غير مغير حيث يتم تخميره بواسطة النبيت الجرثومي مما ينتج عنه غازات متعددة منها الهيدروجين والميثان وثاني أكسيد الكربون، ويمر بعضها إلى الدوران الدموي ويتم القضاء عليها عن طريق هواء الرئتين.

للزفير باللاكتولوز يستخدم لتشخيص تغيير وقت العبور عن طريق الفم H2 اختبار الزفير باللاكتولوز: اختبار قياس وقت العبور عن طريق الفم للأغور يخدم لتقييم الوقت الذي يستغرقه الطعام SIBO و OCTT) للأغور المتناول للوصول إلى الأمعاء، وقت قد يكون قصيراً في حالة الإسهال من فرط الحركة أو طويلاً في حالة الأعراض الحمضية في حالة الإمساك أو تفرغ المعدة البطيء.

للزفير مؤشر لتشخيص الإفراط في نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة. متلازمة H2 اختبار الزفير بالجلوكوز: اختبار الإفراط في نمو البكتيريا شائعة جداً وتكرر في العديد من الأمراض العضوية ولكن يتم العثور عليها أيضاً بشكل أو في المرضى الذين يتناولون أدوية بشكل مزمن (مضادات (IBS) متكرر في متلازمة القولون العصبي الحموضة ومثبطات مضخة البروتون) أو الذين خضعوا لعمليات جراحية في البطن أو في سن متقدمة

للزفير مؤشر لتشخيص سوء امتصاص الفركتوز. الفركتوز سكر طبيعي H2 اختبار الزفير بالفركتوز: اختبار وموجود في الأطعمة مثل بعض أنواع الخضراوات والفاكهة والحبوب. اختبار الزفير بالفركتوز هو طريقة غير اجتياحية لتحديد عدم تحمل الفركتوز الذي يتجلى في الإسهال والانتفاخ وآلام البطن

اختبار الزفير لالملوية البوابية: الاختبار مؤشر لتقييم وجود الملوية البوابية في الغشاء المخاطي للمعدة. الملوية البوابية هي بكتيريا تجد الموطن المثالي للنمو والتكاثر داخل المعدة البشرية. يعتبر هذا الكائن الدقيق الكائن الوحيد القادر على مقاومة حموضة البيئة المعدية؛ تُعطى هذه الخاصية من قدرتها على إنتاج يوريز، إنزيم يقسم اليوريا إلى ثاني أكسيد الكربون والأمونيا. بهذه الطريقة، يحيد يوريز الأحماض المعدية مما يخلق بيئة دقيقة مواتية لتكاثر البكتيريا.

الإعداد لاختبار الزفير بـ اللاكتوز واللاكتولوز والجلوكوز والسكريتول والفركتوز 25.3

مخطط التحضير:

يجب إجراء الاختبار صائماً؛

في الأيام 4/5 السابقة للفحص، يجب على المريض عدم تناول الأدوية المضادة للبكتيريا والبروبيوتيكس والمليينات (20 يوماً للأدوية المضادة للبكتيريا)؛

يجب على الطبيب التأكد من أن المريض لا يعاني من إسهال شديد؛

يجب على المريض أن يتناول في اليوم السابق للفحص حصراً: الإفطار: فنان شاي واحد؛ الغداء: طبق من الأرز؛ المسلوق مع قليل من الزيت؛ العشاء: صدر دجاج/ديك رومي مشوي/مسلق أو سمك مسلق؛

من الساعة 9 مساءً في اليوم السابق للفحص يجب ملاحظة صيام كامل (يمكن شرب ماء بدون غاز بحرية)؛

من الساعة 7 صباحاً في يوم الفحص يجب على المريض أن يبقى صائماً وعدم غسل الأسنان وعدم التدخين وعدم ممارسة النشاط البدني؛

يُنصح بإجراء مضمضات تجويف الفم بـكلورهيكسيدين 0.2% في الـ 30 دقيقة السابقة للسحب الأساسي

أثناء إجراء الاختبار، لا يُسمح بالتدخين أو الشرب أو الأكل أو مضغ العلكة أو الحلويات أو ممارسة نشاط بدني مرهق.

الإعداد لاختبار الزفير بالبول (الملوية البوابية) 25.4

لضمان دقة الاختبار الكافية، من الضروري الالتزام بالتعليمات المدرجة أدناه:

(PPI) في الأسابيع الأربعة الأخيرة لا يجب تناول المضادات الحيوية ومثبطات مضخة البروتون؛

في الأسبوع السابق للفحص لا يجب تناول واقيات المعدة؛

صباح يوم الفحص يجب الالتزام بالصيام؛ 2 ساعة قبل الفحص يمكن شرب ماء معدني غير مفتوح؛

اليوم السابق للفحص من الضروري اتباع النظام الغذائي المدرج أدناه: الإفطار: قهوة شعير أو شاي أو بسكويت جاف أو خبز محمص؛ الغداء: أرز أو معكرونة مع زيت أو جبن بارميزانو الريديانو؛ بعد الظهر: قهوة شعير أو شاي أو بسكويت جاف أو خبز محمص؛ العشاء: لحم أبيض (دجاج أو أرنب أو ديك رومي) أو سمك أو أرز مع زيت؛

عدم غسل الأسنان؛

إذا كان مدخناً يجب الامتناع عن التدخين من مساء اليوم السابق على الأقل.