

Descrizione dell'esame

L'Esofago-Gastro-Duodenoscopia (EGDS), comunemente detta Gastrosopia, è un esame diagnostico e/o terapeutico che consente al medico di visualizzare direttamente l'interno del tratto superiore del tubo digerente (Esofago, Stomaco e le prime due porzioni del Duodeno) mediante uno strumento sottile e flessibile dotato di telecamera e illuminazione.

Indicazioni

L'esame è indicato per diagnosticare lesioni organiche quali ulcere e tumori con accuratezza superiore al 95%, per identificare la causa di sintomi del tratto digestivo superiore, per effettuare biopsie di tessuti sospetti, e per interventi terapeutici come l'arresto di emorragie. La gastrosopia consente inoltre di ricercare infezioni da *Helicobacter pylori*.

Preparazione

Tempistica	Indicazione
Sera precedente	Consumare una cena leggera
Dalla mezzanotte	Digiuno rigoroso da cibi solidi
Fino a 3 ore prima	È possibile bere acqua, the, tisane, camomilla con zucchero
Ultime 3 ore	Digiuno completo anche da liquidi

Rimuovere protesi dentali mobili se presenti.

Che cosa portare

Prescrizione medica con esplicito quesito diagnostico, carta di identità e tessera sanitaria, esami strumentali precedenti (ecografie, RX, ecc.) e di laboratorio, elenco dei farmaci in corso (in particolare anticoagulanti e antiaggreganti).

Sedazione

L'esame può essere eseguito in sedazione cosciente (leggera sedazione, paziente responsivo) o sedazione profonda (paziente completamente addormentato solo durante la procedura). La sedazione è facoltativa e deve essere richiesta al momento della prenotazione. Se si opta per la sedazione, è obbligatorio presentarsi accompagnati da una persona responsabile.

Che cosa aspettarsi

L'esame non è doloroso e non interferisce con la respirazione. Il medico introdurrà delicatamente lo strumento attraverso la bocca. Se necessario, durante l'esame potranno essere effettuate biopsie mediante una piccola pinza. Gli strumenti utilizzati sono sottoposti a rigido lavaggio e disinfezione secondo le linee guida internazionali. La procedura dura mediamente 20-30 minuti.

Dopo l'esame

È normale avvertire una leggera sensazione di gonfiore addominale che scomparirà spontaneamente. Se è stata effettuata sedazione: non guidare veicoli per le successive 24 ore, non firmare documenti importanti e non svolgere attività potenzialmente pericolose. Contattare il medico in caso di febbre, dolore intenso, o emorragia.

Complicanze

TD-SGI-INF027_00 · Rev. 00 · Gastrosopia EGDS

Le complicanze della EGDS diagnostica sono rare, ma aumentano con le manovre operative. Includono: disturbi cardio-respiratori (0,9%, legati principalmente alla sedazione), emorragia (inferiore a 0,5%), perforazione (rarissima, 0,0004%).

Pazienti in terapia anticoagulante/antiaggregante

Se si assumono farmaci anticoagulanti o antiaggreganti (Coumadin, Cardioaspirina, Aspirina, Ticlopidina, Clopidogrel, Plavix, Xarelto, Eliquis, Dabigatran, Apixaban, Pradaxa, Lixiana, ecc.), contattare il proprio medico curante prima dell'esame per valutare la possibilità di sospendere o sostituire la terapia.

Segnalare al medico

Allergie a farmaci (in particolare anestetici locali), disturbi della coagulazione, malattie cardiache o respiratorie, gravidanza o sospetta gravidanza.