

Descrizione dell'esame

Le prove allergiche per anestetici sono test diagnostici per identificare specifiche allergie a farmaci anestetici locali. L'esame consiste in iniezioni intradermiche di piccole quantità di diversi anestetici.

Preparazione

Indicazione	Dettaglio
Antistaminici	Sospendere almeno 10 giorni prima dell'esame
Corticosteroidi	Sospendere almeno 10 giorni prima dell'esame
Alcol	Non assumere nelle 48 ore precedenti il test

Che cosa portare

Prescrizione medica, carta di identità e tessera sanitaria, elenco dei farmaci assunti.

Durante l'esame

Verranno iniettati piccoli volumi di diversi anestetici nella pelle dell'avambraccio. L'esame è indolore, si avvertono solo piccole punture. Dopo 15-20 minuti saranno osservate possibili reazioni cutanee. La prima sessione dura solitamente 1 ora e 30 minuti.

Sessione successiva

Se i risultati non sono conclusivi, può essere programmata una seconda sessione dopo almeno 1 settimana.

Dopo l'esame

Possono presentarsi arrossamenti lievi nella zona punturata, che scompaiono in poche ore. In rari casi possono manifestarsi reazioni allergiche; contattare la struttura se si presentano sintomi importanti.