

Che cosa è la RM Entero

La risonanza magnetica dell'intestino tenue (entero-RM) è un esame diagnostico non invasivo che consente di visualizzare le pareti e il lume dell'intestino tenue senza l'utilizzo di radiazioni ionizzanti. E' particolarmente indicata per la diagnosi e il follow-up delle malattie infiammatorie croniche intestinali (es. morbo di Crohn).

1. Preparazione all'esame

Istruzione	Dettaglio
Digiuno	Necessario digiuno da cibi solidi e liquidi da 6 ore prima dell'esame
Soluzione orale	Al momento dell'arrivo verrà somministrata una soluzione orale (circa 1-1,5 litri) da bere in 45-60 minuti per distendere le anse intestinali
Arrivo	Presentarsi almeno 60 minuti prima dell'orario previsto per l'esame
Medicinali	Prendere regolarmente eventuali medicinali in uso
Esami preliminari	Eseguire il dosaggio della creatininemia (da non oltre un mese dalla data dell'esame)
Metformina	In caso di diabete con metformina, sospenderla 48 ore prima e dopo l'esame

2. Controindicazioni

La risonanza magnetica non può essere eseguita in portatori di pacemaker, clips chirurgiche non compatibili con RM (in particolare per interventi eseguiti prima del 2000), protesi del cristallino (segnalarne la presenza) e qualunque altro dispositivo elettronico o protesico di cui è utile conoscere marca e modello per valutare la compatibilità.

Togliere eventuali lenti a contatto. Protesi dentarie metalliche sia fisse che mobili, otturazioni, perni, capsule non rappresentano controindicazioni. Le pazienti sono invitate a presentarsi senza trucco e lacca per evitare artefatti.

È controindicata l'esecuzione dell'esame per le pazienti in gravidanza (presunta o in atto) durante il primo trimestre. Per gli esami nei trimestri successivi consultarsi preventivamente con il medico radiologo.

3. Esecuzione dell'esame

L'esame prevede il posizionamento sul lettino della RM. Durante l'esecuzione potrà essere somministrato un farmaco antispastico per via endovenosa per ridurre la peristalsi intestinale e migliorare la qualità delle immagini. La durata dell'esame è di circa 30-40 minuti. In caso di esame con mezzo di contrasto, il gadolinio sarà iniettato per via endovenosa.

4. Documentazione da portare

Presentare sempre la richiesta medica. Portare precedenti indagini strumentali e di laboratorio e segnalare eventuali terapie in atto.