

## Che cosa è la RM Prostata Multiparametrica

La risonanza magnetica prostatica multiparametrica (mpMRI) è un esame diagnostico avanzato che combina sequenze morfologiche e funzionali (T2, DWI, DCE con mezzo di contrasto) per la valutazione della ghiandola prostatica. E' il gold standard per la diagnosi e la caratterizzazione delle lesioni prostatiche sospette secondo il protocollo PI-RADS.

### 1. Preparazione all'esame

| Istruzione               | Dettaglio                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Digiuno                  | Necessario digiuno da cibi solidi e liquidi da 6 ore prima dell'esame                 |
| Preparazione intestinale | Eseguire un microclisma (clistere piccolo) 2-3 ore prima dell'esame                   |
| Vescica                  | Non urinare nell'ora precedente l'esame (vescica moderatamente piena)                 |
| Astinenza                | Astenersi da eiaculazione nelle 72 ore precedenti l'esame                             |
| Esami preliminari        | Eseguire il dosaggio della creatininemia (da non oltre un mese dalla data dell'esame) |
| Arrivo                   | Presentarsi almeno 30 minuti prima dell'esame                                         |
| Metformina               | In caso di diabete con metformina, sospenderla 48 ore prima e dopo l'esame            |

### 2. Controindicazioni

La risonanza magnetica non può essere eseguita in portatori di pacemaker, clips chirurgiche non compatibili con RM (in particolare per interventi eseguiti prima del 2000), protesi del cristallino (segnalarne la presenza) e qualunque altro dispositivo elettronico o protesico di cui è utile conoscere marca e modello per valutare la compatibilità.

Togliere eventuali lenti a contatto. Protesi dentarie metalliche sia fisse che mobili, otturazioni, perni, capsule non rappresentano controindicazioni. Le pazienti sono invitate a presentarsi senza trucco e lacca per evitare artefatti.

E' controindicata l'esecuzione dell'esame per le pazienti in gravidanza (presunta o in atto) durante il primo trimestre. Per gli esami nei trimestri successivi consultarsi preventivamente con il medico radiologo.

### 3. Documentazione

Presentare sempre la richiesta medica. Portare il valore recente del PSA, precedenti indagini strumentali e di laboratorio e segnalare eventuali terapie in atto. La durata dell'esame è di circa 40-50 minuti.