

Premessa

La ricerca di sostanze d'abuso consente di accertare l'eventuale assunzione e/o esposizione a sostanze stupefacenti avvenuta nei giorni (urine) o nei mesi (matrice pilifera) che precedono la raccolta del campione. La concentrazione di alcol etilico nel sangue è un indicatore dell'abuso acuto di bevande alcoliche. Il valore di CDT è alterato in caso di abuso alcolico cronico.

L'etilglucuronide (EtG) è un indicatore del consumo recente (urine) ovvero cronico (capelli) di alcol.

L'esecuzione di questi accertamenti richiede la raccolta delle urine, il prelievo (taglio) dei capelli, o il prelievo di sangue, a seconda della richiesta.

La raccolta urinaria non comporta alcun rischio per il paziente. Il test viene eseguito sul campione di urine del paziente che effettua la richiesta; pertanto, il paziente deve consegnare unicamente un campione delle proprie urine; non vi è la possibilità di eseguire test su campioni terzi.

Il prelievo del campione di matrice pilifera viene effettuato preferibilmente in zona nucale mediante taglio alla base del fusto di una ciocca del diametro di una matita (circa di 5-7 mm). È un prelievo privo di particolari rischi e indolore, ma può lasciare un piccolo inestetismo che scompare con la ricrescita dei capelli.

Il paziente deve presentarsi con capelli di lunghezza superiore a 2 cm e dichiarare se ha effettuato trattamenti cosmetici (decolorazione, tintura, permanente, trattamento anticaduta) negli ultimi mesi. Nel caso di calvizie, si procederà al prelievo di formazioni pilifere da altre zone del corpo, a seconda della disponibilità (petto, ascelle, pube).

Il prelievo di sangue prevede il riempimento di due distinte provette e viene effettuato mediante puntura di una vena periferica, preferibilmente alla piega del gomito, utilizzando apposito materiale sterile. Tale procedura non comporta alcun particolare rischio, ma può causare una lieve e transitoria sensazione dolorosa al momento della puntura. È inoltre possibile che, intorno alla sede di prelievo, si formi un ematoma circoscritto causato dallo stravasamento di sangue, con conseguente variazione del colore della cute che può perdurare anche sino a due settimane. Il problema può essere evitato o comunque limitato comprimendo il punto di prelievo per qualche minuto, a prelievo completato, con un batuffolo di cotone idrofilo.

La richiesta di accertamenti per sostanze d'abuso a valenza clinica non fornisce risultati a valenza medico legale, per i quali è necessario effettuare relativi test eseguiti con procedure specifiche.

Data e luogo: _____

Il Paziente

L'Operatore Sanitario
