

H2 Breath Test per la diagnosi della sovra crescita batterica

La sindrome da sovra crescita batterica è molto frequente, ricorre in molte patologie organiche ma si riscontra anche spesso nella sindrome dell'intestino irritabile (IBS) o in pazienti che assumono cronicamente farmaci (antiacidi, inibitori della pompa protonica) o che hanno subito interventi chirurgici sull'addome o nell'età avanzata.

A COSA SERVE IL BREATH AL GLUCOSIO

In ambito gastroenterologico il breath test consente di individuare alterazioni del sistema gastroenterico come: contaminazione batteriche, malassorbimento intestinale e alterazione del transito intestinale, che possono manifestarsi mediante disturbi gastrointestinali caratterizzati da flatulenza, meteorismo, diarrea, distensione e crampi intestinali.

INDICAZIONI

L'H2 Breath Test è indicato per la diagnosi di sovra crescita batterica nell'intestino tenue.

COMPONENTI DEL KIT

1 Flacone contenente 50 g di glucosio

9 buste singole per insufflare

Preparazione del paziente per l'esecuzione dell'H2 Breath Test

Il test va eseguito a digiuno.

Nei 4/5 giorni precedenti l'esame il paziente non deve assumere farmaci a base di antibiotici, fermenti lattici e lassativi (20 giorni per farmaci a base di antibiotici)

Il medico deve assicurarsi che il paziente non abbia in corso una diarrea importante

Il paziente il giorno prima dell'esame deve alimentarsi esclusivamente con:

COLAZIONE: una tazza di tè

PRANZO: un piatto di riso bollito condito con poco olio

CENA: un petto di pollo/tacchino grigliato/lesso oppure pesce lesso.

Dalle ore 21.00 del giorno precedente l'esame deve osservare un digiuno completo (può bere liberamente acqua non gasata).

Dalle ore 7.00 del giorno dell'esame il paziente deve restare a digiuno, non lavarsi i denti, non fumare, non deve svolgere attività fisica.

- Durante l'esecuzione del test non è consentito fumare, bere, mangiare, masticare chewing gum o caramelle o svolgere attività fisica stancante.

PROCEDURA PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE DI ESPIRATO

Raccolta del campione Basale:

- Far soffiare in una busta (tempo 0)
- Apporre l'etichetta di riconoscimento del paziente relativa al Tempo 0

Far ingerire al paziente la soluzione di 50 g di glucosio (25 g nei bambini) disciolti in 250 ml di acqua non gasata

- Eseguire l'operazione come per il prelievo basale ogni 15 minuti per una durata totale di 2 ore (8 campioni + 1 basale da effettuare prima della somministrazione del substrato).