

H2 Breath Test per la diagnosi del malassorbimento del LATTOSIO

DEFICIT DELLA LATTASI E INTOLLERANZA AL LATTOSIO

L'intolleranza al lattosio è la forma più comune di malassorbimento dei carboidrati e colpisce persone di ogni età. La causa di questo malassorbimento è dovuta alla carenza di lattasi, normalmente presente nel piccolo intestino.

H2 BREATH TEST

L'H2 Breath Test è una tecnica che trova molte applicazioni, come lo studio della capacità di assorbimento ileale. Questo Test è frequentemente inserito tra le indagini eseguite per diagnosticare il malassorbimento a determinati carboidrati. In condizioni normali il lattosio dopo l'ingestione viene scisso dalle lattasi intestinali in glucosio e galattosio che vengono assorbiti a livello digiuno-ileale; nel caso in cui vi sia una carenza di lattasi, il lattosio raggiunge il colon inalterato dove viene fermentato dalla flora batterica producendo vari gas, tra cui idrogeno, metano e anidride carbonica che in parte passano nel circolo ematico ed eliminati attraverso l'aria dei polmoni.

INDICAZIONI

L'H2 Breath Test è indicato per determinare il malassorbimento al lattosio, una sintomatologia caratterizzata da: flatulenza, distensione e crampi addominali, diarrea.

COMPONENTI DEL KIT

2 Bustine contenente ciascuna 12,5 g di lattosio (1 busta singola per bambino, 2 buste per adulti)
9 buste singole per insufflare

Preparazione del paziente per l'esecuzione dell'H2 Breath Test

Il test va eseguito a digiuno.

Nei 4/5 giorni precedenti l'esame il paziente non deve assumere farmaci a base di antibiotici, fermenti lattici e lassativi (20 giorni per farmaci a base di antibiotici)

Il medico deve assicurarsi che il paziente non abbia in corso una diarrea importante

Il paziente il giorno prima dell'esame deve alimentarsi esclusivamente con:

COLAZIONE: una tazza di tè

PRANZO: un piatto di riso bollito condito con poco olio

CENA: un petto di pollo/tacchino grigliato/lesso oppure pesce lesso.

Dalle ore 21.00 del giorno precedente l'esame deve osservare un digiuno completo (può bere liberamente acqua non gasata).

- Dalle ore 7.00 del giorno dell'esame il paziente deve restare a digiuno, non lavarsi i denti, non fumare, non deve svolgere attività fisica.
- Durante l'esecuzione del test non è consentito fumare, bere, mangiare, masticare chewing gum o caramelle o svolgere attività fisica stancante.

Procedura per la raccolta del campione di espirato

Raccolta del campione Basale:

- Far soffiare in una busta (tempo 0)
- Apporre l'etichetta di riconoscimento del paziente relativa al Tempo 0
- Far ingerire al paziente la soluzione di 25 g di lattosio (0,5 g/kg corporeo nei bambini) disciolti in 200 ml di acqua non gasata
- Eseguire l'operazione come per il prelievo basale ogni 30 minuti per una durata totale di 4 ore (8 campioni + 1 basale da effettuare prima della somministrazione del substrato).