

Io sottoscritto/a

Nome	Cognome	Nato/a a:	PROV.
Nato/a il:	Telefono	Cellulare	Mail

informato sulle conseguenze relative all'assunzione della soluzione di glucosio, come da modulo informativo ricevuto in data odierna, chiedo ed accetto di sottopormi all'esame prescritto.

ID	Quesito	Sì	No
1	Le è mai stato diagnosticato il Diabete?		
2	Assume farmaci quali insulina, metformina e/o altri antidiabetici orali?		
3	È allergico/intollerante agli agrumi?		
4	È in gravidanza?		

/ /
Data

Firma per esteso

Sezione a carico del personale sanitario Toscana Diagnostica

Valore glicemia basale: _____ mg/dL Lotto e scadenza
soluzione glucosata
somministrata _____

**Firma leggibile del sanitario
che ha raccolto il consenso**

Nota Bene. In caso di insorgenza di sintomi o segni suggestivi di iperglicemia occorre provvedere alla misura della glicemia del sangue capillare in accordo all'istruzione operativa di riferimento.

Misura glicemia del sangue capillare (indicare ora della misurazione e valore)

MODULO INFORMATIVO

Glucosio Sclavo Diagnostics è un farmaco preparato allo scopo di poter fornire una soluzione glucosata stabile e sempre pronta per l'esecuzione dei test basati sul carico orale di glucosio.

EFFETTI INDESIDERATI

Come tutti i medicinali, Glucosio Sclavo Diagnostics può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino. Si può verificare uno stato di nausea che può giungere al vomito. In questo caso deve essere invalidato il test.

AVVERTENZE SPECIALI

Gravidanza e allattamento: Non esistono controindicazioni collegate al periodo di gravidanza e allattamento; tuttavia, il prodotto deve essere somministrato sotto diretto controllo dell'operatore sanitario.

Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari: Non sono segnalati effetti sulla capacità di guidare o usare macchinari dopo somministrazione del farmaco; tuttavia, nelle 2 ore previste fra i prelievi, non è consigliata la guida né altre attività fisiche. Informazioni importanti su alcuni eccipienti: Il medicinale contiene para-idrossi-benzoati che possono causare reazioni allergiche (anche ritardate) e, eccezionalmente, broncospasmo.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Non deve essere effettuata curva glicemica per bambini fino all'età di 14 ANNI compiuti. Per tutta la durata della procedura diagnostica, il paziente deve rimanere sotto stretto controllo del personale sanitario per monitorare la comparsa di eventuale malore. Il paziente non deve allontanarsi dalla struttura, non deve assumere alimenti e bevande. In particolare, deve essere monitorata l'eventuale insorgenza di sintomi e segni suggestivi di iperglicemia, quali tachicardia, malessere generale, stato di confusione, obnubilamento del sensorio, vomito; al minimo dubbio, procedere a misura della glicemia del sangue capillare. L'esame non deve essere considerato valido e quindi deve essere interrotto se si manifestano vomito e/o chiari fenomeni di disfagia.