

INFORMATIVA CURVA GLICEMICA

Gentile Signora,

l'esame che si appresta ad eseguire è la "curva glicemica da carico orale di glucosio (75 g)". La preghiamo pertanto di leggere con attenzione questo documento che ha lo scopo di consentirle di valutare in modo consapevole se effettuare o meno l'esame. Per qualunque approfondimento, potrà fare riferimento al suo Medico di fiducia.

Finalità della prova

Lo scopo dell'esame è quello di verificare se è affetta o meno da diabete nel corso della gravidanza in atto.

Esecuzione dell'esame

Il test deve essere eseguito al mattino, dopo digiuno di almeno 8 ore, ma protratto non oltre le 12 ore. Nei tre giorni precedenti l'esame è sufficiente seguire un'alimentazione normale, equilibrata, con almeno 150 g/die di glucidi, con una normale attività fisica, e possibilmente senza l'assunzione di farmaci che possano alterare la tolleranza al glucosio (**in caso di assunzione di farmaci prescritti dal medico, che non dovrà essere interrotta, occorrerà segnalarla al momento del prelievo**). È opportuno che non vi siano malattie in atto.

Durante l'esecuzione del test lei dovrà:
rimanere a riposo, seduta o sdraiata
non fumare
non mangiare.

Dopo una prima verifica da digito-puntura del livello di glicemia, propedeutica alla somministrazione del carico di glucosio, le sarà eseguito un primo **prelievo** di sangue venoso per determinare la glicemia **basale**. Successivamente, dovrà bere nell'arco di circa 5 minuti una soluzione contenente 75 g di glucosio disciolto in 300 mL di acqua.

Quindi le saranno effettuati due prelievi venosi di sangue a distanza di un'ora, il primo dopo 60 minuti ed il secondo dopo 120 minuti dalla somministrazione del carico di "zucchero". **In totale le saranno effettuati 3 prelievi.**

Possibili effetti collaterali

L'assunzione della soluzione di glucosio potrebbe procurarle:

- nausea (in caso di vomito la prova sarebbe interrotta)
- sindrome vagale: in questo caso lei sarebbe posta in posizione distesa, con le gambe leggermente alzate. Potrebbe essere opportuno infonderle liquidi.
- calo della glicemia dopo la seconda ora, per cui potrebbe essere necessario farle assumere carboidrati per bocca o, solo in casi particolari, somministrarle glucosio per via venosa; sarà pertanto invitata a restare presso l'Istituto per qualche tempo oltre la seconda ora e per questo motivo le verrà ricontrollato il valore della glicemia con prelievo di sangue capillare (digito-puntura), anche più di una volta se necessario, per verificare che la glicemia si sia stabilizzata su valori normali.

Se non avverte nausea, al termine del test potrà mangiare. Le abbiamo sottoposto questo modulo nell'intento di essere esaurienti nel darle tutte le informazioni di suo interesse. Non esiti comunque a porci tutti i quesiti e le domande che riterrà opportune. La ringraziamo per la sua collaborazione.

ESPRESSIONE ED ACQUISIZIONE DEL CONSENSO

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

La Signora, dopo aver letto accuratamente la specifica informativa allegata al presente consenso, ha personalmente avuto modo di confrontarsi con il/la Dr./Dr.ssa _____, in merito agli ulteriori dubbi o richieste di chiarimento relative all'esecuzione dell'esame di **curva glicemica da carico orale di glucosio in gravidanza** e, avendo ben compreso quanto letto nell'informativa e quanto riferitole dal medico sopra indicato,

- ☐ Acconsente all'esecuzione della prestazione
☐ Non Acconsente all'esecuzione della prestazione

Firma del/della paziente _____
Firma del Medico _____

Data ____/____/____

L'esecuzione dell'esame ha richiesto la somministrazione di una SOLUZIONE GLUCOSATA contenente 75 g di glucosio disciolto in 300 mL di acqua

N. Lotto _____
Scadenza _____

Data ____/____/____