



Government of India
Ministry of Earth Sciences
India Meteorological Department
Meteorological Centre Jaipur



भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
भारत मौसम विज्ञान विभाग
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर

संयुक्त कृषि - मौसम सलाहकार सेवा बुलेटिन राजस्थान राज्य

(बुलेटिन में उल्लिखित सलाह राजस्थान में विभिन्न AMFU और DAMU द्वारा तैयार की गई हैं)

बुलेटिन संख्या: 69/2026

जारी दिनांक 01.09.2026



राज्य के नौ कृषि-जलवायु क्षेत्र

क्र.सं	कृषि-जलवायुक्षेत्र	ज़िले	एग्रोमेट फील्ड यूनिट (AMFU) स्थान
1	Arid Western Plain	Barmer and part of Jodhpur	Jodhpur (CAZRI)
2	Irrigated North Western Plain	Sriganganagar, Hanumangarh	Sriganganagar
3	Hyper arid Partial irrigated zone	Bikaner, Jaisalmer, Parts of Churu	Bikaner
4	Internal Drainage Dry	Nagaur, Sikar, Jhunjhunu, Part of Churu	Fatehpur (Sikar)
5	Transitional Plain of Luni basin	Jalore, Pali, part of Sirohi, Jodhpur	Jodhpur (CAZRI)
6	Semi Arid Eastern Plains	Jaipur, Ajmer, Dausa, Tonk	Jaipur(DURGAPURA)
7	Flood Prone Eastern Plain	Alwar, Dholpur, Bharatpur, Karauli, SawaiMadhopur	Bharatpur (SEWAR)
8	Sub-Humid Southern Plains	Bhilwara, Sirohi, Udaipur, Chittorgarh	Udaipur (RCA)
9	Humid Southern Plains	Dungarpur, Udaipur, Banswara, Chittorgarh, Pratapgarh	Banswara
10	Humid South Eastern Plain	Kota, Jhalawar, Bundi, Baran	Kota

1. मौसम संबंधी चेतावनियाँ (मौसम-उपविभाग स्तर)

- **01 सितंबर:** राजस्थान में कोई चेतावनी नहीं
- **02 सितंबर:** पूर्वी राजस्थान में कुछ जगहों पर आंधी-तूफान/बिजली कड़कने और 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने की संभावना।
- **03 सितंबर:** पूर्वी राजस्थान में कुछ जगहों पर आंधी-तूफान/बिजली कड़कने और 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने की संभावना।
- **04 सितंबर:** पूर्वी राजस्थान में कुछ जगहों पर भारी बारिश के साथ आंधी-तूफान/बिजली कड़कने और 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने की संभावना।
- **05 सितंबर:** पूर्वी राजस्थान में कुछ जगहों पर भारी बारिश के साथ आंधी-तूफान/बिजली कड़कने और 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने की संभावना।

2. मौसम-उपविभाग स्तर पर विस्तारित रेंज पूर्वानुमान (21 अगस्त- 03 सितम्बर 2026)

मौसम उप-विभाग	वर्षा		अधिकतम तापमान	
	सप्ताह 1 (21-27 अगस्त)	सप्ताह 2 (28 अगस्त- 03 सितम्बर)	सप्ताह 1 (21-27 अगस्त)	सप्ताह 2 (28 अगस्त- 03 सितम्बर)
पूर्वी राजस्थान	Below Normal	Below Normal	Above Normal	Above Normal
पश्चिमी राजस्थान	Below Normal	Below Normal	Above Normal	Above Normal

3. राज्य में पिछले चार दिनों की वर्षा का सारांश (28 – 31 अगस्त 2026):

मौसम उप-विभाग	28-08-2026	29-08-2026	30-08-2026	31-08-2026
पूर्वी राजस्थान	DRY	ISOL	DRY	DRY
पश्चिमी राजस्थान	DRY	DRY	DRY	DRY

4. अगले 5 दिनों के लिए वर्षा का पूर्वानुमान:

मौसम उप-विभाग	01-09-2026	02-09-2026	03-09-2026	04-09-2026	05-09-2026
पूर्वी राजस्थान	ISOL	ISOL	SCT	SCT	SCT
पश्चिमी राजस्थान	DRY	DRY	ISOL	ISOL	ISOL

ISOL:	पृथक अर्थात 1 या 2 स्थानों पर वर्षा	SCT:	बिखरी हुई अर्थात कुछ स्थानों पर वर्षा
FWS:	काफी व्यापक अर्थात कई स्थानों पर वर्षा		
WS:	व्यापक अर्थात अधिकांश स्थानों पर वर्षा	DRY:	कोई वर्षा नहीं

5. राजस्थान की विभिन्न कृषि मौसम क्षेत्रीय इकाइयों (एएमएफयू) द्वारा जारी कृषि मौसम परामर्श

i. AMFU जोधपुर

ज़िला:जोधपुर

सामान्य सलाहकार:

लगभग पिछले 30 दिनों से वर्षा नहीं होने के कारण खेतों में खड़ी खरीफ फसलों में प्रयाप्त नमी कि कमी हो सकती है। किसान भाई खरपतवार नियंत्रण करें तथा आवश्यकता हो तो पौधों के बीच हल्की गुड़ाई करें, खेत में नमी संरक्षण के उपाय अपनाएं तथा अनावश्यक नराई-गुड़ाई से बचें।

लघु संदेश सलाहकार:

सामान्य सलाहकार:

लगभग पिछले 30 दिनों से वर्षा नहीं होने के कारण खेतों में खड़ी खरीफ फसलों में प्रयाप्त नमी कि कमी हो सकती है। किसान भाई खरपतवार नियंत्रण करें तथा आवश्यकता हो तो पौधों के बीच हल्की गुड़ाई करें, खेत में नमी संरक्षण के उपाय अपनाएं तथा अनावश्यक नराई-गुड़ाई से बचें।

लघु संदेश सलाहकार:

आने वाले दिनों में शुष्क मौसम की स्थिति को देखते हुए किसान भाई फसलों में मुरझान बिंदु पर एक जीवन रक्षक सिंचाई अवश्य करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मूँग	मूँग की फसल में फली छेदक कीट का प्रकोप दिखाई देने पर नियंत्रण हेतु मैलीथियान 50 ईसी या क्यूनालफॉस 25 ई.सी. @ 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें।
रेंड़ी	अरण्डी की फसल को सेमीलूपर के प्रकोप की सम्भावना है। नियंत्रण के लिए एक लीटर क्यूनालफॉस 25 ई.सी का प्रति हेक्टेयर में छिड़काव करें।
तिल	तिल की फसल में फाईलोडी रोग के नियंत्रण के लिए रोगी पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दे तथा इमिडाक्लोप्रिड 17.8 एस.सी. का 2.5 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
मिर्च	मिर्च की फसल में श्यामव्रण (एन्थ्रेक्नोज) रोग के नियंत्रण के लिए डाइफेन्कोनाज़ोल 25 ई.सी. आधा मिली लीटर का प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें।
भिण्डी	भिण्डी की फसल में फली छेदक कीट के नियंत्रण हेतु फेनवेलरेट 20 ई.सी. 0.5 मिलीलीटर का प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशु बाड़े में मल-मूत्र व कचरा आदि के कारण पशु में संक्रामक रोगों व परजीवियों का प्रकोप बढ़ने का खतरा रहता है। अतः बाड़े की साफ-सफाई पर ध्यान दें।

सामान्य सलाहकार:

जिन क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से वर्षा बहुत कम या नहीं हुई है, वहां किसान मृदा नमी संरक्षण के उपाय अपनाएं। उपलब्धता के अनुसार फसल अवशेष अथवा सूखी घास से मलचिंग करें। सिंचाई की सुविधा होने पर जल का विवेकपूर्ण उपयोग करें तथा महत्वपूर्ण फसल अवस्थाओं में सिंचाई को प्राथमिकता दें। बार-बार निराई-गुड़ाई करने से बचें, क्योंकि इससे मृदा नमी का ह्रास बढ़ सकता है।

लघु संदेश सलाहकार:

अनार में विल्ट रोग के प्रभावी नियंत्रण के लिये 02 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद में 10 ग्राम ट्राईकोडर्मा विरिडी को अच्छी तरह मिलाकर प्रति पौधे की दर से दें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
बाजरा	तापमान में वृद्धि के कारण बाजरा की फसल में अरगट रोग के प्रकोप की संभावना है रोग से बचाने के लिए जाइनेब डाई किलो या मैन्कोजेब दो किलो प्रति हैक्टेयर की दर से तीन-तीन दिन के अन्तर पर 2-3 बार छिड़काव करें।
तिल	तिल की फसल में फाईलोडी रोग के नियंत्रण के लिए रोगी पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें तथा इमिडाक्लोप्रिड 17.8 एस.सी. का 2.5 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।
मंथ बीना	मोठ की फसल में पीतशिरा मोजेक रोग का प्रकोप दिखाई देने पर डाइमिथोएट 30 ई.सी. एक लीटर का प्रति हैक्टेयर की दर से छिड़काव करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशु बाड़े में मल-मूत्र व कचरा आदि के कारण पशु में संक्रामक रोगों व परजीवियों का प्रकोप बढ़ने का खतरा रहता है। अतः बाड़े की साफ-सफाई पर ध्यान दें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

कोई नहीं

सामान्य सलाहकार:

लगभग पिछले 20 दिनों से वर्षा नहीं होने के कारण खेतों में खड़ी खरीफ फसलों में प्रयाप्त नमी की कमी हो सकती है। किसान भाई खरपतवार नियंत्रण करें तथा आवश्यकता हो तो पौधों के बीच हल्की गुड़ाई करें, खेत में नमी संरक्षण के उपाय अपनाएं तथा अनावश्यक नराई-गुड़ाई से बचें।

आगामी दिनों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है तथा वर्षा नहीं होने की संभावना है।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
बाजरा	तापमान में वृद्धि के कारण बाजरा की फसल में अरगट रोग के प्रकोप की संभावना है रोग से बचाने के लिए जाइनेब ट्राई किलो या मैन्कोजेब दो किलो प्रति हैक्टेयर की दर से तीन-तीन दिन के अन्तर पर 2-3 बार छिड़काव करें।
कपास	बी.टी. कपास में तम्बाकू की लट को नियंत्रण करने हेतु थायोडिकार्ब 75 एस.पी. 175 ग्राम प्रति लीटर पानी या क्यूनालफॉस 20 ई.सी. 2 मि.ली प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें।
मूँगफली	मूँगफली की फसल में लीफ माइनर के नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोरपिड 1 मि.ली. का प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
अनार	अनार में विल्ट रोग के प्रभावी नियंत्रण के लिये 02 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद में 10 ग्राम ट्राईकोडर्मा विरिडी को अच्छी तरह मिलाकर प्रति पौधे की दर से दे।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशु बाड़े में मल-मूत्र व कचरा आदि के कारण पशु में संक्रामक रोगों व परजीवियों का प्रकोप बढ़ने का खतरा रहता है। अतः बाड़े की साफ-सफाई पर ध्यान दें।

ज़िला:पाली

सामान्य सलाहकार:

लगभग पिछले 30 दिनों से वर्षा नहीं होने के कारण खेतों में खड़ी खरीफ फसलों में प्रयाप्त नमी कि कमी हो सकती है। किसान भाई खरपतवार नियंत्रण करें तथा आवश्यकता हो तो पौधों के बीच हल्की गुड़ाई करें, खेत में नमी संरक्षण के उपाय अपनाएं तथा अनावश्यक नराई-गुड़ाई से बचें।

लघु संदेश सलाहकार:

आने वाले दिनों में शुष्क मौसम की स्थिति को देखते हुए किसान भाई फसलों में मुरझान बिंदु पर एक जीवन रक्षक सिंचाई अवश्य करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मूँग	मूँग की फसल में फली छेदक कीट का प्रकोप दिखाई देने पर नियंत्रण हेतु मैलीथियान 50 ईसी या क्यूनालफॉस 25 ई.सी. @ 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें।
तिल	तिल की फसल में फाईलोडी रोग के नियंत्रण के लिए रोगी पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दे तथा इमिडाक्लोप्रिड 17.8 एस.सी. का 2.5 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।
बाजरा	तापमान में वृद्धि के कारण बाजरा की फसल में अरगट रोग के प्रकोप की संभावना है रोग से बचाने के लिए जाइनेब ढाई किलो या मैन्कोजेब दो किलो प्रति हेक्टेयर की दर से तीन-तीन दिन के अन्तर पर 2-3 बार छिड़काव करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	इस मौसम में पशुओं में खुरपका-मुँहपका, गलघोंटू रोग होने की संभावना होती है अतः पशुओं को इन रोगों से बचाव हेतु टिके अवश्य लगवा लें।

ज़िला: चूरू

सामान्य सलाहकार:

लगभग पिछले 20 दिनों से वर्षा नहीं होने के कारण खेतों में खड़ी खरीफ फसलों में प्रयाप्त नमी कि कमी हो सकती है। किसान भाई खरपतवार नियंत्रण करें तथा आवश्यकता हो तो पौधों के बीच हल्की गुड़ाई करें, खेत में नमी संरक्षण के उपाय अपनाएं तथा अनावश्यक नराई-गुड़ाई से बचें।

लघु संदेश सलाहकार:

शुष्क मौसम की स्थिति को देखते हुए नए लगाए गए फलों के पौधों और सब्जियों के खेतों में मिट्टी में पर्याप्त नमी बनाए रखें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मूँग	मूँग की फसल में फली छेदक कीट का प्रकोप दिखाई देने पर नियंत्रण हेतु मैलीथियान 50 ईसी या क्यूनालफॉस 25 ई.सी. @ 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें।
बाजरा	तापमान में वृद्धि के कारण बाजरा की फसल में अरगट रोग के प्रकोप की संभावना है रोग से बचाने के लिए जाइनेब ढाई किलो या मैन्कोजेब दो किलो प्रति हेक्टेयर की दर से तीन-तीन दिन के अन्तर पर 2-3 बार छिड़काव करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	इस मौसम में पशुओं में खुरपका-मुँहपका, गलघोंटू रोग होने की संभावना होती है अतः पशुओं को इन रोगों से बचाव हेतु टिके अवश्य लगवा लें।

ii. AMFU श्रीगंगानगर

ज़िला: श्रीगंगानगर/ हनुमानगढ़				
फसल	अवस्था	विवरण	कृषि सलाह (Agricultural Advisory)	
देसी कपास	फूलगुडी एवं टिण्डा बनना	सिंचाई फूल गिरना पोटेशियम नाईट्रेट	- देसी कपास के खेत में पानी की आवश्यकता होने पर सिंचाई करें। - कपास के खेत में खरपतवार न पनपने दें। इसके लिए पहली निराई-गुड़ाई सिंचाई के बाद बत्तर आने पर कसिये से करें तथा इसके बाद एक और निराई-गुड़ाई त्रिफाली से करें। - यदि फूल गिरने की समस्या हो तो एसीमोन या प्लानोफिवस का 2.5 मिली. प्रति 100 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। - देसी कपास में चरम पुष्पण अवस्था पर पोटेशियम नाईट्रेट का 2.0 प्रतिशत घोल बनाकर पहला छिड़काव करें।	
अमेरिकन नरमा	फूलगुडी एवं टिण्डा बनना	फूल गिरना पोटेशियम नाईट्रेट थ्रिप्स गुलाबी सुण्डी	- यदि फूल गिरने की समस्या हो तो एसीमोन या प्लानोफिवस का 2.5 मिली. प्रति 100 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। - अमेरिकन नरमा में चरम पुष्पण अवस्था पर पोटेशियम नाईट्रेट का 2.0 प्रतिशत घोल बनाकर पहला छिड़काव करें। - यदि थ्रिप्स प्रकोप दिखाई देने पर इमिडाक्लोप्रिड 200 प्रतिशत एस.एल. 0.3 मिली. प्रति लीटर पानी या थायोमैथोक्वाम 25 डब्ल्यू.जी. 0.50 मिली प्रति लीटर पानी या स्पिनेटरम् 11.7 एस.सी. का 0.84 मिली. व स्पिनोसेड 45 एस.सी. का 0.33 मिली प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। आगामी मौसम पूर्वानुमान को देखते हुये स्त्रे न करें। - गुलाबी सुण्डी का प्रकोप होने पर नीम का तेल 5 मिली. या एन.एस.के.ई. 5 प्रतिशत (50 मिली.) को 1.0 मिली. कपड़े धोने के पाऊंडर के साथ प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें या किसी नीम आधारित कीटनाशक की 5.0 मिली. या स्पिनेटरम् 11.7 एस.सी. की 0.84 मिली या प्रोफेनोफॉस 50 ई.सी. 2.0 मिली. मात्रा का प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। आगामी मौसम पूर्वानुमान को देखते हुये स्त्रे न करें।	
मूंग	फूल व फली	हरा तेला व थ्रिप्स	मूंग में हरा तेला व थ्रिप्स से बचाव हेतु डायमैथोएट (30 ई.सी.) का 2.5 मिली. प्रति लीटर पानी में मिलाकर प्रति बीघा की दर से छिड़काव करें।	
ग्वार	वानस्पतिक वृद्धि एवं फूल	जीवाणु झुलसा रोग	इस रोग की रोकथाम के लिये खड़ी फसल में 100 लीटर पानी में स्ट्रेप्टोसाइक्लीन 20 ग्राम व कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 डब्ल्यू पी 200 ग्राम के हिसाब से घोल बनाकर 15 दिन के अन्तराल पर दो छिड़काव करें।	
गन्ना	वानस्पतिक वृद्धि एवं गन्ना बनना	तना छेदक दीमक	- फसल में यदि अगेता तना छेदक या जड़ छेदक का प्रकोप दिखाई देवे तो प्यूराडॉन 3 प्रतिशत कण 6 किलो प्रति बीघा या फोरेट 10 प्रतिशत कण 4 किलो प्रति बीघा की दर से गोभे में डालें। आगामी मौसम पूर्वानुमान को देखते हुये स्त्रे न करें। - फसल को दीमक के प्रकोप से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड (17.8 एसएल) 125 मिली अथवा बलोरोपार्सीफॉस (20 ईसी) 1.25 लीटर प्रति बीघा की दर से सिंचाई पानी के साथ देवे। आगामी मौसम पूर्वानुमान को देखते हुये सिंचाई न करें। आगामी मौसम पूर्वानुमान को देखते हुये स्त्रे न करें।	
किन्नु	नये बाग स्थापना	खरपतवार	किन्नु के बागों में निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल देवें। जिन किसान भाईयों ने किन्नु के नये बाग लगाने के लिए गड़ढे तैयार कर रखे है, वो उनमें रोपण कार्य करें। पौधे उद्यान विभाग की नर्सरी व अन्य प्रमाणित नर्सरी से ही प्राप्त करें।	

iii. AMFU बीकानेर

ज़िला: बीकानेर				
कृषकों के लिए कृषि सलाह (Agro Advisory): गत सप्ताह की मौसम समीक्षा एवं इस सप्ताह के लिए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को निम्न सलाह दी जाती है।				
विशेष सलाह	- मेघगर्जन व आकाशीय बिजली चमकने के दौरान पेड़, खम्भों व पानी के स्रोतों से दूर रहें व सुरक्षित जगह पर शरण लेवें। - क्षारीय वाले खेतों में मानसून की वर्षा शुरू होने से पहले गहरी जुताई करके जिप्सम या सड़ी हुई गोबर की खाद डालकर रखे।			
फसल	अवस्था	विवरण	कृषि सलाह	
मूंगफली	फूल आना	सूक्ष्म और गौण पोषक तत्वों का प्रयोग	मूंगफली की फसल में जिप्सम, जिंक और फेरस सल्फेट के इस्तेमाल का सबसे सही समय है। सुझा बनने की अवस्था के दौरान फसल की नियमित रूप से सिंचाई करें।	
बाजरा	वृद्धि	सिंचाई	जहाँ ज़रूरत हो, वहाँ नाइट्रोजन की बची हुई मात्रा के साथ फ़सल की सिंचाई करें।	
कपास	फूल की कली/स्केयर का बनना	सिंचाई/छिड़काव	कपास में रस चूसने वाले कीटों को नियंत्रित करने के लिए इमिडाक्लोप्रिड 0.3 मिली/लीटर या थियोमैथोक्वाम 0.3 ग्राम/लीटर या एसिटामिप्रिड 0.4 मिली/लीटर या थियोक्लोप्रिड 1.0 मिली/लीटर या डाइफेन्थुरोन 2 ग्राम/लीटर पानी के साथ छिड़काव करें।	
ग्वार, तिल एवं मोठ	फूल आना	रस चूसने वाले कीटों का नियंत्रण	रस चूसने वाले कीटों (थ्रिप्स) की रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड 0.3 मिली/लीटर या थियोमैथोक्वाम 0.3 ग्राम/लीटर या डाइमैथोएट 1.5 मिली/लीटर पानी का छिड़काव करें।	
उद्यानिकी		सिंचाई	उद्यानिकी फल फसलों जैसे खजूर, किन्नों, संतरा व नींबू की समय पर सिंचाई करें।	
चारागाह		चराई	बारी-बारी से चराना या आंशिक रूप से चराना प्रबंधन का एक बेहतर तरीका है।	
पशुधन		स्वास्थ्य प्रबंधन	दुधारू पशुओं में स्तनदाह से बचाव के उपाय अपनाएं। पेट के कीड़ों की दवा की मौखिक खुराक दें। पशुओं को लू से बचाएं। पशुओं को अच्छी गुणवत्ता वाला पेयजल उपलब्ध करावें। तेज़ हवा की गति को देखते हुए अपने आप को और जानवरों को पुराने/क्षयग्रस्त आश्रयों और दीवारों से दूर रखें।	

ज़िला: जैसलमेर

फसल	अवस्था	विवरण	कृषि सलाह
मूंगफली	फली का बनना	सूक्ष्म और गोण पोषक तत्वों का प्रयोग	मूंगफली की फसल में सुझा बनाए और फली भरने की अवस्था के दौरान फसल की नियमित रूप से सिंचाई करें।
बाजरा	दाने का बनना	सिंचाई	बेहतर दाने बनने के लिए फसल की सिंचाई करें।
कपास	फूल की कली/स्केयर का बनना	सिंचाई/छिड़काव	कपास में रस चूसने वाले कीटों को नियंत्रित करने के लिए इमिडाक्लोप्रिड 0.3 मिली/लीटर या थियोमेथोक्सम 0.3 ग्राम/लीटर या एसिटामिप्रिड 0.4 मिली/लीटर या थियोक्लोप्रिड 1.0 मिली/लीटर या डाइफेन्थुरोन 2 ग्राम/लीटर पानी के साथ छिड़काव करें।
ग्वार, तिल एवं मोठ	फूल आना	रस चूसने वाले कीटों का नियंत्रण	रस चूसने वाले कीटों (थ्रिप्स) की रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड 0.3 मिली/लीटर या थियोमेथोक्सम 0.3 ग्राम/लीटर या डाइमेथोएट 1.5 मिली/लीटर पानी का छिड़काव करें।
उद्यानिकी		सिंचाई	उद्यानिकी फल फसलों जैसे खजूर, किन्नो, संतरा व नींबू की समय पर सिंचाई करें।
चारागाह		चराई	बारी-बारी से चराना या आंशिक रूप से चराना प्रबंधन का एक बेहतर तरीका है।
पशुधन		स्वास्थ्य प्रबंधन	दुधारू पशुओं में स्तनदाह से बचाव के उपाय अपनाएं। पेट के कीड़ों की दवा की मौखिक खुराक दें। पशुओं को लू से बचाएं। पशुओं को अच्छी गुणवत्ता वाला पेयजल उपलब्ध कराएं। तेज़ हवा की गति को देखते हुए अपने आप को और जानवरों को पुराने/क्षयग्रस्त आश्रयों और दीवारों से दूर रखें।

iv. AMFU फतेहपुर

ज़िला: सीकर / झुंझु / नागौर

सामान्य सलाहकार:

net.imd.gov.in/index.php/District_advisory/pdf_reg_district_advisory?states=8&district=103

PM

Regional Advisory

आने वाले दिनों में जिले में कुछ जगहों पर मध्यम बारिश के साथ आंधी-तूफान, बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। बादल छाए रहने और अधिक नमी के कारण फसलों में कीड़े-मकोड़ों और फंगल बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने खेतों की नियमित निगरानी करें और जरूरत पड़ने पर कीड़ों और बीमारियों के प्रबंधन के लिए सुझाए गए तरीकों को अपनाएं। खरपतवार को नियंत्रित करने, मिट्टी में हवा का संचार बेहतर करने और जल-जमाव से बचने के लिए समय पर निराई-गुड़ाई और अन्य जरूरी कृषि कार्य करें। मिट्टी में पर्याप्त नमी होने पर फसल के लिए बताई गई मात्रा में खाद डालें। बागों की अच्छी तरह देखभाल करें और तेज हवाओं से बचाने के लिए छोटे पौधों को सहारा दें। भविष्य में इस्तेमाल के लिए बारिश के पानी की हर बूंद को बचाकर रखें।

लघु संदेश सलाहकार:

आने वाले दिनों में मध्यम बारिश की संभावना है चेतावनी के समय एग्रो-केमिकल का इस्तेमाल न करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
बाजरा	बाजरे की फसल में अर्गट रोग लगने की संभावना है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे फसल की नियमित निगरानी करें और यदि रोग के लक्षण दिखाई दें, तो ज़िनेब (2.5 किग्रा/हेक्टेयर) या मैकोज़ेब (2 किग्रा/हेक्टेयर) का छिड़काव करें। पौधों की सुरक्षा के लिए अनुशंसित तरीकों के अनुसार, 3 दिन के अंतराल पर 2-3 बार छिड़काव दोहराएं।
मूँग	किसानों को सलाह दी जाती है कि वे मूँग की फसल में फली छेदक कीट के हमले की नियमित निगरानी करें। यदि कीट का हमला दिखाई दे, तो मौसम की अनुकूल स्थितियों में सुबह या शाम के समय किनालफॉस 25 EC (1 लीटर/हेक्टेयर) का छिड़काव करें।
तिल	किसानों को सलाह दी जाती है कि वे तिल की खड़ी फसल में पत्ती और कैप्सूल छेदक कीट के हमले की नियमित निगरानी करें। यदि कीट का हमला दिखाई दे, तो फूल और कैप्सूल बनने की अवस्था में 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से किनालफॉस 25 EC का छिड़काव करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
अनार	किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अनार के बागों में फ्रूट बोरर, एफिड्स, थ्रिप्स और फंगल बीमारियों की नियमित रूप से निगरानी करें, खासकर नमी वाले मौसम में। पानी की सही निकासी की व्यवस्था करें और पौधों के आस-पास पानी जमा न होने दें। फसल की अवस्था के अनुसार पर्याप्त सिंचाई और संतुलित पोषण दें।
खीरा	किसानों को सलाह दी जाती है कि खीरे में फ्रूट बोरर (फल छेदक कीट) को नियंत्रित करने के लिए प्रभावित फलों को हटा दें और उन्हें मिट्टी में गहराई में दबा दें। साथ ही, प्रति लीटर पानी में 1.0 मिली मैलाथियान 50 EC का छिड़काव करें।
टमाटर	किसानों को सलाह दी जाती है कि वे टमाटर की फसल में सफेद मक्खी (व्हाइटफ्लाई) के हमले पर लगातार नज़र रखें। व्हाइटफ्लाई को नियंत्रित करने के लिए, हमला दिखने पर पौधों की सुरक्षा के सुझाए गए तरीकों का पालन करते हुए, प्रति लीटर पानी में 1.0 मिली मैलाथियान 50% EC का छिड़काव करें।
मिर्च	मिर्च के वायरस रोग से संक्रमित पौधों को उखाड़कर ज़मीन में गाड़ दें। इसके बाद, अगर संक्रमण ज़्यादा हो, तो मौसम साफ़ होने पर 0.3 मिली प्रति लीटर की दर से इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव करें।
गेंदे का फूल	किसानों को सलाह दी जाती है कि वे फूलों के खेतों में पानी जमा होने से रोकने के लिए पानी की सही निकासी का इंतज़ाम करें। बारिश के दौरान सिंचाई और छिड़काव न करें, खराब या बीमारी वाले फूलों और पौधों के हिस्सों को हटा दें, और मौसम साफ़ होने के बाद फंगल बीमारियों और कीड़ों के लिए

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	किसानों को सलाह दी जाती है कि वे नवजात बछड़ों को बारिश और नमी से बचाने के लिए उन्हें साफ़, सूखे, हवादार और पानी से सुरक्षित (लीक-प्रूफ) आश्रय में रखें। समय पर खीस (कोलोस्ट्रम) पिलाना सुनिश्चित करें, साफ़ पीने का पानी दें, उनके सोने की जगह को सूखा रखें और बछड़ों को ठंडी हवाओं

md.gov.in/index.php/District_advisory/pdf_reg_district_advisory?states=8&district=103

2/3

Regional Advisory

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
	से बचाएं। कमज़ोरी, दस्त या सांस लेने में तकलीफ़ जैसे लक्षणों के लिए उन पर नियमित रूप से नज़र रखें और ज़रूरत पड़ने पर पशु चिकित्सक से सलाह लें।
भेड़	किसानों को सलाह दी जाती है कि वे ऊन देने वाली भेड़ों को बारिश और नमी से बचाने के लिए उन्हें साफ़, सूखे, हवादार और पानी से सुरक्षित (लीक-प्रूफ) बाड़ों में रखें। उन्हें संतुलित आहार और साफ़ पीने का पानी दें, उनकी ऊन और बिछावन को जितना हो सके सूखा रखें, और बाहरी परजीवियों व त्वचा के संक्रमण के लिए जानवरों की नियमित जाँच करें। जानवरों के स्वास्थ्य और अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन सुनिश्चित करने के लिए साफ़-सफ़ाई बनाए रखें और समय पर डीवॉर्मिंग (पेट के कीड़े निकालने की दवा देना) व पशु चिकित्सा संबंधी देखभाल करें।

मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह:

मुर्गी पालन	मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह
कड़कनाथ	कड़कनाथ पक्षियों को पालने वाले किसानों को सलाह दी जाती है कि वे उन्हें पर्याप्त प्रोटीन, विटामिन और मिनरल वाला संतुलित आहार दें और साथ ही साफ़ पीने का पानी भी हमेशा उपलब्ध कराएं। दिन के समय तापमान बढ़ने पर, उन्हें पर्याप्त छाया और साफ़, सूखे व हवादार रहने की जगह दें। बहुत ज्यादा भीड़ न होने दें, साफ़-सफ़ाई और बायो-सिक्योरिटी का ध्यान रखें, और बेहतर विकास व उत्पादन के लिए बताए गए टीकाकरण शेड्यूल का पालन करें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

तूफ़ान, बिजली कड़कने और तेज़ हवाओं से ट्रांसपोर्ट, बिजली की सप्लाई और खेती-बाड़ी के रोज़मर्रा के कामों में रुकावट आ सकती है। तेज़ हवाओं और खराब मौसम की वजह से बागवानी वाली फ़सलों में फल झड़ने, फल फटने और टहनियाँ टूटने जैसी समस्याएँ हो सकती हैं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

तूफ़ान के दौरान अकेले खड़े पेड़ों, बिजली के खंभों, मोबाइल टावरों या धातु की बनी अन्य चीज़ों के नीचे शरण लेने से बचें। घर के अंदर रहें और खुले मैदानों, जलाशयों और ऐसी ही अन्य खुली जगहों से दूर रहें।

सामान्य सलाहकार:

आने वाले दिनों में जिले में कुछ जगहों पर मध्यम बारिश के साथ आंधी-तूफान, बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। बादल छाए रहने और अधिक नमी के कारण फसलों में कीड़े-मकोड़ों और फंगल बीमारियों

t.umd.gov.in/index.php/District_advisory/pdf_reg_district_advisory?states=8&district=112

M

Regional Advisory

का खतरा बढ़ सकता है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने खेतों की नियमित निगरानी करें और जरूरत पड़ने पर कीड़ों और बीमारियों के प्रबंधन के लिए सुझाए गए तरीकों को अपनाएं। खरपतवार को नियंत्रित करने, मिट्टी में हवा का संचार बेहतर करने और जल-जमाव से बचने के लिए समय पर निराई-गुड़ाई और अन्य जरूरी कृषि कार्य करें। मिट्टी में पर्याप्त नमी होने पर फसल के लिए बताई गई मात्रा में खाद डालें। बागों की अच्छी तरह देखभाल करें और तेज हवाओं से बचाने के लिए छोटे पौधों को सहारा दें। भविष्य में इस्तेमाल के लिए बारिश के पानी की हर बूंद को बचाकर रखें।

फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
बाजरा	बाजरे की फसल में अर्गट रोग लगने की संभावना है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे फसल की नियमित निगरानी करें और यदि रोग के लक्षण दिखाई दें, तो ज़िनेब (2.5 किग्रा/हेक्टेयर) या मैकोज़ेब (2 किग्रा/हेक्टेयर) का छिड़काव करें। पौधों की सुरक्षा के लिए अनुशंसित तरीकों के अनुसार, 3 दिन के अंतराल पर 2-3 बार छिड़काव दोहराएं।
मूंग	किसानों को सलाह दी जाती है कि वे मूंग की फसल में फली छेदक कीट के हमले की नियमित निगरानी करें। यदि कीट का हमला दिखाई दे, तो मौसम की अनुकूल स्थितियों में सुबह या शाम के समय क्तिनालफॉस 25 EC (1 लीटर/हेक्टेयर) का छिड़काव करें।
तिल	किसानों को सलाह दी जाती है कि वे तिल की खड़ी फसल में पत्ती और कैप्सूल छेदक कीट के हमले की नियमित निगरानी करें। यदि कीट का हमला दिखाई दे, तो फूल और कैप्सूल बनने की अवस्था में 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से क्तिनालफॉस 25 EC का छिड़काव करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
अनार	किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अनार के बागों में फ्रूट बोरर, एफिड्स, थ्रिप्स और फंगल बीमारियों की नियमित रूप से निगरानी करें, खासकर नमी वाले मौसम में। पानी की सही निकासी की व्यवस्था करें और पौधों के आस-पास पानी जमा न होने दें। फसल की अवस्था के अनुसार पर्याप्त सिंचाई और संतुलित पोषण दें।
खीरा	किसानों को सलाह दी जाती है कि खीरे में फ्रूट बोरर (फल छेदक कीट) को नियंत्रित करने के लिए प्रभावित फलों को हटा दें और उन्हें मिट्टी में गहराई में दबा दें। साथ ही, प्रति लीटर पानी में 1.0 मिली मैलाथियान 50 EC का छिड़काव करें।
टमाटर	किसानों को सलाह दी जाती है कि वे टमाटर की फसल में सफेद मक्खी (व्हाइटफ्लाई) के हमले पर लगातार नज़र रखें। व्हाइटफ्लाई को नियंत्रित करने के लिए, हमला दिखने पर पौधों की सुरक्षा के सुझाए गए तरीकों का पालन करते हुए, प्रति लीटर पानी में 1.0 मिली मैलाथियान 50% EC का छिड़काव करें।
मिर्च	मिर्च के वायरस रोग से संक्रमित पौधों को उखाड़कर ज़मीन में गाड़ दें। इसके बाद, अगर संक्रमण ज्यादा हो, तो मौसम साफ़ होने पर 0.3 मिली प्रति लीटर की दर से इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव करें।
गेंदे का फूल	किसानों को सलाह दी जाती है कि वे फूलों के खेतों में पानी जमा होने से रोकने के लिए पानी की सही निकासी का इंतज़ाम करें। बारिश के दौरान सिंचाई और छिड़काव न करें, खराब या बीमारी वाले फूलों और पौधों के हिस्सों को हटा दें, और मौसम साफ़ होने के बाद फंगल बीमारियों और कीड़ों के लिए फसलों की नियमित रूप से जांच करें।

v. AMFU जयपुर

ज़िला:जयपुर/ अजमेर/ दौसा/टोंक		
आम सलाह	वर्षा की संभावना होने या वर्षा के दौरान कीटनाशकों का छिड़काव न करें।	
मुख्य फसल	स्थिति/अवस्था/	सलाह
बाजरे		बाजरा की फसल को अरगट रोग से बचाने के लिए जाइनेब 2.5 किलोग्राम या मैकोजेब 2.0 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 3-3 दिन के अंतराल पर 2-3 बार छिड़काव करें।
ग्वार		खड़ी फसल में जड़ और तना सड़न तथा जीवाणु झूलसा रोग के लक्षणों की नियमित रूप से निगरानी करें, विशेषकर नमी और बारिश वाले मौसम में। यदि जीवाणु झूलसा रोग के लक्षण दिखाई दें, तो कॉपर हाइड्रॉक्साइड का 0.2% घोल बनाकर छिड़काव करें। यदि जड़ और तना सड़न के लक्षण दिखाई दें, तो मैनकोजेब @ 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से जड़ों के आसपास की मिट्टी में घोल डालें।
अनार		अनार में विल्ट रोग (उकठा रोग) के प्रभावी नियंत्रण के लिए, 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी को 2 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद (काउ डंग कंपोस्ट) में अच्छी तरह मिलाकर प्रति पौधे की दर से दें।
तिल		तिल की फसल में पत्ती और फली वेधक (लीफ एंड कैप्सूल बोरर) कीट का प्रकोप होने की संभावना रहती है। इस कीट के प्रभावी नियंत्रण के लिए, फूल आने और फली बनने की अवस्था में क्विनालफॉस 25 ई.सी. (Quinalphos 25 EC) का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें।
अमरूद		अमरूद की फसल में फल सड़ने की समस्या हो सकती है। इसमें फलों पर पहले सफेद धब्बे दिखाई देते हैं और बाद में फल सड़ने लगते हैं। इस रोग से बचाव के लिए मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।
भिंडी		भिंडी की फसल में पीला मोजेक रोग के प्रकोप की संभावना रहती है। रोगग्रस्त पौधों की पत्तियाँ कटोरीनुमा होकर पीली पड़ जाती हैं। यह रोग मुख्यतः सफेद मक्खी द्वारा फैलता है। रोकथाम के लिए फूल आने से पहले तथा फूल आने के बाद मैलाथियान 50 ईसी @ 1.0 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।
टमाटर, मिर्च, बैंगन एवं		टमाटर, मिर्च एवं बैंगन के फलों की नियमित तुड़ाई करें। बादलयुक्त एवं आर्द्र मौसम में फल छेदक एवं फल मक्खी के प्रकोप की नियमित निगरानी करें। कीटग्रस्त फलों को तोड़कर नष्ट कर दें, ताकि कीटों का फैलाव कम किया जा सके। खेत में जलभराव से बचने के लिए उचित जल निकासी की व्यवस्था रखें तथा वर्षा या प्रतिकूल मौसम के दौरान कीटनाशकों का छिड़काव न करें।
दुधारू पशु		वर्षा एवं अधिक नमी वाले मौसम में पशुओं को रोगों से बचाने के लिए उन्हें साफ, सूखे एवं हवादार स्थान पर रखें। पशुओं को नियमित रूप से स्वच्छ एवं ताजा पेयजल उपलब्ध कराएं। हरे चारे एवं पशु आहार को नमी तथा फफूंद से बचाने के लिए सूखे स्थान पर सुरक्षित रखें। पशुशाला की नियमित सफाई करें तथा जलभराव से बचाव के लिए उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य, तनाव कम करने एवं उत्पादन बढ़ाने के लिए उनके आहार में मिनरल मिक्सचर

(खनिज मिश्रण) एवं इलेक्ट्रोलाइट्स को शामिल करें।

vi. AMFU भरतपुर

ज़िला: भरतपुर/ अलवर/ सवाईमाधोपुर

सामान्य सलाहकार:

सभी खेतों में, खासकर सब्जियों की नर्सरी में, उचित जल निकासी बनाए रखें। जलभराव को रोकने के लिए खासकर भारी बारिश होने पर, खेतों में उचित जल निकासी सुनिश्चित करें। बारिश से होने वाले नुकसान से बचने के लिए बीजों की क्यारियों का विशेष ध्यान रखें और सही समय पर पौधे रोपें। भारी बारिश के दौरान उर्वरक डालने से बचें। यदि आवश्यक हो, तो बारिश थमने के बाद हल्की मात्रा में उर्वरक डालें। उच्च आर्द्रता के कारण

होने वाले फफूंद जनित रोगों जैसे कि ब्लाइट और डाउनीफफूंद की निगरानी करें। बिजली गिरने और तूफान के दौरान जानवरों को आश्रय दें।

लघु संदेश सलाहकार:

अगले सप्ताह हल्की से मध्यम बारिश वर्षा होने की संभावना है। कृषि रसायनों का प्रयोग आसमान खुलने पर ही करें।

फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
बाजरा	सफेद ग्रब प्रबंधन के लिए लैम्बडा-साइहेलोथ्रिन + थियामेथोक्सम 500 मिली रेत के साथ मिक्स और एक हेक्टेयर में बुरकाव करें। ग्रास हॉपर (फड़का) प्रबंधन के लिए किनोलफोस 1.5% या फेनबलरेट का 0.4% धूल 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव करें या साइपरमेथ्रिन 5% 1 मिली की दर से प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें।
काला चना	उड़द में ब्लिस्टर बीटल के नियंत्रण के लिए साइपरमेथ्रिन 0.5 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
नींबू	भिंडी की फसल में मोज़ेक रोग के लक्षण दिखाई देते ही डाइफेन्थुरान 50 डब्ल्यूपी @ 1.0 ग्राम प्रति लीटर पानी या एसिटामिप्रिड 20 एसपी 0.2 ग्राम प्रति लीटर पानी 15 दिनों के अंतराल पर तुरंत छिड़काव करें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

तूफान, बिजली कड़कने और तेज़ हवाओं के कारण ट्रांसपोर्ट, बिजली सप्लाई और रोज़मर्रा के खेती-बाड़ी के कामों में रुकावट। फलों के फटने, टहनियों के टूटने और फलों के गिरने से बागवानी की फसलों को नुकसान।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

तेज़ हवाओं और बिजली कड़कने के दौरान खुद को और अपने पशुओं को सुरक्षित रखें। कमज़ोर ढाँचों, इमारतों और पेड़ों के पास न खड़े हों।

ज़िला: धौलपुर / करौली

सामान्य सलाहकार:

सभी खेतोंमें, खासकर सब्जियों की नर्सरी में, उचित जल निकासी बनाए रखें। जलभराव को रोकने के लिए खासकर भारी बारिश होनेपर, खेतों में उचित जल निकासी सुनिश्चित करें। बारिश से होने वाले नुकसान से बचनेकेलिए बीजों की क्यारियों का विशेष ध्यान रखें और सही समय पर पौधे रोपें। भारी बारिश के दौरान उर्वरक डालने से बचें। यदि आवश्यक हो, तो बारिश धमनेकेबाद हल्की मात्रा में उर्वरक डालें। उच्च आर्द्रताके कारण

होनेवाले फफूंद जनित रोगों जैसेकि ब्लाइट और डाउनीफफूंद की निगरानीकरें। बिजलीगिरनेऔर तूफान के दौरान जानवरोंको आश्रय दें।

लघु संदेश सलाहकार:

अगले सप्ताह हल्की से मध्यम बारिश वर्षा होने की संभावना है। कृषि रसायनों का प्रयोग आसमान खुलने पर ही करें।

फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
बाजरा	सफेद श्रब प्रबंधन के लिए लेम्बडा-साइहेलीथिन + थियामेथोक्सम 500 मिली रेत के साथ मिक्स और एक हेक्टेयर में बुरकाव करें। ग्रास हॉपर (फड़का) प्रबंधन के लिए क्लिनोलफोस 1.5% या फेनबलरेट का 0.4% घुल 2.5 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव करें या साइपरमेथिन 5% 1 मिलीकीदर से प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें।
काला चना	उड़द में ब्लिस्टर बीटल के नियंत्रण के लिए साइपरमेथिन 0.5 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
नींबू	भिंडी की फसल में मोज़ेक रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। डाइफेन्थुरान 50 डब्ल्यूपी @ 1.0 ग्राम प्रतिलीटर पानी या एसिटागिप्रिड 20 एसपी 0.2 ग्राम प्रतिलीटर पानी 15 दिनों के अंतराल पर तुरंत छिड़काव करें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

तूफान, बिजली कड़कने और तेज़ हवाओं के कारण ट्रांसपोर्ट, बिजली सप्लाई और रोज़मर्रा के खेती-बाड़ी के कामों में रुकावट। फलों के फटने, टहनियों के टूटने और फलों के गिरने से बागवानी की फसलों को नुकसान।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

तेज़ हवाओं और बिजली कड़कने के दौरान खुद को और अपने पशुओं को सुरक्षित रखें। कमज़ोर ढाँचों, इमारतों और पेड़ों के पास न खड़े हों।

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on

सामान्य सलाहकार:

सभी खेतों में, खासकर सब्जियों की नर्सरी में, उचित जल निकासी बनाए रखें। जलभराव को रोकने के लिए खासकर भारी बारिश होने पर, खेतों में उचित जल निकासी सुनिश्चित करें। बारिश से होने वाले नुकसान से बचने के लिए बीजों की क्यारियों का विशेष ध्यान रखें और सही समय पर पीछे रोपें। भारी बारिश के दौरान उर्वरक डालने से बचें। यदि आवश्यक हो, तो बारिश थमने के बाद हल्की मात्रा में उर्वरक डालें। उच्च आर्द्रता के कारण

होने वाले फफूंद जनित रोगों जैसे कि ब्लाइट और डाउनीफफूंद की निगरानी करें। बिजली गिरने और तूफान के दौरान जानवरों को आश्रय दें।

लघु संदेश सलाहकार:

अगले सप्ताह हल्की से मध्यम बारिश वर्षा होने की संभावना है। कृषि रसायनों का प्रयोग आसमान खुलने पर ही करें।

फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
बाजरा	सफेद ग्रब प्रबंधन के लिए लैम्बडा-साइहैलोथ्रिन + थियामेथोक्सम 500 मिली रेत के साथ मिक्स और एक हेक्टेयर में बुरकाव करें। ग्रास हॉपर (फड़का) प्रबंधन के लिए किनोलफोस 1.5% या फेनबलरेट का 0.4% धूल 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव करें या साइपरमेथ्रिन 5% 1 मिली की दर से प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें।
काला चना	उड़द में ब्लिस्टर बीटल के नियंत्रण के लिए साइपरमेथ्रिन 0.5 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
नींबू	भिंडी की फसल में मोज़ेक रोग के लक्षण दिखाई देते ही डाइफेन्थुरान 50 डब्ल्यूपी @ 1.0 ग्राम प्रति लीटर पानी या एसिटामिप्रिड 20 एसपी 0.2 ग्राम प्रति लीटर पानी 15 दिनों के अंतराल पर तुरंत छिड़काव करें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

तूफान, बिजली कड़कने और तेज़ हवाओं के कारण ट्रांसपोर्ट, बिजली सप्लाई और रोज़मर्रा के खेती-बाड़ी के कामों में रुकावट। फलों के फटने, टहनियों के टूटने और फलों के गिरने से बागवानी की फसलों को नुकसान।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

तेज़ हवाओं और बिजली कड़कने के दौरान खुद को और अपने पशुओं को सुरक्षित रखें। कमज़ोर ढाँचों, इमारतों और पेड़ों के पास न खड़े हों।

vii. AMFU उदयपुर

ज़िला: उदयपुर / भीलवाड़ा / चित्तौड़गढ़/ राजसमंद/ प्रतापगढ़

वर्तमान मौसम की स्थिति में किसानों को मूंग और उड़द की फसलों की नियमित रूप से निगरानी करने की सलाह दी जाती है, अगर सफेद मक्खियों या रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप अधिक होने पर इमिडाक्लोप्रिड 17.8 प्रतिशत एससी का 1.0 मिलीलीटर / 3 लीटर पानी की दर से आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें।

लघु संदेश सलाहकार:

कीटनाशी का प्रयोग केवल आर्थिक क्षति स्तर के आसपास प्रकोप होने पर करें।

फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
मक्का	फॉल आर्मी वर्म के नियंत्रण के लिए मक्का में इमामेक्टिन बेन्जोएट 5 एस जी 0.4 ग्राम प्रति लीटर, पानी का छिड़काव करें। छिड़काव आसमान साफ होने पर करें।
कपास	कपास में पौधों की सुरक्षा के उपायों से बचें। कीटों की निगरानी करते रहें।, यदि कीटों का प्रकोप अधिक हो तो कीटों के नियंत्रण के लिए खेतों में कीट विशिष्ट फेरोमोन जाल लगाने की सलाह दी जाती है।
सोयाबीन	सोयाबीन में गर्डल बीटल का प्रकोप दिखाई देने पर एसीफेट 75 एस.पी. एक ग्राम/लीटर अथवा ट्राइएजोफॉस 40 ई.सी. एक मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से 20-20 दिन के अन्तराल पर छिड़काव करें।
मूँगफली	फसल में पीलीया रोग की रोकथाम हेतु 0.5 प्रतिशत फेरस सल्फेट का घोल बनाकर छिड़काव करें।

पशुपालन विशेष सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	बछड़े और दुधारू पशुओं को सूखे स्थानों पर बांधें। बरसात के मौसम में पशुओं में दस्त होने की संभावना होती है इसलिए, पशुओं को दस्त से बचाने के लिए, सूखा चारा खिलायें। लम्पी स्किन वायरल बीमारी है जो आर्थ्रोपोड फेमिली के मच्छर के काटने से होती है, जिसमें शुरू में 2 से 3 दिनों तक हल्का बुखार होता है। बीमारी में मुंह, गले एवं श्वसन तंत्र में छाले, कमजोरी, दूध में कमी, गर्भपात तथा ज्यादा बीमारी में पशु की मृत्यु भी हो सकती है। उपचार- बीमारी की स्थिति में पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें तथा बुखार की स्थिति में पशु को मेल्फेक्विन और पैरासिटामोल दें तथा शरीर पर एंटीसेप्टिक मलहम का प्रयोग करें तथा मल्टीविटामिन दें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

खेत में नमी की कमी दिखाई देने पर जीवन रक्षक सिंचाई करें।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

मौसम संबंधी जानकारी लेते रहें और उसके अनुसार कृषि कार्यों की योजना बनाएं।

वर्तमान मौसम की स्थिति में किसानों को मूंग और उड़द की फसलों की नियमित रूप से निगरानी करने की सलाह दी जाती है, अगर सफेद मक्खियों या रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप अधिक होने पर इमिडाक्लोप्रिड 17.8 प्रतिशत एससी का 1.0 मिलीलीटर / 3 लीटर पानी की दर से आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें।

लघु संदेश सलाहकार:

कीटनाशी का प्रयोग केवल आर्थिक क्षति स्तर के आसपास प्रकोप होने पर करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मक्का	फॉल आर्मी वर्म के नियंत्रण के लिए मक्का में इमामेक्टिन बेन्जोएट 5 एस जी 0.4 ग्राम प्रति लीटर, पानी का छिड़काव करें। छिड़काव आसमान साफ होने पर करें।
कपास	कपास में पौधों की सुरक्षा के उपायों से बचें। कीटों की निगरानी करते रहे।, यदि कीटों का प्रकोप अधिक हो तो कीटों के नियंत्रण के लिए खेतों में कीट विशिष्ट फेरोमोन जाल लगाने की सलाह दी जाती है।
सोयाबीन	सोयाबीन में गर्डल बीटल का प्रकोप दिखाई देने पर एसीफेट 75 एस.पी. एक ग्राम/लीटर अथवा ट्राइएजोफॉस 40 ई.सी. एक मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से 20-20 दिन के अन्तराल पर छिड़काव करें।
मैंगफली	फसल में पीलीया रोग की रोकथाम हेतु 0.5 प्रतिशत फेरस सल्फेट का घोल बनाकर छिड़काव करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	बछड़े और दुधारू पशुओं को सूखे स्थानों पर बांधें। बरसात के मौसम में पशुओं में दस्त होने की संभावना होती है इसलिए, पशुओं को दस्त से बचाने के लिए, सूखा चारा खिलाये। लम्पी स्किन वायरल बीमारी है जो आर्थ्रोपोड फेमिली के मच्छर के काटने से होती है, जिसमें शुरू में 2 से 3 दिनों तक हल्का बुखार होता है। बीमारी में मुंह, गले एवं श्वसन तंत्र में छाले, कमजोरी, दूध में कमी, गर्भपात तथा ज्यादा बीमारी में पशु की मृत्यु भी हो सकती है। उपचार- बीमारी की स्थिति में पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें तथा बुखार की स्थिति में पशु को मेलॉक्सिकैम और पैरासिटामोल दें तथा शरीर पर एन्टीसेप्टिक मलहम का प्रयोग करें तथा मल्टीविटामिन दें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

खेत में नमी की कमी दिखाई देने पर जीवन रक्षक सिंचाई करें।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

मौसम संबंधी जानकारी लेते रहें और उसके अनुसार कृषि कार्यों की योजना बनाएं।

वर्तमान मौसम की स्थिति में किसानों को मूंग और उड़द की फसलों की नियमित रूप से निगरानी करने की सलाह दी जाती है, अगर सफेद मक्खियों या रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप अधिक होने पर इमिडाक्लोप्रिड 17.8 प्रतिशत एससी का 1.0 मिलीलीटर / 3 लीटर पानी की दर से आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें।

लघु संदेश सलाहकार:

कीटनाशी का प्रयोग केवल आर्थिक क्षति स्तर के आसपास प्रकोप होने पर करें।

फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
मक्का	फॉल आर्मी वर्म के नियंत्रण के लिए मक्का में इमामेक्टिन बेन्जोएट 5 एस जी 0.4 ग्राम प्रति लीटर, पानी का छिड़काव करें। छिड़काव आसमान साफ होने पर करें।
कपास	कपास में पौधों की सुरक्षा के उपायों से बचें। कीटों की निगरानी करते रहें।, यदि कीटों का प्रकोप अधिक हो तो कीटों के नियंत्रण के लिए खेतों में कीट विशिष्ट फेरोमोन जाल लगाने की सलाह दी जाती है।
मूंगफली	फसल में पीलीया रोग की रोकथाम हेतु 0.5 प्रतिशत फेरस सल्फेट का घोल बनाकर छिड़काव करें।
सोयाबीन	सोयाबीन में गर्डल बीटल का प्रकोप दिखाई देने पर एसीफेट 75 एस.पी. एक ग्राम/लीटर अथवा ट्राइएजोफॉस 40 ई.सी. एक मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से 20-20 दिन के अन्तराल पर छिड़काव करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	बछड़े और दुधारू पशुओं को सूखे स्थानों पर बांधें। बरसात के मौसम में पशुओं में दस्त होने की संभावना होती है इसलिए, पशुओं को दस्त से बचाने के लिए, सूखा चारा खिलायें। लम्पी स्किन वायरल बीमारी है जो आर्थ्रोपोड फेमिली के मच्छर के काटने से होती है, जिसमें शुरू में 2 से 3 दिनों तक हल्का बुखार होता है। बीमारी में मुंह, गले एवं श्वसन तंत्र में छाले, कमजोरी, दूध में कमी, गर्भपात तथा ज्यादा बीमारी में पशु की मृत्यु भी हो सकती है। उपचार- बीमारी की स्थिति में पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें तथा बुखार की स्थिति में पशु को मेलाक्सिकैम और पैरासिटामोल दें तथा शरीर पर एन्टीसेप्टिक मलहम का प्रयोग करें तथा मल्टीविटामिन दें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

खेत में नमी की कमी दिखाई देने पर जीवन रक्षक सिंचाई करें।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

मौसम संबंधी जानकारी लेते रहें और उसके अनुसार कृषि कार्यों की योजना बनाएं।

ज़िला: सिरोही

सामान्य सलाहकार:

वर्तमान मौसम की स्थिति में किसानों को मूंग और उड़द की फसलों की नियमित रूप से निगरानी करने की सलाह दी जाती है, अगर सफेद मक्खियों या रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप अधिक होने पर इमिडाक्लोप्रिड 17.8 प्रतिशत एससी का 1.0 मिलीलीटर / 3 लीटर पानी की दर से आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें।

लघु संदेश सलाहकार:

कीटनाशी का प्रयोग केवल आर्थिक क्षति स्तर के आसपास प्रकोप होने पर करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मक्का	फॉल आर्मी वर्म के नियंत्रण के लिए मक्का में इमामेक्टिन बेन्जोएट 5 एस जी 0.4 ग्राम प्रति लीटर, पानी का छिड़काव करें। छिड़काव आसमान साफ होने पर करें।
कपास	कपास में पौधों की सुरक्षा के उपायों से बचें। कीटों की निगरानी करते रहें।, यदि कीटों का प्रकोप अधिक हो तो कीटों के नियंत्रण के लिए खेतों में कीट विशिष्ट फेरोमोन जाल लगाने की सलाह दी जाती है।
मैंगफ़ली	फसल में पीलीया रोग की रोकथाम हेतु 0.5 प्रतिशत फेरस सल्फेट का घोल बनाकर छिड़काव करें।
सोयाबीन	सोयाबीन में गर्डल बीटल का प्रकोप दिखाई देने पर एसीफेट 75 एस.पी. एक ग्राम/लीटर अथवा ट्राइएन्जोफॉस 40 ई.सी. एक मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से 20-20 दिन के अन्तराल पर छिड़काव करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	बछड़े और दुधारू पशुओं को सूखे स्थानों पर बांधें। बरसात के मौसम में पशुओं में दस्त होने की संभावना होती है इसलिए, पशुओं को दस्त से बचाने के लिए, सूखा चारा खिलायें। लम्पी स्किन वायरल बीमारी है जो आर्थ्रोपोड फैमिली के मच्छर के काटने से होती है, जिसमें शुरू में 2 से 3 दिनों तक हल्का बुखार होता है। बीमारी में मुंह, गले एवं श्वसन तंत्र में छाले, कमजोरी, दूध में कमी, गर्भपात तथा ज्यादा बीमारी में पशु की मृत्यु भी हो सकती है। उपचार- बीमारी की स्थिति में पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें तथा बुखार की स्थिति में पशु को मेल्फेक्विन और पैरासिटामोल दें तथा शरीर पर एन्टीसेप्टिक मलहम का प्रयोग करें तथा मल्टीविटामिन दें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

खेत में नमी की कमी दिखाई देने पर जीवन रक्षक सिंचाई करें।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

मौसम संबंधी जानकारी लेते रहें और उसके अनुसार कृषि कार्यों की योजना बनाएं।

viii. AMFU बाँसवाड़ा

ज़िला:बाँसवाड़ा / डूंगरपुर

सामान्य सलाहकार:

धान की रोपाई का काम पूरा करें। कपास, ऊँचे इलाकों में उगाए जाने वाले धान और मक्का (मक्का में मंजरियाँ निकलने के समय) में नाइट्रोजन खाद डालें। खरपतवार हटाने और कीटों से बचाव का उचित प्रबंध करें।

धान की रोपाई का काम पूरा करें। कपास, ऊँचे इलाकों में उगाए जाने वाले धान और मक्का (मक्का में मंजरियाँ निकलने के समय) में नाइट्रोजन खाद डालें। खरपतवार हटाने और कीटों से बचाव का उचित प्रबंध करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मक्का	फॉल आर्मीवर्म और बीमारियों/कीटों को नियंत्रित करने के लिए ज़रूरत-आधारित तरीके अपनाएं।
सोया बीन	स्टेम फ्लाई और येलो मोज़ेक वायरस से बचाव: स्टेम फ्लाई (जिसके हमले के 5-7 दिन बाद पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं) के लिए, डाइमैथोएट 30% EC (1.0 लीटर/हेक्टेयर) या प्रोफेनोफोस 50% EC (2 मिली/लीटर पानी या 1.25 लीटर/हेक्टेयर) का छिड़काव करें। व्हाइटफ्लाई और येलो मोज़ेक वायरस के लिए, थियामेथोक्सम 25% WG (100 ग्राम/हेक्टेयर) या पहले से मिश्रित थियामेथोक्सम + लैम्ब्डा-साइहेलोथ्रिन (125 मिली/हेक्टेयर) का छिड़काव करें और प्रति हेक्टेयर 12-15 पीले स्टिकी ट्रैप लगाएं। सेमीलुपर और व्हाइटफ्लाई के लिए, निम्बेसिडिन/निम्बिडिन (3 मिली/लीटर पानी) का छिड़काव करें। टोबैको कैटरपिलर और पत्तियों को खाने वाले कीड़ों के लिए, इंडोक्साकार्ब (350 मिली/हेक्टेयर) या क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 18.5 SC (150 मिली/हेक्टेयर) का छिड़काव करें।
कपास	खेतों में कपास की फसल की जाँच करें और पौधों की संख्या बनाए रखने की कोशिश करें। कपास के खेत को खरपतवार-मुक्त रखें। मिलीबग के हमले को रोकने के लिए, 1.25 लीटर/हेक्टेयर की दर से प्रोफेनोफोस 50 EC का छिड़काव करें। रस चूसने वाले कीटों (जैसिड/सफेद मक्खी) की रोकथाम के लिए, 300 मिलीलीटर/हेक्टेयर की दर से इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL या 1 लीटर/हेक्टेयर की दर से डाइमैथोएट 30 EC का छिड़काव करें। जहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहाँ बताए गए कीटनाशक को 100 किलोग्राम बजरी/रेत में मिलाकर खेत में फैला दें।
काला चना	यह सलाह 'येलो वेन मोज़ेक' (वायरल) बीमारी को नियंत्रित करने के लिए जारी की गई है। इसके लक्षणों में पत्तियों की नसों और पूरी पत्ती की सतह का पीला पड़ना और पौधे की बढ़त का रुकना शामिल है। शुरुआती लक्षण दिखने पर, पर्याप्त पानी में 1 लीटर/हेक्टेयर की दर से डाइमैथोएट 30% EC या 15 लीटर पानी (एक स्प्रे टैंक) में 5 मिली इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव करें। ज़रूरत पड़ने पर 15 दिन बाद दोबारा छिड़काव करें। वायरस फैलाने वाली सफेद मक्खियों को नियंत्रित करने के लिए, प्रति हेक्टेयर 12-15 'येलो स्टिकी ट्रैप' लगाएं। शांत मौसम (सुबह-सुबह या देर शाम) में सुरक्षात्मक कपड़े पहनकर छिड़काव करें।
चावल	खरपतवार पर नियंत्रण रखें और कीटों व बीमारियों के लिए नियमित रूप से निगरानी करें। खेत में फसल की ज़रूरत के अनुसार पानी का स्तर बनाए रखें। फसल की अवस्था के आधार पर बची हुई नाइट्रोजन को टॉप-ड्रेसिंग के तौर पर डालें और तना छेदक, पत्ती लपेटक कीट और ब्लास्ट बीमारी के लक्षणों पर बारीकी से नज़र रखें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
टमाटर	सफेद मक्खी के हमले से बचाव के लिए 1.0 मिलीलीटर मैलाथियान 50% EC प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भेस	बांसवाड़ा ज़िले में थाइलेरियोसिस (Theileriosis) काफ़ी ज़्यादा फैलने का खतरा है। जानवरों के शरीर, कान, गर्दन और पूंछ पर किलनी (ticks) की नियमित रूप से जाँच करें। अगर तेज़ बुखार, भूख कम लगना, दूध की पैदावार में कमी या लिम्फ नोड्स में सूजन जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत पशु चिकित्सक से सलाह लें और बीमार जानवर को अलग कर दें।
अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:	
अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
सामान्य सलाह	मिर्च, बैंगन और अगेती फूलगोभी की रोपाईं ऊंची क्यारियों पर करें। खेतों में पानी की सही निकासी और वर्षा जल संचयन की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

ix. AMFU कोटा

ज़िला:कोटा / बूंदी / झालावाड़ / बारां	
सामान्य सलाहकार:	
बारिश के दिनों में सिंचाई, केमिकल का छिड़काव और खाद डालने का काम टाल दें। नकदी फसलों और अनाज के खेतों में अतिरिक्त बारिश का पानी निकालने और जड़ों को सड़ने से बचाने के लिए पानी की निकासी के लिए सही रास्ते बनाएं। कटी हुई फसल को नमी से खराब होने से बचाने के लिए उसे शेड या सुरक्षित ढकी हुई जगहों पर रखें। पशुओं को सूखे शेड में रखकर और उनके चारे को नमी से बचाकर उनकी सुरक्षा करें।	

लघु सदश सलाहकार:

मध्यम से भारी बारिश, आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज़ हवाओं से फसलों को नुकसान हो सकता है। पानी की निकासी का इंतज़ाम करें, बारिश के दौरान छिड़काव या सिंचाई न करें और पशुओं को सुरक्षित रखें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	मध्यम बारिश के दौरान पानी की निकासी का सही इंतज़ाम करें ताकि लंबे समय तक जल-जमाव न हो। ज़रूरत से ज़्यादा सिंचाई न करें। भारी बारिश के बाद, फसल में पोषक तत्वों की कमी और कीट या बीमारी के हमले पर नज़र रखें। लगातार बारिश के दौरान नाइट्रोजन वाला खाद या पौधों की सुरक्षा के लिए रसायन न डालें।
सोयाबीन	सोयाबीन के खेतों में जल-जमाव से बचने के लिए जल निकासी की व्यवस्था करें। तेज़ हवाओं के कारण धनी फ़सल गिर सकती है। बारिश के बाद, फफूंद जनित रोगों और कीटों के हमले पर नज़र रखें। गीले मौसम में छिड़काव करने से बचें।
मक्का	भारी बारिश के बाद मक्के के खेतों से पानी निकालने का इंतज़ाम करें। तेज़ हवाओं से फ़सल गिर सकती है, खासकर लंबे पौधों के मामले में। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ सहारा दें और लंबे समय तक नमी वाले मौसम के बाद बीमारियों पर नज़र रखें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	ज़ोरदार बारिश और तूफ़ान के दौरान, गाय, भैंस, बकरी और भेड़ों को अच्छी जल-निकासी वाली ढकी हुई जगहों पर रखें। बिजली कड़कने के समय जानवरों को तालाबों, नहरों, खुले जलाशयों या अकेले खड़े पेड़ों के पास न रहने दें। उन्हें पीने के लिए साफ़ पानी और सूखा चारा दें। जानवरों के रहने की जगह पर पानी जमा न होने दें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

भारी बारिश, आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज़ हवाओं के कारण जल-जमाव, फसल के गिरने, मिट्टी के कटाव और खड़ी फसलों को नुकसान हो सकता है। बागवानी फसलों की टहनियां टूट सकती हैं और फल गिर सकते हैं। बिजली गिरने और तेज़ हवाओं से पशुओं पर भी असर पड़ सकता है।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

खेतों में पानी की निकासी का इंतज़ाम करें, बारिश के दौरान सिंचाई और छिड़काव न करें, गिरी हुई फ़सलों को सहारा दें और तूफ़ान के समय पशुओं को सुरक्षित आश्रय में रखें।

सामान्य सलाहकार:

5 और 6 सितंबर के बीच मध्यम बारिश, आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाओं की संभावना को देखते हुए, खेतों में पानी की निकासी का उचित इंतजाम करें और बारिश के दौरान सिंचाई या छिड़काव न करें। जहां भी संभव हो, तैयार फसलों की कटाई कर लें। बिजली कड़कने या गिरने के दौरान खेतों में काम न करें और किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। कटी हुई फसलों, खेती के औजारों, बागवानी के पौधों और पशुधन को बारिश और तेज हवाओं से बचाएं।

लघु संदेश सलाहकार:

बूंदी, झालावाड़ और कोटा में 5-6 सितंबर को मध्यम बारिश, आंधी-तूफान, बिजली चमकने और तेज हवाओं की संभावना है। पानी की निकासी का इंतजाम करें और बिजली चमकने के दौरान खेतों में काम न करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	मध्यम बारिश के दौरान पानी की निकासी का सही इंतजाम करें ताकि लंबे समय तक जल-जमाव न हो। ज़रूरत से ज़्यादा सिंचाई न करें। भारी बारिश के बाद, फसल में पोषक तत्वों की कमी और कीट या बीमारी के हमले पर नज़र रखें। लगातार बारिश के दौरान नाइट्रोजन वाला खाद या पौधों की सुरक्षा के लिए रसायन न डालें।
सोयाबीन	सोयाबीन के खेतों में जल-जमाव से बचने के लिए जल निकासी की व्यवस्था करें। तेज़ हवाओं के कारण धनी फ़सलें गिर सकती हैं। बारिश के बाद, फफूंद जनित रोगों और कीटों के हमले पर नज़र रखें। गीले मौसम में छिड़काव करने से बचें।
मक्का	भारी बारिश के बाद मक्के के खेतों से पानी निकालने का इंतजाम करें। तेज़ हवाओं से फ़सल गिर सकती है, खासकर लंबे पौधों के मामले में। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ सहारा दें और लंबे समय तक नमी वाले मौसम के बाद बीमारियों पर नज़र रखें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	तेज़ बारिश और तूफ़ान के दौरान गाय, भैंस, बकरी और भेड़ों को ढके हुए और अच्छी जल-निकासी वाले आश्रय में रखें। बिजली कड़कने के दौरान पशुओं को तालाबों, नहरों, खुले पानी या अकेले खड़े पेड़ों के पास न रहने दें। उन्हें पीने के लिए साफ़ पानी और सूखा चारा दें। पशुओं के आश्रय स्थल में पानी जमा न होने दें।

सामान्य सलाहकार:

5 और 6 सितंबर के बीच मध्यम बारिश, आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाओं की संभावना को देखते हुए, खेतों में पानी की निकासी का उचित इंतजाम करें और बारिश के दौरान सिंचाई या छिड़काव न करें। जहां भी संभव हो, तैयार फसलों की कटाई कर लें। बिजली कड़कने या गिरने के दौरान खेतों में काम न करें और किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। कटी हुई फसलों, खेती के औजारों, बागवानी के पौधों और पशुधन को बारिश और तेज हवाओं से बचाएं।

लघु संदेश सलाहकार:

बूंदी, झालावाड़ और कोटा में 5-6 सितंबर को मध्यम बारिश, आंधी-तूफान, बिजली चमकने और तेज हवाओं की संभावना है। पानी की निकासी का इंतजाम करें और बिजली चमकने के दौरान खेतों में काम न करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	मध्यम बारिश के दौरान पानी की निकासी का सही इंतजाम करें ताकि लंबे समय तक जल-जमाव न हो। ज़रूरत से ज़्यादा सिंचाई न करें। भारी बारिश के बाद, फसल में पोषक तत्वों की कमी और कीट या बीमारी के हमले पर नज़र रखें। लगातार बारिश के दौरान नाइट्रोजन वाला खाद या पौधों की सुरक्षा के लिए रसायन न डालें।
सोयाबीन	सोयाबीन के खेतों में जल-जमाव से बचने के लिए जल निकासी की व्यवस्था करें। तेज़ हवाओं के कारण धनी फ़सलें गिर सकती हैं। बारिश के बाद, फफूंद जनित रोगों और कीटों के हमले पर नज़र रखें। गीले मौसम में छिड़काव करने से बचें।
मक्का	भारी बारिश के बाद मक्के के खेतों से पानी निकलने का इंतजाम करें। तेज़ हवाओं से फ़सल गिर सकती है, खासकर लंबे पौधों के मामले में। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ सहारा दें और लंबे समय तक नमी वाले मौसम के बाद बीमारियों पर नज़र रखें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	तेज़ बारिश और तूफ़ान के दौरान गाय, भैंस, बकरी और भेड़ों को ढके हुए और अच्छी जल-निकासी वाले आश्रय में रखें। बिजली कड़कने के दौरान पशुओं को तालाबों, नहरों, खुले पानी या अकेले खड़े पेड़ों के पास न रहने दें। उन्हें पीने के लिए साफ़ पानी और सूखा चारा दें। पशुओं के आश्रय स्थल में पानी जमा न होने दें।

सामान्य सलाहकार:

5 और 6 सितंबर के बीच मध्यम बारिश, आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाओं की संभावना को देखते हुए, खेतों में पानी की निकासी का उचित इंतजाम करें और बारिश के दौरान सिंचाई या छिड़काव न करें। जहां भी संभव हो, तैयार फसलों की कटाई कर लें। बिजली कड़कने या गिरने के दौरान खेतों में काम न करें और किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। कटी हुई फसलों, खेती के औजारों, बागवानी के पौधों और पशुधन को बारिश और तेज हवाओं से बचाएं।

लघु संदेश सलाहकार:

बूंदी, झालावाड़ और कोटा में 5-6 सितंबर को मध्यम बारिश, आंधी-तूफान, बिजली चमकने और तेज़ हवाओं की संभावना है। पानी की निकासी का इंतजाम करें और बिजली चमकने के दौरान खेतों में काम न करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:


फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	मध्यम बारिश के दौरान पानी की निकासी का सही इंतज़ाम करें ताकि लंबे समय तक जल-जमाव न हो। ज़रूरत से ज़्यादा सिंचाई न करें। भारी बारिश के बाद, फसल में पोषक तत्वों की कमी और कीट या बीमारी के हमले पर नज़र रखें। लगातार बारिश के दौरान नाइट्रोजन वाला खाद या पौधों की सुरक्षा के लिए रसायन न डालें।
सोयाबीन	सोयाबीन के खेतों में जल-जमाव से बचने के लिए जल निकासी की व्यवस्था करें। तेज़ हवाओं के कारण घनी फ़सलें गिर सकती हैं। बारिश के बाद, फफूंद जनित रोगों और कीटों के हमले पर नज़र रखें। गीले मौसम में छिड़काव करने से बचें।
मक्का	भारी बारिश के बाद मक्के के खेतों से पानी निकलने का इंतज़ाम करें। तेज़ हवाओं से फ़सल गिर सकती है, खासकर लंबे पौधों के मामले में। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ सहारा दें और लंबे समय तक नमी वाले मौसम के बाद बीमारियों पर नज़र रखें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:


पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	तेज़ बारिश और तूफ़ान के दौरान गाय, भैंस, बकरी और भेड़ों को ढके हुए और अच्छी जल-निकासी वाले आश्रय में रखें। बिजली कड़कने के दौरान पशुओं को तालाबों, नहरों, खुले पानी या अकेले खड़े पेड़ों के पास न रहने दें। उन्हें पीने के लिए साफ़ पानी और सूखा चारा दें। पशुओं के आश्रय स्थल में पानी जमा न होने दें।

[illegible]

चेतावनी मानचित्र / Warning map



अगले 5 दिनों के लिए मौसम उपखंड स्तर वर्षा मौसम पूर्वानुमान



Please Visit :-

1. Mausam App – For Location Specific Forecast

- Playstore

Link: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imd.masuam>

- IOS Link: <https://apps.apple.com/us/app/id1522893967>

2. Meghdoot App – For Advisory Services

- Playstore

Link: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>

- IOS Link: <https://apps.apple.com/us/app/meghdoot/id1474048155?ls=1>

3. Damini App – For Lightening Warning

- Playstore

Link: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightening.live.damini>

- IOS Link: <https://apps.apple.com/app/id1502385645>