


उत्तर प्रदेश
संयुक्त कृषि-मौसम सलाहकार सेवा बुलेटिन

जारी दिनांक : 27.08.2026

बुलेटिन सं. 69/26

(दिनांक 27.08.2026 (भा.मा.स. 0830) से 01.09.2026 (भा.मा.स. 0830) तक)

उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु अंचल



उत्तर प्रदेश राज्य के नौ कृषि-जलवायु अंचल

क्र.सं	कृषि-जलवायु अंचल	ज़िले	एग्रोमेट फील्ड यूनिट (AMFU)
1	भावर-तराई क्षेत्र	बहराईच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर.	बहराईच, कानपुर, मेरठ (मोदीपुरम)
2	पश्चिमी मैदानी क्षेत्र	शामली, मुज़फ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड, गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर।	मेरठ (मोदीपुरम)
3	मध्य-पश्चिमी मैदानी क्षेत्र	अमरोहा (ज्योतिबा फुले नगर), संभल, बदायूँ, बरेली, शाहजहाँपुर, सीतापुर।	मेरठ (मोदीपुरम), कानपुर
4	दक्षिणी-पश्चिमी अर्द्धशुष्क मैदानी क्षेत्र	अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कांशीराम नगर (कांसगंज), एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, आगरा।	मेरठ (मोदीपुरम), कानपुर
5	मध्य मैदानी क्षेत्र	इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हरदोई, औरैया, लखनऊ, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, फतेहपुर, रायबरेली, कोशांबी।	कानपुर, प्रयागराज, अयोध्या, मेरठ (मोदीपुरम)
6	बुन्देलखण्ड क्षेत्र	झाँसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बाँदा, चित्रकूट, ललितपुर।	झाँसी (भरारी), प्रयागराज
7	उत्तर-पूर्वी मैदानी क्षेत्र	गोरखपुर, गोंडा, बलरामपुर, बस्ती, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, कुशीनगर, देवरिया, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज।	बहराईच, अयोध्या
8	पूर्वी मैदानी क्षेत्र	बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, आजमगढ़, संत रविदास नगर (भदोही), मऊ, वाराणसी, गाज़ीपुर, बलिया, चंदौली।	अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी।
9	विन्ध्य क्षेत्र	प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र।	प्रयागराज, वाराणसी।



भाग-I: मौसम

i. दिनांक 26.08.2026 से 27.08.2026 की अवधि के दौरान वास्तविक वर्षा

वर्षा (मिमी.) मौसम उपप्रभाग	26.08.2026 से 27.08.2026 तक आवधिक वर्षा				संचयी मौसमी वर्षा (01 जून 2026 से)			
	वास्तविक	सामान्य	% विचलन	वर्षा श्रेणी	वास्तविक	सामान्य	% विचलन	वर्षा श्रेणी
उत्तर प्रदेश	32.9	14.8	+122	बहुत अधिक	516.7	571.0	-10	सामान्य
पूर्वी उत्तर प्रदेश	29.2	15.1	+94	बहुत अधिक	502.3	604.7	-17	सामान्य
पश्चिमी उत्तर प्रदेश	38.2	14.5	+163	बहुत अधिक	536.8	523.9	+02	सामान्य

26.08.2026 से 27.08.2026 तक आवधिक वर्षा विचलन (%)

संचयी मौसमी वर्षा (01.06.2026 से वर्षा विचलन (%))

INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT MC LUCKNOW

Rainfall % Departures from the Long Period Averages
for Districts in UTTAR PRADESH

PERIOD : 26.08.2026 - 27.08.2026




LEGEND: ■ L. EXCESS (+60% OR MORE) ■ EXCESS (+20% TO +59%) ■ NORMAL (+19% TO -19%)
■ DEFICIENT (-20% TO -59%) ■ L. DEFICIENT (-60% TO -99%) ■ NO RAIN (-100%) ■ NO DATA

INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT MC LUCKNOW

Rainfall % Departures from the Long Period Averages
for Districts in UTTAR PRADESH

PERIOD : 01.06.2026 - 27.08.2026



LEGEND: ■ L. EXCESS (+60% OR MORE) ■ EXCESS (+20% TO +59%) ■ NORMAL (+19% TO -19%)
■ DEFICIENT (-20% TO -59%) ■ L. DEFICIENT (-60% TO -99%) ■ NO RAIN (-100%) ■ NO DATA

ii. जलवायु अंचलवार प्रमुख मौसमी गतिविधियाँ मान दिनांक 26.08.2026 से 27.08.2026 तक


कृषि-जलवायु अंचल	प्रमुख मौसमी गतिविधियाँ एवं वर्षा (≥5cm)
भावर-तराई क्षेत्र	27.08.2026:- बहराइच-6, कैसरगंज-7, महसी-5, बिलासपुर-5, सहाबाद-5, सुअर-5, बिलारी-16, मुरादाबाद-5
पश्चिमी मैदानी क्षेत्र	कुछ नहीं।
मध्य-पश्चिमी मैदानी क्षेत्र	26.08.2026:- बहेड़ी-5. 27.08.2026:- चन्दौसी-8, सहसवान-15
दक्षिणी-पश्चिमी अर्द्धशुष्क मैदानी क्षेत्र	कुछ नहीं।
मध्य मैदानी क्षेत्र	26.08.2026:- बिंदकी-7, फ़तेहपुर वेधशाला-6, कानपुर वेधशाला-8, कानपुर एयरपोर्ट-7, कानपुर तहसील-8, चक्कर नगर-11, इटावा-5, डलमऊ-7, रायबरेली सीडब्ल्यूसी-10। 27.08.2026:- अकिंगघाट-8, कानपुर एयरपोर्ट-5, औरिया-5, कन्नौज-5, तिर्वा-5, कायमगंज-5, हसनगंज-5, हरदोई वेधशाला-5, हरदोई तहसील-5
बुन्देलखण्ड क्षेत्र	26.08.2026:- अतर्रा-9, बदौसा-10, बांदा-10, बांदा सीडब्ल्यूसी-12, बेबरू-11, चिल्लाघाट-7, नरैनी-10, चरखारी-13, महोबा-16, हमीरपुर सीडब्ल्यूसी-6, हमीरपुर वेधशाला-6, मौदहा-5, राठ-22, शाहजीना-6, मड़वरा-5, झांसी-6, मोठ-6, जालौन-5, कालपी सीडब्ल्यूसी-11, कोच-9, उरई-7. 27.08.2026:- अतर्रा-8, बांदा-10, बांदा-6, बेबरू-10, नरैनी-9, चरखारी-10, कुलपहाड़-14, महोबा-16, तालबेहट-8, झांसी-6, मऊरानीपुर-8, जालौन-5, कालपी-5।
उत्तर-पूर्वी मैदानी क्षेत्र	27.08.2026:- गोण्डा-13, गोण्डा सदर-13
पूर्वी मैदानी क्षेत्र	26.08.2026:- अमेठी-5, चंदौली-12, गाज़ीपुर वेधशाला-5, जलालपुर एफएमओ-8, कुंडा-6। 27.08.2026:- बलिया वेधशाला-6
विन्ध्य क्षेत्र	26.08.2026:- मेजा-6. 27.08.2026:- घोरावल-5





iii. कृषि-जलवायु अंचलवार मौसम सारांश दिनांक 25.08.2026 (भा.मा.स. 0830) से 27.08.2026 (भा.मा.स. 0830) तक

कृषि-जलवायु अंचल	औसत अधिकतम तापमान (° से.)		औसत न्यूनतम तापमान (° से.)		औसत सापेक्षिक आर्द्रता (%)		वायु गति एवं दिशा (किमी./घं) दिशा		बादल (ऑक्टा)
	वास्तविक (विचलन)	श्रेणी	वास्तविक (विचलन)	श्रेणी	0830 भा.मा.स.	1730 भा.मा.स.	(किमी./घं)	दिशा	
भावर-तराई क्षेत्र	32.4 (-0.4)	→	25.4 (+0.2)	→	93	84	02-10	उ.पू.-उ.प.	5-8
पश्चिमी मैदानी क्षेत्र	33.8 (+0.9)	→	26.1 (+1.3)	→	91	78	04-08	उ.पू.-उ.प.	5-8
मध्य-पश्चिमी मैदानी क्षेत्र	32.3 (-0.7)	→	25.8 (+0.3)	→	93	86	00-02	प. -उ.प.	3-8
दक्षिणी-पश्चिमी अर्द्धशुष्क मैदानी क्षेत्र	32.1 (-0.9)	→	26.2 (+1.2)	→	93	87	00-06	द.प.-उ.प.	5-8
मध्य मैदानी क्षेत्र	31.7 (-1.4)	→	25.3 (-0.1)	→	92	88	04-12	उ.पू.-उ.प.	5-8
बुन्देलखण्ड क्षेत्र	31.1 (-1.7)	↓	25.3 (-0.1)	→	92	88	02-06	उ.पू.-उ.प.	7-8
उत्तर-पूर्वी मैदानी क्षेत्र	32.9 (-0.2)	→	26.3 (+0.5)	→	90	86	04-10	उ.पू.- पू	5-8
पूर्वी मैदानी क्षेत्र	32.4 (-0.7)	→	26.0 (+0.4)	→	91	87	04-18	पू.- द.प	7-8
विन्ध्य क्षेत्र	32.7 (+0.1)	→	26.0 (+0.7)	→	91	86	00-06	उ.पू.- द.	7-8



- लाल/नीले रंग से प्रदर्शित संख्या उस वेधशाला पर सबसे कम अधिकतम / न्यूनतम तापमान को प्रदर्शित करती है।
- काले रंग से प्रदर्शित संख्या उस वेधशाला पर औसत अधिकतम / न्यूनतम तापमान तथा कोष्टक में लिखी हुई संख्या सामान्य से विचलन को प्रदर्शित करती है।





iv. कृषि-जलवायु अंचलवार मौसम पूर्वानुमान दिनांक 27.08.2026 से 01.09.2026 तक

कृषि जलवायु अंचल	वर्षा (मिमी.)					अधिकतम तापमान (° से.)		न्यूनतम तापमान (° से.)		सापेक्षिक आर्द्रता (%)		वायु गति एवं दिशा		बादल (ऑक्टा)	मौसम चेतावनी				
	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	वास्तविक	सामान्य	वास्तविक	सामान्य	वास्तविक (न्यूनतम - अधिकतम)	सामान्य (न्यूनतम - अधिकतम)	(किमी./घं)	दिशा	(ऑक्टा)	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅
भाबर-तराई क्षेत्र				D		32-36	33	26-28	25	56-98	76-86	01-10	उ.पू.-उ.प.	2-7		Nil	Nil	Nil	Nil
पश्चिमी मैदानी क्षेत्र		D	D	D	D	34-40	33	27-31	25	37-89	73-84	01-20	उ.पू.-उ.प.	2-6	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
मध्य-पश्चिमी मैदानी क्षेत्र				D	D	33-37	33	27-29	25	49-94	77-86	01-12	उ.पू.-उ.प.	2-8		Nil	Nil	Nil	Nil
दक्षिणी-पश्चिमी अर्द्धशुष्क मैदानी क्षेत्र		D	D	D	D	33-40	33	27-30	25	37-94	76-83	04-21	द.प.-प.	2-7	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
मध्य मैदानी क्षेत्र				D	D	29-37	33	26-29	25	48-98	77-84	01-19	उ.पू.-उ.प.	3-8		Nil	Nil	Nil	Nil
बुन्देलखण्ड क्षेत्र			D			28-35	33	25-28	26	57-99	76-85	02-22	द.प.-उ.प.	4-8		Nil	Nil	Nil	Nil
उत्तर-पूर्वी मैदानी क्षेत्र						31-35	33	26-28	26	60-98	78-85	01-11	उ.पू.-उ.प.	4-8	Nil		Nil	Nil	
पूर्वी मैदानी क्षेत्र						30-36	33	26-28	26	59-99	78-85	01-18	उ.पू.-उ.प.	4-8			Nil	Nil	
विन्ध्य क्षेत्र						29-34	33	25-27	25	65-100	79-85	06-15	पू.-उ.प.	5-8			Nil	Nil	

प्रतीक चिह्न	संबद्ध मौसम	प्रतीक चिह्न	संबद्ध मौसम	प्रतीक चिह्न	संबद्ध मौसम
D	शुष्क		तड़ित झंझावात/ वज्रपात		हल्की से मध्यम वर्षा
	शीत लहर		तूफान/ चंडवात		भारी वर्षा
	तेज हवा		ओलावृष्टि		भारी से बहुत भारी वर्षा
	कोहरा		बहुत हल्की से हल्की वर्षा		अत्यधिक भारी वर्षा
	सामान्य (-1.5°C to +1.5°C)	↑	सामान्य से अधिक (+1.6 °C to +3.0 °C)	↓	सामान्य से कम (-1.6 °C to -3.0 °C)
↑	सामान्य से बहुत अधिक (+3.1°C to +5.0 °C)	↓	सामान्य से बहुत कम (-3.1 °C to -5.0 °C)	↑ +	ऊष्ण रात्रि

वर्षा की तीव्रता (Rainfall Intensity)		आसमान की स्थिति (Sky Condition)		कोहरे की तीव्रता (Fog Intensity)	
शब्दावली	वर्षमान (मिमी. में)	शब्दावली	बादल की मात्रा (ऑक्टा में)	शब्दावली	दृश्यता (मीटर में)
बहुत हल्की वर्षा	Trace – 2.4	आसमान साफ़	0	धुंध	> 1000 (सापेक्षिक आर्द्रता < 75%)
हल्की वर्षा	2.5 – 15.5	आसमान मुख्यतया साफ़	1-2	कुहासा	> 1000 (सापेक्षिक आर्द्रता > 75%)
मध्यम वर्षा	15.6 – 64.4	आसमान में आंशिक बादल	3-4	छिछला कोहरा	< 1000
भारी वर्षा	64.5 – 115.5	आसमान में आमतौर पर बादल	6-7	मध्यम कोहरा	< 500
बहुत भारी वर्षा	115.6 – 204.4	बादलों से पूरा घिरा आसमान	8	घना कोहरा	< 200
अत्यधिक भारी वर्षा	> 204.5	अस्पष्ट/धुंधला आसमान	-	अत्यधिक घना कोहरा	< 50

Regional Distribution (% of Stations Reporting)		Probabilistic Forecast		Colour Based Warning/ Advisory	
% Station	Description	Terminology	Probability	Colour	चेतावनी /सलाह
76-100	Most Places (Widespread)	Unlikely	<25%	Green (No Warning)	No Action
51-75	Many Places (Fairly Widespread)	Likely	25%-50%	Yellow	Be Aware
26-50	Few Places (Scattered)	Very Likely	51%-75%	Orange	Be Ready
<25	Isolated Places	Most Likely	>75%	Red	Take Action











Govt. of India/भारत सरकार
Ministry of Earth Sciences/पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
India Meteorological Department/भारत मौसम विज्ञान विभाग
Regional Meteorological Centre Lucknow/प्रादेशिक मौसम केन्द्र, लखनऊ

15 1875 2025
Years of Service to the Nation
राष्ट्र सेवा के 150 वर्ष

जिलेवार वर्षा एवं चेतावनी पूर्वानुमान ग्राफिक्स (चित्रमुद्रण):-



0522-2436283



<https://imdgeospatial.imd.gov.in/>







mclucknow@gmail.com



Govt. of India/भारत सरकार
Ministry of Earth Sciences/पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
India Meteorological Department/भारत मौसम विज्ञान विभाग
Regional Meteorological Centre Lucknow/प्रादेशिक मौसम केन्द्र, लखनऊ

15 1875 2025
Years of Service to the Nation
राष्ट्र सेवा के 150 वर्ष



0522-2436283



<https://imdgeospatial.imd.gov.in/>



mclucknow@gmail.com



Govt. of India/भारत सरकार
Ministry of Earth Sciences/पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
India Meteorological Department/भारत मौसम विज्ञान विभाग
Regional Meteorological Centre Lucknow/प्रादेशिक मौसम केन्द्र लखनऊ



Districtwise Probabilistic Rainfall Forecast and Warning for Uttar Pradesh

उत्तर प्रदेश के लिए जिलावार संभावित वर्षा पूर्वानुमान एवं चेतावनी

District		27-08-2026	28-08-2026	29-08-2026	30-08-2026	31-08-2026
		Thursday	Friday	Saturday	Sunday	Monday
AGRA/आगरा	वितरण	अनेक जगह	शुष्क	शुष्क	शुष्क	शुष्क
	तीव्रता	मध्यम	-	-	-	-
	सम्भावना	50-75%	>75%	>75%	>75%	>75%
	चेतावनी	-	-	-	-	-
ALIGARH/ अलीगढ़	वितरण	कुछ जगह	शुष्क	शुष्क	शुष्क	शुष्क
	तीव्रता	हल्की से मध्यम	-	-	-	-
	सम्भावना	25-50%	>75%	>75%	>75%	>75%
	चेतावनी	-	-	-	-	-
AMBEDKAR NAGAR/ अम्बेडकर नगर	वितरण	एक दो जगह	एक दो जगह	एक दो जगह	एक दो जगह	कुछ जगह
	तीव्रता	बूदाबांदी से हल्की	बूदाबांदी से हल्की	बूदाबांदी से हल्की	बूदाबांदी से हल्की	हल्की से मध्यम
	सम्भावना	<25%	<25%	<25%	<25%	25-50%
	चेतावनी	तड़ित, झंझावात/वज्रपात	-	-	-	-
AMETHI/ अमेठी	वितरण	कुछ जगह	एक दो जगह	एक दो जगह	शुष्क	शुष्क
	तीव्रता	हल्की से मध्यम	बूदाबांदी से हल्की	बूदाबांदी से हल्की	-	-
	सम्भावना	25-50%	<25%	<25%	>75%	<25%
	चेतावनी	तड़ित, झंझावात/वज्रपात	-	-	-	-
AMROHA/ अमरोहा	वितरण	अनेक जगह	शुष्क	शुष्क	शुष्क	शुष्क
	तीव्रता	मध्यम	-	-	-	-
	सम्भावना	50-75%	>75%	>75%	>75%	>75%
	चेतावनी	-	-	-	-	-
AURAIYA/ औरैया	वितरण	अनेक जगह	शुष्क	शुष्क	शुष्क	शुष्क
	तीव्रता	मध्यम	-	-	-	-
	सम्भावना	50-75%	>75%	>75%	>75%	>75%
	चेतावनी	भारी-वर्षा	-	-	-	-
AYODHYA/ अयोध्या	वितरण	कुछ जगह	एक दो जगह	एक दो जगह	शुष्क	एक दो जगह
	तीव्रता	हल्की से मध्यम	बूदाबांदी से हल्की	बूदाबांदी से हल्की	-	बूदाबांदी से हल्की
	सम्भावना	25-50%	<25%	<25%	>75%	<25%
	चेतावनी	तड़ित, झंझावात/वज्रपात	-	-	-	-



Govt. of India/भारत सरकार
Ministry of Earth Sciences/पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
India Meteorological Department/भारत मौसम विज्ञान विभाग
Regional Meteorological Centre Lucknow/प्रादेशिक मौसम केन्द्र लखनऊ



AZAMGARH/ आज़मगढ़	वितरण	एक दो जगह	कुछ जगह	एक दो जगह	एक दो जगह	कुछ जगह
	तीव्रता	बूदाबांदी से हल्की	हल्की से मध्यम	बूदाबांदी से हल्की	बूदाबांदी से हल्की	हल्की से मध्यम
	सम्भावना	<25%	25-50%	<25%	<25%	25-50%
	चेतावनी	तड़ित, झंझावात/वज्रपात	तड़ित, झंझावात/वज्रपात	-	-	-
BADAYUN/ बदायूं	वितरण	अनेक जगह	शुष्क	शुष्क	शुष्क	शुष्क
	तीव्रता	मध्यम	-	-	-	-
	सम्भावना	50-75%	>75%	>75%	>75%	>75%
	चेतावनी	-	-	-	-	-
BAGHPAT/ बागपत	वितरण	कुछ जगह	शुष्क	शुष्क	शुष्क	शुष्क
	तीव्रता	हल्की से मध्यम	-	-	-	-
	सम्भावना	25-50%	>75%	>75%	>75%	>75%
	चेतावनी	-	-	-	-	-
BAHRAICH/ बहराइच	वितरण	कुछ जगह	कुछ जगह	कुछ जगह	एक दो जगह	कुछ जगह
	तीव्रता	हल्की से मध्यम	हल्की से मध्यम	हल्की से मध्यम	बूदाबांदी से हल्की	हल्की से मध्यम
	सम्भावना	25-50%	25-50%	25-50%	<25%	25-50%
	चेतावनी	-	-	-	-	-
BALLIA/ बलिया	वितरण	एक दो जगह	कुछ जगह	एक दो जगह	कुछ जगह	कुछ जगह
	तीव्रता	बूदाबांदी से हल्की	हल्की से मध्यम	बूदाबांदी से हल्की	हल्की से मध्यम	हल्की से मध्यम
	सम्भावना	<25%	25-50%	<25%	25-50%	25-50%
	चेतावनी	-	तड़ित, झंझावात/वज्रपात	-	-	भारी-वर्षा
BALRAMPUR/ बलरामपुर	वितरण	एक दो जगह	कुछ जगह	कुछ जगह	एक दो जगह	कुछ जगह
	तीव्रता	बूदाबांदी से हल्की	हल्की से मध्यम	हल्की से मध्यम	बूदाबांदी से हल्की	हल्की से मध्यम
	सम्भावना	<25%	25-50%	25-50%	<25%	25-50%
	चेतावनी	-	तड़ित, झंझावात/वज्रपात	-	-	-
BANDA/बाँदा	वितरण	लगभग सभी जगह	कुछ जगह	शुष्क	शुष्क	शुष्क
	तीव्रता	मध्यम	हल्की से मध्यम	-	-	-
	सम्भावना	>75%	25-50%	>75%	>75%	>75%
	चेतावनी	तड़ित, झंझावात/वज्रपात, भारी-वर्षा	-	-	-	-
BARABANKI/ बाराबंकी	वितरण	कुछ जगह	एक दो जगह	एक दो जगह	शुष्क	शुष्क
	तीव्रता	हल्की से मध्यम	बूदाबांदी से हल्की	बूदाबांदी से हल्की	-	-



Govt. of India/भारत सरकार
Ministry of Earth Sciences/पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
India Meteorological Department/भारत मौसम विज्ञान विभाग
Regional Meteorological Centre Lucknow/प्रादेशिक मौसम केन्द्र लखनऊ



	सम्भावना	25-50%	<25%	<25%	>75%	>75%
	चेतावनी	तड़ित, झंझावात/वज्रपात	-	-	-	-
BAREILLY/ बरेली	वितरण	लगभग सभी जगह	एक दो जगह	एक दो जगह	एक दो जगह	एक दो जगह
	तीव्रता	मध्यम	बूदाबांदी से हल्की	बूदाबांदी से हल्की	बूदाबांदी से हल्की	बूदाबांदी से हल्की
	सम्भावना	>75%	<25%	<25%	<25%	<25%
	चेतावनी	भारी-वर्षा	-	-	-	-
BASTI/बस्ती	वितरण	एक दो जगह	एक दो जगह	एक दो जगह	एक दो जगह	कुछ जगह
	तीव्रता	बूदाबांदी से हल्की	बूदाबांदी से हल्की	बूदाबांदी से हल्की	बूदाबांदी से हल्की	हल्की से मध्यम
	सम्भावना	<25%	<25%	<25%	<25%	25-50%
	चेतावनी	-	तड़ित, झंझावात/वज्रपात	-	-	-
BHADOHI/ भदोही	वितरण	कुछ जगह	कुछ जगह	एक दो जगह	शुष्क	शुष्क
	तीव्रता	हल्की से मध्यम	हल्की से मध्यम	बूदाबांदी से हल्की	-	-
	सम्भावना	25-50%	25-50%	<25%	>75%	>75%
	चेतावनी	तड़ित, झंझावात/वज्रपात	तड़ित, झंझावात/वज्रपात	-	-	-
BIJNORE/ बिजनौर	वितरण	लगभग सभी जगह	एक दो जगह	शुष्क	शुष्क	शुष्क
	तीव्रता	मध्यम	बूदाबांदी से हल्की	-	-	-
	सम्भावना	>75%	<25%	>75%	>75%	>75%
	चेतावनी	भारी-वर्षा	-	-	-	-
BULANDSAHAR/ बुलंदशहर	वितरण	कुछ जगह	शुष्क	शुष्क	शुष्क	शुष्क
	तीव्रता	हल्की से मध्यम	-	-	-	-
	सम्भावना	25-50%	>75%	>75%	>75%	>75%
	चेतावनी	-	-	-	-	-
CHANDAULI/ चंदौली	वितरण	कुछ जगह	अनेक जगह	एक दो जगह	एक दो जगह	कुछ जगह
	तीव्रता	हल्की से मध्यम	मध्यम	बूदाबांदी से हल्की	बूदाबांदी से हल्की	हल्की से मध्यम
	सम्भावना	25-50%	50-75%	<25%	<25%	25-50%
	चेतावनी	तड़ित, झंझावात/वज्रपात	तड़ित, झंझावात/वज्रपात	-	-	-
CHITRAKOOT/ चित्रकूट	वितरण	अनेक जगह	कुछ जगह	शुष्क	शुष्क	शुष्क
	तीव्रता	मध्यम	हल्की से मध्यम	-	-	-
	सम्भावना	50-75%	25-50%	>75%	>75%	>75%
	चेतावनी	तड़ित, झंझावात/वज्रपात, भारी-वर्षा	-	-	-	-
	वितरण	एक दो जगह	कुछ जगह	एक दो जगह	कुछ जगह	अनेक जगह



Govt. of India/भारत सरकार
Ministry of Earth Sciences/पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
India Meteorological Department/भारत मौसम विज्ञान विभाग
Regional Meteorological Centre Lucknow/प्रादेशिक मौसम केन्द्र लखनऊ



DEORIA/ देवरिया	तीव्रता	बूँदाबांदी से हल्की	हल्की से मध्यम	बूँदाबांदी से हल्की	हल्की से मध्यम	मध्यम
	सम्भावना	<25%	25-50%	<25%	25-50%	50-75%
	चेतावनी	-	तड़ित, झंझावात/वज्रपात	-	-	-
ETAH/एटा	वितरण	अनेक जगह	शुष्क	शुष्क	शुष्क	शुष्क
	तीव्रता	मध्यम	-	-	-	-
	सम्भावना	50-75%	>75%	>75%	>75%	>75%
	चेतावनी	-	-	-	-	-
ETAWAH/ इटावा	वितरण	अनेक जगह	शुष्क	शुष्क	शुष्क	शुष्क
	तीव्रता	मध्यम	-	-	-	-
	सम्भावना	50-75%	>75%	>75%	>75%	>75%
	चेतावनी	-	-	-	-	-
FARUKHABAD/ फर्रुखाबाद	वितरण	अनेक जगह	शुष्क	शुष्क	शुष्क	शुष्क
	तीव्रता	मध्यम	-	-	-	-
	सम्भावना	50-75%	>75%	>75%	>75%	>75%
	चेतावनी	भारी-वर्षा	-	-	-	-
FATEHPUR/ फतेहपुर	वितरण	लगभग सभी जगह	एक दो जगह	शुष्क	शुष्क	शुष्क
	तीव्रता	मध्यम	बूँदाबांदी से हल्की	-	-	-
	सम्भावना	>75%	<25%	>75%	>75%	>75%
	चेतावनी	तड़ित, झंझावात/वज्रपात, भारी-वर्षा	-	-	-	-
FIROZABAD/ फिरोजाबाद	वितरण	अनेक जगह	शुष्क	शुष्क	शुष्क	शुष्क
	तीव्रता	मध्यम	-	-	-	-
	सम्भावना	50-75%	>75%	>75%	>75%	>75%
	चेतावनी	-	-	-	-	-
GAUTAMBUDH NAGAR/ गौतम बुद्ध नगर	वितरण	एक दो जगह	शुष्क	शुष्क	शुष्क	शुष्क
	तीव्रता	बूँदाबांदी से हल्की	-	-	-	-
	सम्भावना	<25%	>75%	>75%	>75%	>75%
	चेतावनी	-	-	-	-	-
GHAZIABAD/ गाजियाबाद	वितरण	एक दो जगह	शुष्क	शुष्क	शुष्क	शुष्क
	तीव्रता	बूँदाबांदी से हल्की	-	-	-	-
	सम्भावना	<25%	>75%	>75%	>75%	>75%
	चेतावनी	-	-	-	-	-



Govt. of India/भारत सरकार
Ministry of Earth Sciences/पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
India Meteorological Department/भारत मौसम विज्ञान विभाग
Regional Meteorological Centre Lucknow/प्रादेशिक मौसम केन्द्र लखनऊ



GHAZIPUR/ गाजीपुर	वितरण	एक दो जगह	कुछ जगह	एक दो जगह	एक दो जगह	कुछ जगह
	तीव्रता	बूदाबांदी से हल्की	हल्की से मध्यम	बूदाबांदी से हल्की	बूदाबांदी से हल्की	हल्की से मध्यम
	सम्भावना	<25%	25-50%	<25%	<25%	25-50%
	चेतावनी	तड़ित, झंझावात/वज्रपात	तड़ित, झंझावात/वज्रपात	-	-	-
GONDA/ गोंडा	वितरण	एक दो जगह	एक दो जगह	एक दो जगह	एक दो जगह	एक दो जगह
	तीव्रता	बूदाबांदी से हल्की	बूदाबांदी से हल्की	बूदाबांदी से हल्की	बूदाबांदी से हल्की	बूदाबांदी से हल्की
	सम्भावना	<25%	<25%	<25%	<25%	<25%
	चेतावनी	-	-	-	-	-
GORAKHPUR/ गोरखपुर	वितरण	एक दो जगह	कुछ जगह	एक दो जगह	कुछ जगह	अनेक जगह
	तीव्रता	बूदाबांदी से हल्की	हल्की से मध्यम	बूदाबांदी से हल्की	हल्की से मध्यम	मध्यम
	सम्भावना	<25%	25-50%	<25%	25-50%	50-75%
	चेतावनी	-	तड़ित, झंझावात/वज्रपात	-	-	-
HAMIRPUR/ हमीरपुर	वितरण	लगभग सभी जगह	एक दो जगह	शुष्क	शुष्क	शुष्क
	तीव्रता	मध्यम	बूदाबांदी से हल्की	-	-	-
	सम्भावना	>75%	<25%	>75%	>75%	>75%
	चेतावनी	तड़ित, झंझावात/वज्रपात, भारी-वर्षा	-	-	-	-
HAPUR/ हापुड़	वितरण	कुछ जगह	शुष्क	शुष्क	शुष्क	शुष्क
	तीव्रता	हल्की से मध्यम	-	-	-	-
	सम्भावना	25-50%	>75%	>75%	>75%	>75%
	चेतावनी	-	-	-	-	-
HARDOI/ हरदोई	वितरण	अनेक जगह	एक दो जगह	शुष्क	शुष्क	शुष्क
	तीव्रता	मध्यम	बूदाबांदी से हल्की	-	-	-
	सम्भावना	50-75%	<25%	>75%	>75%	>75%
	चेतावनी	तड़ित, झंझावात/वज्रपात, भारी-वर्षा	-	-	-	-
HATHRAS/ हाथरस	वितरण	कुछ जगह	शुष्क	शुष्क	शुष्क	शुष्क
	तीव्रता	हल्की से मध्यम	-	-	-	-
	सम्भावना	25-50%	>75%	>75%	>75%	>75%
	चेतावनी	-	-	-	-	-
JALAUN/जालौन	वितरण	लगभग सभी जगह	शुष्क	शुष्क	शुष्क	शुष्क
	तीव्रता	मध्यम	-	-	-	-
	सम्भावना	>75%	>75%	>75%	>75%	>75%



Govt. of India/भारत सरकार
Ministry of Earth Sciences/पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
India Meteorological Department/भारत मौसम विज्ञान विभाग
Regional Meteorological Centre Lucknow/प्रादेशिक मौसम केन्द्र लखनऊ



	चेतावनी	भारी-वर्षा	-	-	-	-
JAUNPUR/ जौनपुर	वितरण	कुछ जगह	कुछ जगह	एक दो जगह	शुष्क	एक दो जगह
	तीव्रता	हल्की से मध्यम	हल्की से मध्यम	बूदाबादी से हल्की	-	बूदाबादी से हल्की
	सम्भावना	25-50%	25-50%	<25%	>75%	<25%
	चेतावनी	तड़ित, झंझावात/वज्रपात	तड़ित, झंझावात/वज्रपात	-	-	-
JHANSI/झांसी	वितरण	लगभग सभी जगह	शुष्क	शुष्क	शुष्क	शुष्क
	तीव्रता	मध्यम	-	-	-	-
	सम्भावना	>75%	>75%	>75%	>75%	>75%
	चेतावनी	भारी-वर्षा	-	-	-	-
KANNAUJ/ कन्नौज	वितरण	अनेक जगह	शुष्क	शुष्क	शुष्क	शुष्क
	तीव्रता	मध्यम	-	-	-	-
	सम्भावना	50-75%	>75%	>75%	>75%	>75%
	चेतावनी	तड़ित, झंझावात/वज्रपात, भारी-वर्षा	-	-	-	-
KANPUR DEHAT/ कानपुर देहात	वितरण	लगभग सभी जगह	शुष्क	शुष्क	शुष्क	शुष्क
	तीव्रता	मध्यम	-	-	-	-
	सम्भावना	>75%	>75%	>75%	>75%	>75%
	चेतावनी	तड़ित, झंझावात/वज्रपात, भारी-वर्षा	-	-	-	-
KANPUR NAGAR/ कानपुर नगर	वितरण	लगभग सभी जगह	एक दो जगह	शुष्क	शुष्क	शुष्क
	तीव्रता	मध्यम	बूदाबादी से हल्की	-	-	-
	सम्भावना	>75%	<25%	>75%	>75%	>75%
	चेतावनी	तड़ित, झंझावात/वज्रपात, भारी-वर्षा	-	-	-	-
KASGANJ/ कासगंज	वितरण	अनेक जगह	शुष्क	शुष्क	शुष्क	शुष्क
	तीव्रता	मध्यम	-	-	-	-
	सम्भावना	50-75%	>75%	>75%	>75%	>75%
	चेतावनी	-	-	-	-	-
KAUSHAMBI/ कौशांबी	वितरण	अनेक जगह	कुछ जगह	शुष्क	शुष्क	शुष्क
	तीव्रता	मध्यम	हल्की से मध्यम	-	-	-
	सम्भावना	50-75%	25-50%	>75%	>75%	>75%
	चेतावनी	तड़ित, झंझावात/वज्रपात	-	-	-	-
KUSHINAGAR/	वितरण	एक दो जगह	कुछ जगह	कुछ जगह	कुछ जगह	अनेक जगह
	तीव्रता	बूदाबादी से हल्की	हल्की से मध्यम	हल्की से मध्यम	हल्की से मध्यम	मध्यम



Govt. of India/भारत सरकार
Ministry of Earth Sciences/पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
India Meteorological Department/भारत मौसम विज्ञान विभाग
Regional Meteorological Centre Lucknow/प्रादेशिक मौसम केन्द्र लखनऊ



कुशीनगर	सम्भावना	<25%	25-50%	25-50%	25-50%	50-75%
	चेतावनी	-	तड़ित, झंझावात/वज्रपात	-	-	भारी-वर्षा
LAKHIMPUR KHERI/ लखीमपुर खीरी	वितरण	अनेक जगह	एक दो जगह	कुछ जगह	एक दो जगह	एक दो जगह
	तीव्रता	मध्यम	बूदाबांदी से हल्की	हल्की से मध्यम	बूदाबांदी से हल्की	बूदाबांदी से हल्की
	सम्भावना	50-75%	<25%	25-50%	<25%	<25%
	चेतावनी	भारी-वर्षा	-	-	-	-
LALITPUR/ ललितपुर	वितरण	लगभग सभी जगह	एक दो जगह	शुष्क	शुष्क	शुष्क
	तीव्रता	मध्यम	बूदाबांदी से हल्की	-	-	-
	सम्भावना	>75%	<25%	>75%	>75%	>75%
	चेतावनी	भारी-वर्षा	-	-	-	-
LUCKNOW/ लखनऊ	वितरण	कुछ जगह	एक दो जगह	शुष्क	शुष्क	शुष्क
	तीव्रता	हल्की से मध्यम	बूदाबांदी से हल्की	-	-	-
	सम्भावना	25-50%	<25%	>75%	>75%	>75%
	चेतावनी	तड़ित, झंझावात/वज्रपात	-	-	-	-
MAHOBA/ महोबा	वितरण	लगभग सभी जगह	एक दो जगह	शुष्क	शुष्क	शुष्क
	तीव्रता	मध्यम	बूदाबांदी से हल्की	-	-	-
	सम्भावना	>75%	<25%	>75%	>75%	>75%
	चेतावनी	तड़ित, झंझावात/वज्रपात, भारी-वर्षा	-	-	-	-
MAHARAJGANJ/ महाराजगंज	वितरण	एक दो जगह	कुछ जगह	कुछ जगह	कुछ जगह	अनेक जगह
	तीव्रता	बूदाबांदी से हल्की	हल्की से मध्यम	हल्की से मध्यम	हल्की से मध्यम	मध्यम
	सम्भावना	<25%	25-50%	25-50%	25-50%	50-75%
	चेतावनी	-	तड़ित, झंझावात/वज्रपात	-	-	भारी-वर्षा
MAINPURI/ मैनपुरी	वितरण	अनेक जगह	शुष्क	शुष्क	शुष्क	शुष्क
	तीव्रता	मध्यम	-	-	-	-
	सम्भावना	50-75%	>75%	>75%	>75%	>75%
	चेतावनी	-	-	-	-	-
MATHURA/ मथुरा	वितरण	कुछ जगह	शुष्क	शुष्क	शुष्क	शुष्क
	तीव्रता	हल्की से मध्यम	-	-	-	-
	सम्भावना	25-50%	>75%	>75%	>75%	>75%
	चेतावनी	-	-	-	-	-
	वितरण	एक दो जगह	कुछ जगह	एक दो जगह	कुछ जगह	कुछ जगह



Govt. of India/भारत सरकार
Ministry of Earth Sciences/पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
India Meteorological Department/भारत मौसम विज्ञान विभाग
Regional Meteorological Centre Lucknow/प्रादेशिक मौसम केन्द्र लखनऊ



MAU/ मऊ	तीव्रता	बूँदाबांदी से हल्की	हल्की से मध्यम	बूँदाबांदी से हल्की	हल्की से मध्यम	हल्की से मध्यम
	सम्भावना	<25%	25-50%	<25%	25-50%	25-50%
	चेतावनी	-	तड़ित, झंझावात/वज्रपात	-	-	-
MEERUT/ मेरठ	वितरण	कुछ जगह	शुष्क	शुष्क	शुष्क	शुष्क
	तीव्रता	हल्की से मध्यम	-	-	-	-
	सम्भावना	25-50%	>75%	>75%	>75%	>75%
	चेतावनी	-	-	-	-	-
MIRZAPUR/ मिर्जापुर	वितरण	कुछ जगह	अनेक जगह	एक दो जगह	शुष्क	एक दो जगह
	तीव्रता	हल्की से मध्यम	मध्यम	बूँदाबांदी से हल्की	-	बूँदाबांदी से हल्की
	सम्भावना	25-50%	50-75%	<25%	>75%	<25%
	चेतावनी	तड़ित, झंझावात/वज्रपात	तड़ित, झंझावात/वज्रपात	-	-	-
MORADABAD/ मुरादाबाद	वितरण	लगभग सभी जगह	एक दो जगह	शुष्क	शुष्क	शुष्क
	तीव्रता	मध्यम	बूँदाबांदी से हल्की	-	-	-
	सम्भावना	>75%	<25%	>75%	>75%	>75%
	चेतावनी	भारी-वर्षा	-	-	-	-
MUZAFFAR NAGAR/ मुज़फ़्फरनगर	वितरण	अनेक जगह	शुष्क	शुष्क	शुष्क	शुष्क
	तीव्रता	मध्यम	-	-	-	-
	सम्भावना	>75%	<25%	>75%	>75%	>75%
	चेतावनी	-	-	-	-	-
PILIBHIT/ पीलीभीत	वितरण	अनेक जगह	एक दो जगह	एक दो जगह	एक दो जगह	एक दो जगह
	तीव्रता	मध्यम	बूँदाबांदी से हल्की	बूँदाबांदी से हल्की	बूँदाबांदी से हल्की	बूँदाबांदी से हल्की
	सम्भावना	50-75%	<25%	<25%	<25%	<25%
	चेतावनी	भारी-वर्षा	-	-	-	-
PRATAPGARH/ प्रतापगढ़	वितरण	कुछ जगह	कुछ जगह	एक दो जगह	शुष्क	शुष्क
	तीव्रता	हल्की से मध्यम	हल्की से मध्यम	बूँदाबांदी से हल्की	-	-
	सम्भावना	25-50%	25-50%	<25%	>75%	>75%
	चेतावनी	तड़ित, झंझावात/वज्रपात	-	-	-	-
PRAYAGRAJ/ प्रयागराज	वितरण	कुछ जगह	कुछ जगह	शुष्क	शुष्क	शुष्क
	तीव्रता	हल्की से मध्यम	हल्की से मध्यम	-	-	-
	सम्भावना	25-50%	25-50%	>75%	>75%	>75%
	चेतावनी	तड़ित, झंझावात/वज्रपात	तड़ित, झंझावात/वज्रपात	-	-	-



Govt. of India/भारत सरकार
Ministry of Earth Sciences/पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
India Meteorological Department/भारत मौसम विज्ञान विभाग
Regional Meteorological Centre Lucknow/प्रादेशिक मौसम केन्द्र लखनऊ



RAEBARELI/ रायबरेली	वितरण	अनेक जगह	एक दो जगह	शुष्क	शुष्क	शुष्क
	तीव्रता	मध्यम	बूदाबांदी से हल्की	-	-	-
	सम्भावना	50-75%	<25%	>75%	>75%	>75%
	चेतावनी	तड़ित, झंझावात/वज्रपात	-	-	-	-
RAMPUR/ रामपुर	वितरण	लगभग सभी जगह	एक दो जगह	शुष्क	शुष्क	शुष्क
	तीव्रता	मध्यम	बूदाबांदी से हल्की	-	-	-
	सम्भावना	>75%	<25%	>75%	>75%	>75%
	चेतावनी	भारी-वर्षा	-	-	-	-
SAHARANPUR/ सहारनपुर	वितरण	लगभग सभी जगह	शुष्क	शुष्क	शुष्क	शुष्क
	तीव्रता	मध्यम	-	-	-	-
	सम्भावना	>75%	>75%	>75%	>75%	>75%
	चेतावनी	-	-	-	-	-
SAMBHAL/ सम्भल	वितरण	अनेक जगह	शुष्क	शुष्क	शुष्क	शुष्क
	तीव्रता	मध्यम	-	-	-	-
	सम्भावना	50-75%	>75%	>75%	>75%	>75%
	चेतावनी	-	-	-	-	-
SANTKABIR NAGAR/ संत कबीर नगर	वितरण	एक दो जगह	एक दो जगह	एक दो जगह	कुछ जगह	अनेक जगह
	तीव्रता	बूदाबांदी से हल्की	बूदाबांदी से हल्की	बूदाबांदी से हल्की	हल्की से मध्यम	मध्यम
	सम्भावना	<25%	<25%	<25%	25-50%	50-75%
	चेतावनी	-	तड़ित, झंझावात/वज्रपात	-	-	-
SHAHJAHANPUR/ शाहजहाँपुर	वितरण	अनेक जगह	एक दो जगह	एक दो जगह	शुष्क	शुष्क
	तीव्रता	मध्यम	बूदाबांदी से हल्की	बूदाबांदी से हल्की	-	-
	सम्भावना	50-75%	<25%	<25%	>75%	>75%
	चेतावनी	भारी-वर्षा	-	-	-	-
SHAMLI/ शामली	वितरण	अनेक जगह	शुष्क	शुष्क	शुष्क	शुष्क
	तीव्रता	मध्यम	-	-	-	-
	सम्भावना	50-75%	>75%	>75%	>75%	>75%
	चेतावनी	-	-	-	-	-
SHRAWASTI/ श्रावस्ती	वितरण	एक दो जगह	कुछ जगह	कुछ जगह	एक दो जगह	कुछ जगह
	तीव्रता	बूदाबांदी से हल्की	हल्की से मध्यम	हल्की से मध्यम	बूदाबांदी से हल्की	हल्की से मध्यम
	सम्भावना	<25%	25-50%	25-50%	<25%	25-50%



Govt. of India/भारत सरकार
Ministry of Earth Sciences/पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
India Meteorological Department/भारत मौसम विज्ञान विभाग
Regional Meteorological Centre Lucknow/प्रादेशिक मौसम केन्द्र लखनऊ



	चेतावनी	-	-	-	-	-
SIDDHARTH NAGAR/ सिद्धार्थ नगर	वितरण	एक दो जगह	कुछ जगह	कुछ जगह	कुछ जगह	अनेक जगह
	तीव्रता	बूदाबांदी से हल्की	हल्की से मध्यम	हल्की से मध्यम	हल्की से मध्यम	मध्यम
	सम्भावना	<25%	25-50%	25-50%	25-50%	50-75%
	चेतावनी	-	तड़ित, झंझावात/वज्रपात	-	-	-
SITAPUR/ सीतापुर	वितरण	कुछ जगह	एक दो जगह	एक दो जगह	शुष्क	शुष्क
	तीव्रता	हल्की से मध्यम	बूदाबांदी से हल्की	बूदाबांदी से हल्की	-	-
	सम्भावना	25-50%	<25%	<25%	>75%	>75%
	चेतावनी	तड़ित, झंझावात/वज्रपात	-	-	-	-
SONBHADRA/ सोनभद्र	वितरण	कुछ जगह	अनेक जगह	एक दो जगह	एक दो जगह	अनेक जगह
	तीव्रता	हल्की से मध्यम	मध्यम	बूदाबांदी से हल्की	बूदाबांदी से हल्की	मध्यम
	सम्भावना	25-50%	50-75%	<25%	<25%	50-75%
	चेतावनी	तड़ित, झंझावात/वज्रपात	तड़ित, झंझावात/वज्रपात	-	-	भारी-वर्षा
SULTANPUR/ सुल्तानपुर	वितरण	कुछ जगह	एक दो जगह	एक दो जगह	शुष्क	एक दो जगह
	तीव्रता	हल्की से मध्यम	बूदाबांदी से हल्की	बूदाबांदी से हल्की	-	बूदाबांदी से हल्की
	सम्भावना	25-50%	<25%	<25%	>75%	<25%
	चेतावनी	तड़ित, झंझावात/वज्रपात	-	-	-	-
UNNAO/ उन्नाव	वितरण	अनेक जगह	एक दो जगह	शुष्क	शुष्क	शुष्क
	तीव्रता	मध्यम	बूदाबांदी से हल्की	-	-	-
	सम्भावना	50-75%	<25%	>75%	>75%	>75%
	चेतावनी	तड़ित, झंझावात/वज्रपात, भारी-वर्षा	-	-	-	-
VARANASI/ वाराणसी	वितरण	कुछ जगह	कुछ जगह	एक दो जगह	शुष्क	एक दो जगह
	तीव्रता	हल्की से मध्यम	हल्की से मध्यम	बूदाबांदी से हल्की	-	बूदाबांदी से हल्की
	सम्भावना	25-50%	25-50%	<25%	>75%	<25%
	चेतावनी	तड़ित, झंझावात/वज्रपात	तड़ित, झंझावात/वज्रपात	-	-	-



मौसम उप-प्रभाग वार विस्तारित अवधि पूर्वानुमान (01.09.2026 to 07.09.2026)

क्रम संख्या	मौसम उप-प्रभाग वार	T _{max} (अधिकतम तापमान)	सामान्य साप्ताहिक T _{max}	T _{min} (न्यूनतम तापमान)	सामान्य साप्ताहिक T _{min}	वर्षा श्रेणी	सामान्य साप्ताहिक वर्षा
01.	पूर्वी उत्तर प्रदेश	सामान्य के आस-पास	-	सामान्य के आस-पास	-	सामान्य के आस-पास	-
02.	पश्चिमी उत्तर देश	सामान्य से अधिक	-	सामान्य से अधिक	-	सामान्य से कम	-

कृषि प्रभाव आधारित मौसम पूर्वानुमान

भारी से बहुत भारी वर्षा			
फसल	अवस्था	फसल पर असर पड़ने की संभावना	सलाह
गन्ना	तीव्र वृद्धि अवस्था	लंबे समय तक जलभराव से जड़ों में सड़न हो सकती है, फसल गिर सकती है और गन्ने की बढ़वार कम हो सकती है।	खेत से अतिरिक्त पानी की निकासी करें तथा गिरे हुए गन्ने को सहारा दें। भारी वर्षा के समय नत्रजन उर्वरकों का प्रयोग न करें।
अरहर	वानस्पतिक अवस्था	अधिक नमी से उकठा एवं जड़ गलन रोग का प्रकोप बढ़ सकता है।	खेत में जल निकासी की व्यवस्था रखें तथा फसल में मुरझाने व तना सड़न के लक्षणों की नियमित रूप से निगरानी करें।
खरीफ मक्का	घुटना/पुष्पगुच्छ निकलने की अवस्था	जलभराव से पौधों के गिरने एवं पोषक तत्वों के अवशोषण में कमी हो सकती है।	खेत से अतिरिक्त पानी निकालें तथा वर्षा रुकने के बाद ही उर्वरकों का प्रयोग करें।
धान	बाली निकलने की प्रारम्भिक अवस्था	लंबे समय तक जलभराव से पौधों की वृद्धि प्रभावित हो सकती है। और पोषक तत्व बह सकते हैं।	बारिश का पानी लंबे समय तक जमा न रहे, इसके लिए जल निकासी चैनलों का रखरखाव करें और क्षतिग्रस्त मेड़ों की मरम्मत करें।
मूँगफली	पुष्पन/पेग बनने की अवस्था	जलभराव से फली बनने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है तथा तना गलन रोग बढ़ सकता है।	अतिरिक्त पानी की शीघ्र निकासी करें तथा पूरी तरह गीली मिट्टी में कृषि का कोई कार्य न करें।
तिल	पुष्पन/फलियाँ बनने की अवस्था	अधिक वर्षा से फूल झड़ने एवं रोगों के प्रकोप की संभावना रहती है।	खेत से पानी की निकासी करें तथा फसल में लीफ स्पॉट (पत्तियों पर धब्बे) और फ़ाइलोडी बीमारी के लक्षणों रोगों की नियमित निगरानी करें।
उड़द/मूँग	पुष्पन/फली बनने की अवस्था	अधिक नमी से फूल झड़ने एवं जड़ गलन रोग का प्रकोप हो सकता है और फलियों का विकास ठीक से नहीं हो पाता है।	खेत से अतिरिक्त पानी निकालें तथा वर्षा के दौरान कीटनाशक का छिड़काव न करें।
सब्जी फसलें (भिंडी, लौकी, करेला, खीरा, टमाटर, बैंगन, हरी मिर्च, तोरई, लोबिया/ग्वारफली)	फलन अवस्था	भारी बारिश से फलों के सड़ने, पौधों के मुरझाने और कीटों व बीमारियों के फैलने की संभावना काफी बढ़ जाती है।	भारी बारिश से पहले पानी की सही निकासी सुनिश्चित करें, पौधों को सहारा देने वाले सिस्टम को मज़बूत करें और बाज़ार में बिकने लायक तैयार फलों की समय पर तुड़ाई कर लें।
केला/पपीता	फल विकास/परिपक्वता अवस्था	भारी बारिश के कारण केले के पौधों से फल गिर सकते हैं, तने टूट सकते हैं और पौधे ज़मीन पर गिर सकते हैं।	केले के पौधों को सहारा दें, गिरे हुए फलों को हटा दें और जड़ों के आस-पास पानी की निकासी की व्यवस्था बनाए रखें।





भाग-II: जनपदीय /क्षेत्रीय कृषि-मौसम सलाह

जारी दिनांक:- 27.08.2026

बुलेटिन सं. 69/26

फसल	फसल (अवस्था)	I) नोडल अधिकारी प्रयागराज :- जिले: फ़तेहपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, चित्रकूट और कौशांबी
खरीफ	चावल (टिल्लेरिंग)	अगर निचली पत्तियों के म्यान (leaf sheaths) पर शीथ ब्लाइट के धब्बे दिखाई दें, तो 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से ट्राइफ्लोक्सीस्ट्रोबिन 25% + टेबुकोनाज़ोल 50% का छिड़काव करें। इसके विकल्प के तौर पर, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से कार्बेन्डाज़िम 50 WP का छिड़काव करें।
	अरहर (फूल निर्माण)	फूल आने के समय, हेलिकोवर्पा (Helicoverpa) के लार्वा और खराब हुए फूलों की जाँच करें। यदि संक्रमण के कारण नियंत्रण की आवश्यकता हो, तो इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG @ 200 ग्राम/हेक्टेयर या स्पिनोसैड 45 SC @ 125 मिली/हेक्टेयर का छिड़काव करें।
	तिल (फली निर्माण)	जिन तिल के पौधों में फाइलोडी (phyllody) के लक्षण दिखें, उन्हें खेत से निकालकर नष्ट कर दें। कीट (वाहक) के लिए, यदि लीफहॉपर (leafhopper) का प्रकोप दिखे, तो 0.3 मिली/लीटर पानी के हिसाब से इमिडाक्लोप्रिड (Imidacloprid) 17.8 SL का छिड़काव करें।
	उड़द एवं मूंग (फूल निर्माण)	जिन पौधों में पीला मोज़ेक रोग के स्पष्ट लक्षण दिखाई दें, उन्हें हटा दें। यदि सफेद मक्खी की संख्या बढ़ रही है, तो इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL का 250 मिली/हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें।
	ज्वार (ज़ोरदार बढ़वार)	पौधे के ऊपरी हिस्से (वोरल) में 'डेड हार्ट' (सूखी हुई कोपल) की जाँच करें। प्रभावित टहनियों को हटाकर नष्ट कर दें। जहाँ संक्रमण ज़्यादा हो, वहाँ 200 ग्राम/हेक्टेयर की दर से इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG का छिड़काव करें।
	रागी (कल्ले निकलना)	जब पौधे में तेज़ी से कल्ले निकल रहे हों, तो चौड़ी पत्ती वाले बचे हुए खरपतवारों को हाथ से निराई-गुड़ाई करके हटा दें। कल्ले निकलने के इस अहम समय में खरपतवारों को मुख्य फसल से प्रतिस्पर्धा न करने दें।
	सोयाबीन (फलियाँ बनने का समय)	तनों पर घेरे (girdling rings) की जाँच करें। वयस्क भृगों (beetles) के निकलने से पहले घेरे वाले तने को काटकर नष्ट कर दें। यदि संक्रमण बढ़ रहा हो, तो 750 मिली/हेक्टेयर की दर से Thiacloprid 21.7 SC का छिड़काव करें।
	मक्का (तीव्र वृद्धि)	पौधे के ऊपरी हिस्से (वोरल) में लार्वा और ताज़ा नुकसान के निशान की जाँच करें। अगर कीड़ों का हमला हो गया है, तो स्पिनेटोरम 11.7 SC (350 मिली/हेक्टेयर) या एमेमेक्टिन बेंजोएट 5 SG (200 ग्राम/हेक्टेयर) का छिड़काव करें और छिड़काव सीधे वोरल पर करें।
गन्ना	वानस्पतिक	तेज़ी से बढ़ने के दौरान, फसल में रेड रॉट (लाल सड़न रोग) की जाँच करें। प्रभावित गुच्छों को हटा दें और उन्हें खेत से दूर नष्ट कर दें; बाद में बुआई के लिए बीमार गुच्छों से लिए गए टुकड़ों (सेट्स) का इस्तेमाल न करें।
सब्जियाँ	भिंडी (फूल निर्माण)	जिन पौधों में 'येलो-वेन मोज़ेक' के लक्षण दिखें, उन्हें उखाड़कर हटा दें। अगर सफ़ेद मक्खी (whitefly) मौजूद हो, तो 200 लीटर पानी प्रति एकड़ में 40 ग्राम 'थियामेथोक्सम 25 WG' (Thiamethoxam 25 WG) मिलाकर छिड़काव करें।
	बैंगन (फल बनना)	कीड़े से प्रभावित टहनियों और फलों को नियमित रूप से हटाकर नष्ट कर दें। यदि लगभग 4% टहनियाँ या 14% फल प्रभावित हों, तो क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 18.5 SC का 80 मिली/एकड़ की दर से छिड़काव करें।
	लौकी (कटाई)	जब बेलों की पत्तियाँ गीली हों, तो उन्हें तोड़ने या छूने से बचें। गीली मिट्टी के संपर्क में आने वाले फलों को हटा दें और लंबे समय तक नमी वाले मौसम में उनके सड़ने से बचाने के लिए उन्हें किसी साफ़ सहारे पर रखें।
	लौकी (फल निर्माण)	कीड़े लगे फलों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें। 10-12 ट्रेप प्रति हेक्टेयर की दर से मिथाइल यूजीनॉल ट्रेप लगाएं; जहाँ कीड़ों का प्रकोप ज़्यादा हो, वहाँ रजिस्टर्ड फ्रूट-प्लाइ बेट फॉर्मूलेशन का इस्तेमाल करें।
	मिर्च (वानस्पतिक)	नई पत्तियों और फूलों पर थ्रिप्स की जाँच करते रहें। अगर इनका प्रकोप बढ़ता है, तो 0.5 मिली प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्पिनेटोरम 11.7 SC का छिड़काव करें।
अमरुद	वानस्पतिक	नई कोपलों में गॉल (गांठ) बनने की जाँच करें। जहाँ संक्रमण दिखे, वहाँ थियामेथोक्सम (1 ग्राम/लीटर) + प्रोफेनोफोस (2 मिली/लीटर) + स्टिकर (0.5 मिली/लीटर पानी) का छिड़काव करें; ICAR-CISH अगस्त के तीसरे सप्ताह के आसपास पहला छिड़काव और उसके 15 दिन बाद दूसरा छिड़काव करने की सलाह देता है।
गाय	गाय	मानसून के उमस भरे मौसम में, जानवरों के बाड़े में साफ़ और सूखा बिछौना रखें और हवा के आने-जाने का अच्छा इंतज़ाम करें। गंदगी और पाचन संबंधी समस्याओं से बचने के लिए चारे के बर्तनों को साफ़ रखें।





जारी दिनांक:-27.08.2026

बुलेटिन सं. 69/26

फसल	फसल (अवस्था)	1) नोडल अधिकारी भरारी :- जिले जालौन, झाँसी, ललितपुर, महोबा, बांदा और हमीरपुर।
खरीफ	मूंगफली (वानस्पतिक)	किसानों को सलाह दी जाती है कि मूंगफली की बुवाई के 35-40 दिन बाद दूसरी बार निराई-गुड़ाई करें।
	उड़द (वानस्पतिक)	मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार, किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अरहर, मूंग और उड़द की फसलों में खरपतवार पर नियंत्रण रखें।
सब्जी	नींबू (वानस्पतिक)	किसानों को सलाह दी जाती है कि नींबू में सिट्रस कैंकर बीमारी को नियंत्रित करने के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलकर इस्तेमाल करें।
	बैंगन (रोपण)	किसानों को सलाह दी जाती है कि वे टमाटर, बैंगन, मिर्च, अगेती फूलगोभी, पत्तागोभी और गेंदे के पौधों को तैयार खेत में रोपें। सभी सब्जियों की फसलों में कीटों और रोगों का जैविक नियंत्रण किया जाना चाहिए।
	टमाटर (फल निर्माण)	जायद की फसलों और सब्जियों में यूरिया का इस्तेमाल ज़रूरत के हिसाब से ही करना चाहिए। गर्मियों के मौसम की सब्जियाँ, जैसे- लौकी, कद्दू, टमाटर, बैंगन, मिर्च, खीरा, तरबूज, खरबूज़ा वगैरह की बुवाई जल्द से जल्द पूरी कर लेनी चाहिए। गर्मियों की सब्जियों में फल छेदक (fruit borer) को काबू करने के लिए, हर एकड़ में 3-4 फेरोमोन टैप लगाने चाहिए। सब्जी की फसलों में रोएँदार इल्लियों, माहू और भृंग जैसे कीटों को काबू करने के लिए, हर 10 दिन के अंतराल पर नीम-आधारित एज़ाडिरैक्टिन बायो-कीटनाशक (5-7 मिली प्रति लीटर पानी) या नीम की गुठली का घोल (4% यानी 1 लीटर पानी में 40 ग्राम नीम की गुठली का पाउडर) छिड़कना चाहिए।
	अदरक (बुवाई)	किसान पूरे महीने सूरन, अदरक और हल्दी की बुवाई कर सकते हैं। अदरक और हल्दी की बुवाई के लिए प्रति हेक्टेयर 15 से 20 किंटल बीज पर्याप्त होते हैं। सूरन की बुवाई के लिए प्रति हेक्टेयर 70 से 80 किंटल बीज पर्याप्त होते हैं।
	प्याज (नर्सरी)	खरीफ प्याज के लिए नर्सरी में 10 जुलाई को बीज बोने चाहिए। खरीफ प्याज की रोपाई के लिए बीज की मात्रा 12-15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। सब्जियों में बुवाई के लगभग 25-30 दिन बाद, जब पौधे बढ़ रहे हों, तब बताई गई मात्रा में खाद डालें।
फल	आंवला (रोपाई)	किसानों को सलाह दी जाती है कि आम, अमरूद, लीची, आंवला, कटहल, नींबू, जामुन, बेर, पपीता आदि के नए बाग लगाने के लिए यह सही समय है।
	अमरूद (पौध रोपण)	किसानों को सलाह दी जाती है कि आम, अमरूद, लीची, आंवला, कटहल, नींबू, जामुन, बेर, पपीता आदि के नए बाग लगाने के लिए यह सही समय है।
गाय	गाय	मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए, किसानों को सलाह दी जाती है कि वे जानवरों को बारिश से बचाने के लिए उचित इंतजाम करें। पशुओं के बाड़े के फर्श को सूखा रखें। मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए पशु आश्रय के पास नीम की पत्तियों का धुआँ करें। पशुओं के बाड़े को जहाँ तक हो सके सूखा रखना चाहिए। भैंसों और गायों को संतुलित आहार (प्रति दिन 15-20 किग्रा हरा चारा और 2-3 किग्रा भूसा व आटा, सरसों की खली, मिनरल मिक्सचर या चावल की भूसी) दिया जाना चाहिए ताकि दूध उत्पादन पर असर न पड़े। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे गेहूँ के भूसे के साथ हरा चारा मिलाकर खिलाएं। जानवरों को छायादार जगह पर रखें, HS, BQ और FMD बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण करवाएं और दिन में तीन बार हरा चारा तथा ताज़ा और साफ़ पानी दें। आंतरिक परजीवियों को नियंत्रित करने के लिए गाय, भैंस, बकरी और भेड़ों में डीवॉर्मिंग (पेट के कीड़े मारने की दवा देना) की जानी चाहिए। पशुओं और पोल्टी के बाड़े में हवा के आने-जाने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।





जारी दिनांक:- 27.08.2026

बुलेटिन सं. 69/26

फसल	फसल (अवस्था)	नोडल अधिकारी अयोध्या:- जिले बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, अयोध्या, बस्ती, रायबरेली, अंबेडकरनगर, संत कबीरनगर, गोरखपुर, देवरिया और बलिया ।
चावल	वानस्पतिक	मौजूदा मौसम को देखते हुए, किसानों को सलाह दी जाती है कि वे धान की फसल की नियमित रूप से 'लीफ फोल्डर' या 'स्टेम बोरर' के लिए निगरानी करें, क्योंकि फसल अभी बढ़वार की अवस्था में है। 'स्टेम बोरर' की निगरानी के लिए धान के खेतों में 3-4 प्रति एकड़ की दर से कीट-विशिष्ट फेरोमोन ट्रेप लगाने की सलाह दी जाती है।
चावल	बढ़ाव	अगर धान के खेत में पौधे पीले पड़ने लगें, यानी ऊपर की पत्तियां पीली हो जाएं और नीचे की पत्तियां हरी ही रहें, तो किसान जिंक सल्फेट का घोल (6.0 किलोग्राम जिंक सल्फेट को 300 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर) छिड़क सकते हैं।
अरहर	बुवाई	अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ या लगातार बारिश की वजह से बुआई में देरी हो जाती है, तो सितंबर के पहले पखवाड़े में 'बहार' और 'PDA-11' किस्मों की शुद्ध फसल के तौर पर बुआई की जा सकती है। लेकिन ध्यान रखें कि कतारों के बीच 30 सेमी की दूरी हो और बीज की मात्रा 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखी जाए।
मूंग	बुवाई	मूंग की आजाद मूंग 1, पंत मूंग 1, पंत मूंग 3, पूसा 1431, मेहा 99-125, एमएच-2.15 आदि किस्मों की बुआई करें। टीएम-9937, मालविया, जन कल्याणी, मालविया, जनचेतना, मालविया जनप्रिया, मालविया जागृति, मालवीय ज्योति, पंत मूंग 4, नरेंद्र मूंग 1, पीडीएम-11, आशा।
लोबिया	बुवाई	खरीफ के मौसम में लोबिया की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर 15-20 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुवाई से पहले बीजों को राइजोबियम बैक्टीरिया से उपचारित करना चाहिए।
ज्वार	बुवाई	अगर बुवाई अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो जल्द से जल्द ज्वार की सुझाई गई कम्पोजिट किस्मों (जैसे वर्षा, CSB-13, CSV-15, SPV1388 (बुंदेला) और विजेता) और हाइब्रिड किस्मों (जैसे CSH-16, CSH-9, CSH-14, CSH-18, CSH-13, HTJH-3208 और CSH-23) की बुवाई करें।
गन्ना	भव्य विकास	बोरर कीटों के जैविक नियंत्रण के लिए, प्रति हेक्टेयर 8 से 10 जगहों पर 50 हजार ट्राइकोग्रामा अंडों वाले ट्राइकोकार्ड लगाएं। कार्ड को टुकड़ों में काटें और उन्हें पत्तियों के निचले हिस्से पर स्टेपल करें। इस काम को 10 दिन के अंतराल पर दोहराएं। रेड रॉट बीमारी से प्रभावित खेतों में मेड़ बनाएं, ताकि स्वस्थ फसल संक्रमित सिंचाई के पानी से प्रभावित न हो। रेड रॉट बीमारी से प्रभावित गुच्छों/सिरों को उखाड़कर नष्ट कर दें और उखाड़ी गई जगह का ट्राइकोडर्मा से उपचार करें; साथ ही बचाव के लिए 0.2 प्रतिशत मिथाइल का ड्रेनिंग करें।
सब्जी	गाजर (बुआई)	गाजर की बुआई ऊँची क्यारियों (raised beds) पर की जा सकती है। बीज की मात्रा - हाथ से बुआई के लिए 3.5-4.0 किलोग्राम प्रति एकड़ और मशीन से बुआई के लिए 1.0 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे मशीन से गाजर की बुआई करें क्योंकि इससे बीज की मात्रा कम लगती है, उपज की गुणवत्ता बेहतर होती है और पैदावार बढ़ती है। खेतों में पानी की निकासी का उचित प्रबंध होना चाहिए। FYM (गोबर की खाद) और फास्फोरस उर्वरक के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है। कैप्टान (Captan) से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीज उपचार करने की सलाह दी जाती है।
	अदरक (गाठ बनना)	हल्दी और अदरक की फसल में पानी की निकासी का इंतज़ाम करें और सलाह के अनुसार नाइट्रोजन का इस्तेमाल करें।
फल	आम (पौध लगाना)	बागों में पानी की निकासी का सही इंतज़ाम करें। आम, अमरूद, आंवला, लीची और नींबू की बेहतर किस्मों के नए बाग लगाने का काम जल्द से जल्द पूरा करें और पहले से लगे बागों में जो पौधे किसी वजह से मर गए हैं, उनकी जगह नए पौधे लगाएं। आम के बाग के शुरुआती 10 सालों में ज्यादा मुनाफ़े के लिए आलू, मिर्च, टमाटर, लोबिया और ग्लैडियोलस की खेती इंटरक्रॉप के तौर पर की जा सकती है।
भैंस/गाय	गाय	अभी सभी पशु चिकित्सालयों में 30 अगस्त तक खुरपका-मुंहपका रोग (FMD) और ब्रुसेल्लोसिस के लिए टीकाकरण किया जा रहा है। पशुओं का टीकाकरण सुनिश्चित करें।





जारी दिनांक:-27.08.2026

बुलेटिन सं. 69/26

फसल	फसल (अवस्था)	1) नोडल अधिकारी कानपुर :- जिले: कन्नौज, हाथरस, मथुरा, आगरा, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर शहर, उन्नाव, लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर-खीरी, काशीराम नगर, सीतापुर।
खरीफ़	मक्का (सिलिकिंग)	मक्के की फसल में बारिश न होने पर, टेसलिंग (नर फूल) आने के समय यूरिया की दूसरी टॉप-ड्रेसिंग 60 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से करनी चाहिए। मक्के की फसल में स्टेम बोरोर या शूट फ्लाई कीट के हमले की संभावना रहती है, इसलिए इनकी रोकथाम के लिए साफ मौसम में 500-600 लीटर पानी में 200 ग्राम/हेक्टेयर 'इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG' मिलाकर छिड़काव करें।
	चावल (कल्ले निकलने की अवस्था)	अगर धान की फसल में रूट बोरोर कीट का हमला दिखे, तो 3 से 4 सेंटीमीटर रुके हुए पानी में 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 4% दानेदार रसायन का छिड़काव करें। अगर धान की फसल में हॉपर कीट का हमला दिखे, तो इसे रोकने के लिए, जब आसमान साफ हो, तब 500-600 लीटर पानी में 125 मिलीलीटर इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL या 1.50 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से क्लोरपायरीफॉस 20% EC मिलाकर छिड़काव करें।
	तिल (पुष्प निर्माण)	तिल की फसल में पत्ती और फल खाने वाले इल्ली (leaf and fruit bollworm) के प्रकोप की संभावना है, इसलिए इसकी रोकथाम के लिए साफ मौसम में 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से Emamectin Benzoate 5% SG का 500-600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।
	मूंगफली (फूल निर्माण)	मूंगफली की फसल में सफेद गिडार या दीमक का प्रकोप होने की संभावना रहती है, इसलिए साफ मौसम में 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से फिप्रोनिल 0.3% GR का टॉप-ड्रेसिंग करें।
	उड़द (वानस्पतिक)	उड़द की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए, बुवाई के 15-20 दिन बाद 1.0 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से इमेज़ेथापायर 10 SL (Imazethapyr 10 SL) को 500-600 लीटर पानी में मिलाकर साफ मौसम में छिड़काव करें।
	मूंग (वानस्पतिक)	मूंग की फसल में खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए, बुवाई के 15-20 दिन बाद 1.0 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से इमेज़ेथापायर (Imazethapyr) 10 SL का 500-800 लीटर पानी में घोल बनाकर साफ मौसम में छिड़काव करें। खरीफ में बोई जाने वाली मूंग की अनुशंसित किस्में हैं - नरेंद्र मूंग-1, पंत मूंग-1, पंत मूंग-3, पंत मूंग-4, सम्राट, मालवीय जनचेतना, मालवीय जनप्रिया, मालवीय जागृति, श्वेता, स्वाति, विराट और IPM-2-14 आदि। इनमें से किसी भी एक किस्म की बुवाई 12-15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से करें और बारिश न होने की स्थिति में बुवाई का काम जल्द पूरा करने का प्रयास करें।
गन्ना	भव्य विकास	अगर गन्ने की लंबाई पाँच फीट हो गई है, तो ढाई फीट की ऊँचाई पर पहली बार बंधाई करें। पहली बंधाई के लिए, गन्ने के दो गुच्छों को एक लाइन में नीचे की सूखी पत्तियों के साथ बांधें। रेड रॉट बीमारी से प्रभावित पौधों को जड़ों सहित उखाड़कर नष्ट कर दें और पौधों पर थियोफिनेट मिथाइल 0.2 प्रतिशत के घोल का छिड़काव करें। गन्ने में माइट कीट का प्रकोप देखा जा रहा है; इसके नियंत्रण के लिए, 625 लीटर पानी में 750 मिली प्रोफेनोफोस 40 प्रतिशत + साइपर 4 प्रतिशत कीटनाशक मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें।
फल	आम (रोपण)	आम, अमरूद, आंवला, नींबू आदि के लिए पहले से तैयार गड्ढों में नए पौधे लगाएं। खराब हो चुके पौधों की जगह नए पौधे लगाएं। केले या पपीते के पौधों के तने के चारों ओर 25-30 सेंटीमीटर ऊँची मिट्टी की मेड़ बनाएं। आम के पत्तों के कीट (लीफ मॉथ) से बचाव के लिए, साफ मौसम में 2% कार्बराइल या 1.5% डस्ट का छिड़काव करें।
सब्जी	गोभी (रोपण)	बैंगन, मिर्च, टमाटर और अगेती फूलगोभी जैसी खरीफ़ फसलों के पौधों की रोपाई करें। अगर खेत में पानी जमा होने की संभावना हो, तो अगेती फूलगोभी, बैंगन, टमाटर, मिर्च आदि को मेड़ों पर लगाएं। अगर सब्जी वाली फसलों में फ्रूट बोरोर या लीफ बोरोर का प्रकोप हो, तो इसे नियंत्रित करने के लिए 1.5 मिलीलीटर नीम का तेल प्रति लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाएं और आसमान साफ होने पर 6-10 दिनों के अंतराल पर 3-4 बार इसका छिड़काव करें।
गाय / भैंस	भैंस	किसानों को सलाह दी जाती है कि बारिश के मौसम में जानवरों में जूँ लगने का खतरा बढ़ जाता है। इससे बचने के लिए, पशुशाला में चूना छिड़कें ताकि जूँ के अंडे और लार्वा खत्म हो जाएं। बारिश के दौरान जानवरों को खुली जगह या पेड़ों के नीचे न बांधें। जानवरों को खुली जगह पर तभी बांधें जब रात में आसमान साफ हो। दिन के समय जानवरों को छायादार जगह पर बांधें। खुरपका-मुंहपका रोग (FMD) से बचाने के लिए जानवरों को FMD वैक्सीन और डेंगू बुखार से बचाने के लिए VQ वैक्सीन लगवाएं। जानवरों को हरे और सूखे चारे के साथ-साथ पर्याप्त मात्रा में अनाज भी दें। जानवरों को दिन में 3-4 बार साफ और ताजा पानी जरूर दें। गर्भवती जानवरों को ढलान वाली जगह पर न बांधें। पेट के कीड़ों से बचाने के लिए जानवरों को डीवॉर्मिंग की दवा देने का यह सही समय है।





जारी दिनांक:- 27.08.2026

बुलेटिन सं. 69/26

फसल	फसल (अवस्था)	II) नोडल अधिकारी मोदीपुरम:-जिले मेरठ, पीलीभीत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, अलीगढ़, बुलंदशहर, मुरादाबाद, ज्योतिबाफुलेनगर, बिजनौर, बदायूं, बरेली, रामपुर, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, शामली, सम्भल और हापुड़।
धान	वानस्पतिक	धान में तना छेदक कीट की रोकथाम के लिए, ट्राइकोडर्मा (Trichoderma) नामक परजीवी का इस्तेमाल 8 से 10 दिनों के अंतराल पर करना चाहिए। प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 4G (Cartap hydrochloride 4G) दवा का इस्तेमाल 4 से 5 सेमी पानी के साथ करें या फिर 600 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर 1.0 लीटर फिप्रोनिल 5 SC (Fipronil 5 SC) का छिड़काव करें।
मूंगफली	वानस्पतिक	मूंगफली में दूसरी बार निराई-गुड़ाई और मिट्टी चढ़ाने के 30 से 40 दिन बाद, टिक्का रोग की रोकथाम के लिए 1000 लीटर पानी में 5 किलोग्राम मैन्कोजेब (mancozeb) मिलाकर प्रति हेक्टेयर 10 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़काव करें।
अरहर	सामान्य	अरहर की फसल में पानी की निकासी का उचित प्रबंध करें।
मूंग	बुवाई	जब मिट्टी में पर्याप्त नमी हो, तब मूंग की बेहतर किस्मों जैसे मालवीय जनक्रांति, IPM-404-4, सूर्य (IPMS-12-1), आजाद मूंग-1 (KM-2342), पूसा-1431, कनिका (IPM-302-2), वर्षा (IPM-2-4-9), मेहा 99-125, IPM-2-14, विराट (IPM-205-7) और स्वाति (KM-2195) की बुवाई करें। • मूंग के लिए बीज उपचार: यदि बीज उपचारित नहीं हैं, तो 1 किलोग्राम बीज को 2 ग्राम थिरम + 1 ग्राम कार्बेन्डाजिम से उपचारित करें। फिर बुवाई से पहले 10 किलोग्राम बीज को राइजोबियम कल्चर के एक पैकेट से उपचारित (इनोक्युलेट) करें।
उड़द	बुवाई	जब मिट्टी में पर्याप्त नमी हो, तब उड़द की बेहतर किस्मों जैसे Mash-1190, PU-11, Pant Urd-12, KPU-12-1735 (Kota Urd-1), Pant Urd-8, Pant Urd-9, IPU-13-1, IPU-11-02, Vallabh Urd और IPU-2-43 की बुवाई करें। उड़द के लिए बीज उपचार: यदि बीज उपचारित नहीं हैं, तो 1 किलोग्राम बीज को 1 ग्राम कार्बेन्डाजिम या 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा से उपचारित करें। फिर बुवाई से पहले 10 किलोग्राम बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करें। सफेद मक्खी का प्रबंधन: उड़द और मूंग में सफेद मक्खी को नियंत्रित करने के लिए, इनमें से किसी एक का छिड़काव करें। डाइमैथोएट 30 EC @ 1 लीटर प्रति हेक्टेयर, या ऑक्सीडेमेटोन-मिथाइल 25 EC @ 1 लीटर प्रति हेक्टेयर।
मूली		मूली की एशियाई किस्मों, जैसे जापानी सफेद और पूसा चेतकी, की बुवाई इस महीने की शुरुआत में की जा सकती है। मूली के लिए प्रति हेक्टेयर 6 से 8 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है।
गन्ना	भव्य विकास	रेड रॉट बीमारी से संक्रमित गन्ने के पौधों को उनकी जड़ों सहित उखाड़कर नष्ट कर दें। हटाने के बाद, मिट्टी में 0.2% थियोफाइनैट मिथाइल (Thiophanate Methyl) का घोल डालें। गन्ने की फसल में माइट (कीट) का प्रकोप देखा गया है। इसे नियंत्रित करने के लिए, 1.5 मिली प्रति लीटर पानी की दर से प्रोपार्गाइट (Propargite) का छिड़काव करें। पेड़ी (ratoon) गन्ने की फसल से अधिक उपज पाने के लिए, 2 किग्रा प्रति एकड़ की दर से पानी में घुलनशील NPK (19:19:19) का पत्तियों पर छिड़काव करें। जिन किसानों ने शरदकालीन गन्ने की बुवाई के लिए अपने खेत खाली रखे हैं, उन्हें ढैंचा (Sesbania) बोना चाहिए और 50-55 दिनों के बाद इसे हरी खाद के रूप में मिट्टी में मिला देना चाहिए। वसंत ऋतु में बोई गई गन्ने की फसल की अच्छी बढ़त के लिए, जब मिट्टी में पर्याप्त नमी हो, तो पत्तियों पर नैनो यूरिया (2.5 मिली) और नैनो डीएपी (2.5 मिली प्रति लीटर पानी) का छिड़काव करें। शरदकालीन फसल में पर्याप्त कल्ले (tillers) निकलने के बाद, अवांछित कल्लों को रोकने और फसल की स्वस्थ बढ़त में मदद के लिए मिट्टी चढ़ाने (earthing-up) का काम करें। कीटों को छिपने की जगह न मिले, इसके लिए गन्ने के पौधों के निचले एक-तिहाई हिस्से से सूखी पत्तियां हटा दें। सुनिश्चित करें कि गन्ना सर्वेक्षण (सत्ता प्रदर्शन सर्वेक्षण) में आपकी सभी जानकारी सही-सही दर्ज की गई है। इस सर्वेक्षण के माध्यम से किसान सामाजिक कल्याण योजना के बारे में भी जानकारी दी जा रही है और किसानों को इसका लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
सब्जी	लौकी	लौकी की बेलों के लिए मचान (सहारा) बनाएं। सभी सब्जियों की फसलों में पानी की उचित निकासी की व्यवस्था करें।
	कद्दू (फूल निर्माण)	खरीफ़ के मौसम में, कुकुरबिट (कद्दू-वर्गीय) सब्जियों को 6-8 फ़ीट ऊँचे मचान (ट्रेलिस सिस्टम) पर उगाएँ। मचान बनाने के लिए बाँस या लोहे के खंभों का इस्तेमाल करें।
भैंस/गाय	भैंस	पशुओं में प्रजनन संबंधी विकारों और उनसे जुड़ी बीमारियों को रोकने के लिए, किसानों को सलाह दी जाती है कि वे हरे चारे, सूखे चारे और संतुलित पशु आहार के साथ-साथ नियमित रूप से मिनरल मिक्सचर भी दें। पशुपालन विभाग चारे का उत्पादन बढ़ाने के लिए मुफ्त चारा बीज मिनी-किट और हाइब्रिड नेपियर घास की जड़ें (रूट स्लिप्स) उपलब्ध कराने की योजना चला रहा है। किसान जिला मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय या निकटतम पशु चिकित्सालय से संपर्क करके इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। विभाग किसानों और पशुपालकों के घर-द्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई (MVU) का संचालन कर रहा है।





जारी दिनांक:- 27.08.2026

बुलेटिन सं. 69/26

फसल	फसल (अवस्था)	1) नोटल अधिकारी वाराणसी :- जिले वाराणसी, आजमगढ़, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, संतरविदासनगर, जौनपुर और मऊ।
धान	वानस्पतिक	पत्तियों के रंग के आधार पर यूरिया डालें। गहरे हरे रंग की पत्तियों पर ज्यादा यूरिया न डालें। बारिश के बाद खेत की मेड़ों पर बने चूहों के बिलों को बंद कर दें।
अरहर	वानस्पतिक	पानी जमा न होने दें, हल्की निराई-गुड़ाई करें और तना सड़न व कीट-पतंगों पर नज़र रखें।
तिल	फूल निर्माण	खेत में जल-निकासी की व्यवस्था बनाए रखें और पत्तियों में बीमारी के लक्षणों पर नज़र रखें।
मक्का	वानस्पतिक	बारिश का अतिरिक्त पानी तुरंत निकाल दें और पानी जमा रहने का समय कम से कम रखें। फॉल आर्मीवर्म और स्टेम बोरर के लिए नियमित रूप से निगरानी करें। मिट्टी के दबने (कॉम्पैक्शन) से बचने के लिए, जब मिट्टी बहुत ज्यादा गीली हो, तब खेत में कोई काम न करें।
मूंग	वानस्पतिक	बारिश का अतिरिक्त पानी तुरंत निकाल दें और पानी जमा रहने का समय कम से कम रखें। फॉल आर्मीवर्म और स्टेम बोरर के लिए नियमित रूप से निगरानी करें। मिट्टी के दबने (कॉम्पैक्शन) से बचने के लिए, जब मिट्टी बहुत ज्यादा गीली हो, तब खेत में कोई काम न करें।
भिन्डी	फल परिपक्वता	बारिश के बाद हल्की गुड़ाई करें, पीले चिपचिपे ट्रैप लगाएं और संक्रमित पत्तियां हटा दें।
लौकी	फल परिपक्वता	फलों को गीली मिट्टी से बचाने के लिए उनके नीचे सूखी घास-फूस, मल्च या प्लास्टिक बिछा दें।
गाय	गाय	बारिश के तुरंत बाद गीला हरा चारा न खिलाएं; पहले उसे छांव में सुखा लें। खुरों को रोज़ाना साफ़ और सूखा रखें।

- अगला बुलेटिन 01.09.2026 को जारी किया जाएगा।

प्रादेशिक मौसम केन्द्र लखनऊ





Govt. of India/भारत सरकार
Ministry of Earth Sciences/पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
India Meteorological Department/भारत मौसम विज्ञान विभाग
Regional Meteorological Centre Lucknow/प्रादेशिक मौसम केन्द्र, लखनऊ



LEGENDS

WARNING

WARNING (TAKE ACTION)
ALERT (BE PREPARED)
WATCH (BE UPDATED)
NO WARNING (NO ACTION)

Probabilistic Forecast

Terms	Probability of Occurrence (%)
Unlikely	< 25
Likely	25 - 50
Very Likely	50 - 75
Most Likely	> 75



Rain/ Snow *

Heavy: 64.5 to 115.5 mm/cm *
 Very Heavy: 115.6 to 204.4 mm/cm *
 Extremely Heavy: > 204.4 mm/cm *



Heat Wave

When maximum temperature of a station reaches $\geq 40^{\circ}\text{C}$ for plains and $\geq 30^{\circ}\text{C}$ for hilly regions

(a) Based on Departure from normal

Heat Wave: Maximum Temperature Departure from normal 4.5°C to 6.4°C .

Severe Heat Wave: Maximum Temperature Departure from normal $\geq 6.5^{\circ}\text{C}$

(b). Based on Actual maximum temperature

Heat Wave: When actual maximum temperature $\geq 45^{\circ}\text{C}$.

Severe Heat Wave: When actual maximum temperature $\geq 47^{\circ}\text{C}$

(c). Criteria for heat wave for coastal stations

When maximum temperature departure is $> 4.5^{\circ}\text{C}$ from normal. Heat Wave may be described provided maximum temperature $\geq 37^{\circ}\text{C}$



Warm Night

When maximum temperature remains 40°C

Warm Night: When minimum temperature departure 4.5°C to 6.4°C .

Severe Warm Night: When minimum temperature departure $> 6.4^{\circ}\text{C}$.



Cold Wave

When minimum temperature of a station $\leq 10^{\circ}\text{C}$ for plains and $\leq 0^{\circ}\text{C}$ for hilly regions.

(a). Based on departure

Cold Wave: Minimum Temperature Departure from normal -4.5°C to -6.4°C .

Severe Cold Wave: Minimum Temperature Departure from normal $\leq -6.5^{\circ}\text{C}$

(b) Based on actual Minimum Temperature (for Plains only)

Cold Wave: When Minimum Temperature is $\leq 4.0^{\circ}\text{C}$

Severe Cold Wave: When Minimum Temperature is $\leq 2.0^{\circ}\text{C}$

(c) For Coastal Stations

When Minimum Temperature departure is $\leq -4.5^{\circ}\text{C}$ & actual Minimum Temperature is $\leq 15^{\circ}\text{C}$



Cold Day

When minimum temperature of a station $\leq 10^{\circ}\text{C}$ for plains and $\leq 0^{\circ}\text{C}$ for hilly regions

Based on departure

Cold Day: Maximum Temperature Departure from normal -4.5°C to -6.4°C .

Severe Cold Day: Maximum Temperature Departure from normal $\leq -6.5^{\circ}\text{C}$



Fog

Phenomenon of small droplets suspended in air and the horizontal visibility $< 1\text{km}$

Moderate Fog: When the visibility between 500-200 metres

Dense Fog: when the visibility between 50- 200 metres

Very Dense Fog: when the visibility < 50 metres



Thunderstorm

Sudden electrical discharges manifested by a flash of light (Lightning) and a sharp rumbling sound (thunder)



Dust/Sand Storm

An ensemble of particles of dust or sand energetically lifted to great heights by a strong and turbulent wind.



Frost

Ice deposits on ground

Air temperature $\leq 4^{\circ}\text{C}$ (over Plains)



Squall

A strong wind that rises suddenly, lasts for atleast 1 minute.

Moderate: Wind speed 52-61 kmph

Severe: Wind speed 62-87 kmph

Very Severe: Wind speed > 87 kmph



Sea State

Effect of various waves in the sea over specific area

Rough to very rough: Wind speed 41-62 kmph (22-33 knots) & Wave height 2.5-6 metre

High to very high: Wind speed 63-117 kmph (34-63 knots) & Wave height 6-14 metre

Phenomenal: Wind speed > 117 kmph (> 63 knots) & Wave height > 14 metre



Cyclone

Cyclonic Storm: Wind speed 62-87 kmph (34-47 knots)

Severe Cyclonic Storm: Wind speed 88-117 kmph (48-63 knots)

Very Severe Cyclonic Storm: Wind speed 118-165 kmph (64 - 89 knots)

Extremely Severe Cyclonic Storm: Wind speed 166-220 kmph (90 -119 knots)

Super Cyclone Storm: Wind speed > 220 kmph (> 119 knots)

For More Updates



<https://mausam.imd.gov.in/lucknow/>



[@CentreLucknow](https://twitter.com/CentreLucknow)



<https://www.facebook.com/mclucknow>



0522-2436283



<https://imdgeospatial.imd.gov.in/>



mclucknow@gmail.com




UTTAR PRADESH COMPOSITE STATE AGRO-METEOROLOGICAL ADVISORY BULLETIN

ISSUED ON: 27.08.2026

BULLETIN NO. 69/26

(Valid for the period from 27.08.2026 (0830 IST) to 01.09.2026 (0830 IST))



NINE AGRO-CLIMATIC ZONES OF UTTAR PRADESH

S.No.	Agro-Climatic Zone	Districts	Agro-Meteorological Field Unit (AMFU)
1	Bhabhar-Tarai Zone (BTZ)	Bahraich, Lakhimpur kheri, Pilibhit, Rampur, Moradabad, Bijnor, Saharanpur.	BAHRAICH, KANPUR, MEERUT (MODIPURAM).
2	Western Plain Zone (WPZ)	Shamali, Muzaffarnagar, Baghpat, Meerut, Ghaziabad, Hapur, Gautam Buddha Nagar, Bulandshahr.	MEERUT (MODIPURAM).
3	Central-Western Plain Zone (CWPZ)	Amroha (Jyotiba Phule Nagar), Sambhal, Badaun, Bareilly, Shahjahanpur, Sitapur.	MEERUT (MODIPURAM), KANPUR.
4	South-Western Semi-Arid Plain (SWSAPZ)	Aligarh, Mathura, Hathras, Kanshiram Nagar (Kansganj), Etah, Firozabad, Mainpuri, Agra.	MEERUT (MODIPURAM), KANPUR.
5	Central Plain Zone (CPZ)	Etawah, Farrukhabad, kannauj, Hardoi, Auraiya, Lucknow, Kanpur Dehat, Kanpur Nagar, Unnao, Fatehpur, Raebareli, Kaushambi.	KANPUR, PRAYAGRAJ, AYODHYA, MEERUT (MODIPURAM)
6	Bundelkhand Zone (BZ)	Jhansi, Jalaun, Hamirpur, Mahoba, Banda, Chitrakoot, Lalitpur.	JHANSI (BHARARI), PRAYAGRAJ
7	North-Eastern Plain Zone (NEPZ)	Gorakhpur, Gonda, Balrampur, Basti, Shravasti, Sant Kabir nagar, Kushinagar, Deoria, Siddharthnagar, Mahrajganj.	BAHRAICH, AHYODHYA
8	Eastern Plain Zone (EPZ)	Barabanki, Amethi, Ayodhya, Pratapgarh, Sultanpur, Ambedkar Nagar, Jaunpur, Azamgarh, Sant Ravidas Nagar (Bhadohi), Mau, Varanasi, Gazipur, Ballia, Chandauli.	AYODHYA, PRAYAGRAJ, VARANASI.
9	Vindhyan Zone (VZ)	Prayagraj, Mirzapur, Sonbhadra.	PRAYAGRAJ, VARANASI.





Govt. of India/भारत सरकार
Ministry of Earth Sciences/पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
India Meteorological Department/भारत मौसम विज्ञान विभाग
Regional Meteorological Centre Lucknow/प्रादेशिक मौसम केन्द्र लखनऊ



PART-I: WEATHER

i. Realized Rainfall during the period from 26.08.2026 –27.08.2026

Rainfall (mm)	Periodic Rainfall during (26.08.2026 –27.08.2026)				Cumulative Seasonal Rainfall (Since 01.06.2026)			
	Actual	Normal	%age Departure	Rainfall Category	Actual	Normal	%age Departure	Rainfall Category
Agro-Climatic Zones								
Uttar Pradesh	32.9	14.8	+122	Large Excess	516.7	571.0	-10	Normal
East Uttar Pradesh	29.2	15.1	+94	Large Excess	502.3	604.7	-17	Normal
West Uttar Pradesh	38.2	14.5	+163	Large Excess	536.8	523.9	+02	Normal

Rainfall %age Departure during the period (26.08.2026 –27.08.2026)

Cumulative Rainfall during the period (w.e.f. 01.06.2026)

**INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT
MC LUCKNOW**



**INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT
MC LUCKNOW**

Rainfall % Departures from the Long Period Averages for Districts in UTTAR PRADESH

Rainfall % Departures from the Long Period Averages for Districts in UTTAR PRADESH

PERIOD : 26.08.2026 - 27.08.2026

PERIOD : 01.06.2026 - 27.08.2026



LEGEND: ■ L. EXCESS (+60% OR MORE) ■ EXCESS (+20% TO +59%) ■ NORMAL (+19% TO -19%)
■ DEFICIENT (-20% TO -59%) ■ L. DEFICIENT (-60% TO -99%) ■ NO RAIN (-100%) ■ NO DATA

LEGEND: ■ L. EXCESS (+60% OR MORE) ■ EXCESS (+20% TO +59%) ■ NORMAL (+19% TO -19%)
■ DEFICIENT (-20% TO -59%) ■ L. DEFICIENT (-60% TO -99%) ■ NO RAIN (-100%) ■ NO DATA

ii. Agro-Climatic Zonewise Significant Weather during 26.08.2026 to 27.08.2026

Agro-Climatic zones	Rainfall (≥ 5cm)
Bhabhar-Tarai Zone	27.08.2026:- Bahraich-6, Kaiserganj-7, Mahsi-5, Bilaspur-5, Sahabad-5, Suar-5, Bilari-16, Moradabad -5.
Western Plain Zone	Nil
Central-Western Plain Zone	26.08.2026:- Baheri-5. 27.08.2026:- Chandausi-8, Sahaswan-15
Semi-Arid South-Western Plain	Nil
Central Plain Zone	26.08.2026:- Bindki-7, Fatehpur Observatory-6, Kanpur Observatory-8, Kanpur Airport-7, Kanpur Tehsil-8, Chakkar Nagar-11, Etawah -5, Dalmau -7, Rae Bareilly Cwc-10. 27.08.2026:- Ankinghat-8, Kanpur Airport-5, Auraiya -5, Kannauj-5, Kannauj-5, Tirwa-5, Kaimganj-5, Hasanganj-5, Hardoi Observatory-5, Hardoi Tehsil-5.
Bundelkhand Zone	26.08.2026:- Attarra-9, Badusa-10, Banda-10, Banda Cwc-12, Beberu-11, Chillaghat-7, Naraini-10, Charkhari-13, Mahoba-16, Hamirpur Cwc-6, Hamirpur Observatory -6, Maudaha-5, Rath-22, Shahjina -6, Madawara-5, Jhansi-6, Moth-6, Jalaun-5, Kalpi Cwc-11, Konch-9, Orai-7. 27.08.2026:- Attarra-8, Banda-10, Banda -6, Beberu-10, Naraini-9, Charkhari-10, Kulpahar-14, Mahoba-16, Talbehat-8, Jhansi-6, Mauranipur-8, Jalaun-5, Kalpi -5.
North-Eastern Plain Zone	27.08.2026:- Gonda -13, Gonda Sadar-13.
Eastern Plain Zone	26.08.2026:- Amethi-5, Chandauli-12, Ghazipur Observatory -5, Jalalpur Fmo-8, Kunda-6 . 27.08.2026:- Ballia Observatory -6.
Vindhyan Zone	26.08.2026:- Meja-6. 27.08.2026:- Ghorawal-5.



0522-2436283



<https://imdgeospatial.imd.gov.in/>



mclucknow@gmail.com



Govt. of India/भारत सरकार
Ministry of Earth Sciences/पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
India Meteorological Department/भारत मौसम विज्ञान विभाग
Regional Meteorological Centre Lucknow/प्रादेशिक मौसम केन्द्र लखनऊ



iii. Agro-Climatic Zone wise Past Weather during 25.08.2026 (0830 IST) to 27.08.2026 (0830 IST)

Agro-Climatic Zones	Mean Maximum Temperature (°C)		Mean Minimum Temperature (°C)		Mean Relative Humidity (%)		Wind (Speed/Direction)		Cloud, (Okta)
	Actual (Departure)	Category	Actual (Departure)	Category	0830 IST RH	1730 IST RH	(KMPH)	Direction	
Bhabhar-Tarai Zone (BTZ)	32.4 (-0.4)	↔	25.4 (+0.2)	↔	93	84	02-10	NE-NW	5-8
Western Plain Zone (WPZ)	33.8 (+0.9)	↔	26.1 (+1.3)	↔	91	78	04-08	NE-NW	5-8
Central-Western Plain Zone (CWPZ)	32.3 (-0.7)	↔	25.8 (+0.3)	↔	93	86	00-02	W-NW	3-8
South-Western Semi-Arid Plain (SWSAPZ)	32.1 (-0.9)	↔	26.2 (+1.2)	↔	93	87	00-06	SW-NW	5-8
Central Plain Zone (CPZ)	31.7 (-1.4)	↔	25.3 (-0.1)	↔	92	88	04-12	NE-NW	5-8
Bundelkhand Zone (BZ)	31.1 (-1.7)	↓	25.3 (-0.1)	↔	92	88	02-06	NE-NW	7-8
North-Eastern Plain Zone (NEPZ)	32.9 (-0.2)	↔	26.3 (+0.5)	↔	90	86	04-10	NE-E	5-8
Eastern Plain Zone (EPZ)	32.4 (-0.7)	↔	26.0 (+0.4)	↔	91	87	04-18	E-SW	7-8
Vindhyan Zone (VZ)	32.7 (+0.1)	↔	26.0 (+0.7)	↔	91	86	00-06	NE-S	7-8


Mean Maximum Temperature

From 25.08.2026 (0830 IST) to 27.08.2026 (0830 IST)



Mean Minimum Temperature

From 25.08.2026 (0830 IST) to 27.08.2026 (0830 IST)



- The number shown in Red/Blue represents Lowest Maximum/Minimum Temperature at that observatory.
- The numbers shown in black/white colour represent Average Maximum/Minimum Temperature and in bracket departure from normal is shown at that observatory.



0522-2436283



<https://imdgeospatial.imd.gov.in/>



mclucknow@gmail.com



Govt. of India/भारत सरकार
Ministry of Earth Sciences/पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
India Meteorological Department/भारत मौसम विज्ञान विभाग
Regional Meteorological Centre Lucknow/प्रादेशिक मौसम केन्द्र लखनऊ



iv: - Agro-Climatic Zone wise Weather Forecast for the period 27.08.2026 to 01.09.2026

Agro-Climatic Zones	Rainfall, (mm)					Maximum Temperature (°C)		Minimum Temperature (°C)		Relative Humidity (%)		Wind, (Speed/Direction)		Cloud	Weather Warnings				
	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	Actual	Normal	Actual	Normal	Actual (Min-Max)	Normal (Min-Max)	KMPH	Degree	(Okta)	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅
Bhabhar-Tarai Zone (BTZ)				D		32-36	33	26-28	25	56-98	76-86	01-10	NE-NW	2-7		Nil	Nil	Nil	Nil
Western Plain Zone (WPZ)		D	D	D	D	34-40	33	27-31	25	37-89	73-84	01-20	NE-NW	2-6	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Central-Western Plain Zone (CWPZ)				D	D	33-37	33	27-29	25	49-94	77-86	01-12	NE-NW	2-8		Nil	Nil	Nil	Nil
South-Western Semi-Arid Plain (SWSAPZ)		D	D	D	D	33-40	33	27-30	25	37-94	76-83	04-21	SW-W	2-7	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Central Plain Zone (CPZ)				D	D	29-37	33	26-29	25	48-98	77-84	01-19	NE-NW	3-8		Nil	Nil	Nil	Nil
Bundelkhand Zone (BZ)			D			28-35	33	25-28	26	57-99	76-85	02-22	SW-NW	4-8		Nil	Nil	Nil	Nil
North-Eastern Plain Zone (NEPZ)						31-35	33	26-28	26	60-98	78-85	01-11	NE-NW	4-8	Nil		Nil	Nil	
Eastern Plain Zone (EPZ)						30-36	33	26-28	26	59-99	78-85	01-18	NE-NW	4-8			Nil	Nil	
Vindhyas Zone (VZ)						29-34	33	25-27	25	65-100	79-85	06-15	E-NW	5-8			Nil	Nil	

Symbol	Related Weather	Symbol	Related weather	Symbol	Related weather
D	Dry/No Rain		Thunderstorm accompanied with Lightening		Light to Moderate Rain
	Cold wave		Gust/ Squall		Heavy Rain
	Strong surface Wind		Hail		Heavy to Very Heavy Rain
	Fog		Very light to light Rain		Extremely Heavy Rain
	Normal (-1.5°C to +1.5°C)	↑	Above Normal (+1.6°C to +3.0°C)	↓	Below Normal (-1.6°C to -3.0°C)
↑	Appreciably Above Normal (+3.1°C to +5.0°C)	↓	Appreciably Below Normal (-3.1°C to -5.0°C)		Warm Night
↑	Markedly above normal (>5.0°C)	↓	Markedly below normal (<-5.0°C)		Heat Wave

Rainfall Intensity		Sky Condition		Fog Intensity	
Terminology	Rainfall (in mm)	Terminology	Cloud Amount (In Okta)	Terminology	Visibility (In Meter)
Very Light Rain	Trace – 2.4	Clear Sky	0	Haze	>1000 (RH<75%)
Light Rain	2.5 – 15.5	Mainly Clear Sky	1-2	Mist	>1000 (RH >75%)
Moderate rain	15.6 – 64.4	Partly Cloudy	3-4	Shallow Fog	<1000
Heavy Rain	64.5 – 115.5	Generally Cloudy	6-7	Moderate Fog	<500
Very Heavy Rain	115.6 – 204.4	Overcast	8	Dense Fog	<200
Extremely Heavy Rain	>204.5	Obscured	obs	Very Dense Fog	<50

Regional Distribution (% of Stations Reporting)		Probabilistic Forecast		Colour Based Warning/ Advisory	
% Station	Description	Terminology	Probability	Colour	चेतावनी /सलाह
76-100	Most Places (Widespread)	Unlikely	<25%	Green (No Warning)	No Action
51-75	Many Places (Fairly Widespread)	Likely	25%-50%	Yellow	Be Aware
26-50	Few Places (Scattered)	Very Likely	51%-75%	Orange	Be Ready
<25	Isolated Places	Most Likely	>75%	Red	Take Action



0522-2436283



<https://imdgeospatial.imd.gov.in/>









mclucknow@gmail.com



Govt. of India/भारत सरकार
Ministry of Earth Sciences/पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
India Meteorological Department/भारत मौसम विज्ञान विभाग
Regional Meteorological Centre Lucknow/प्रादेशिक मौसम केन्द्र लखनऊ



District wise Rainfall and Warnings in Graphical format :-



0522-2436283







<https://imdgeospatial.imd.gov.in/>



mclucknow@gmail.com



Govt. of India/भारत सरकार
Ministry of Earth Sciences/पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
India Meteorological Department/भारत मौसम विज्ञान विभाग
Regional Meteorological Centre Lucknow/प्रादेशिक मौसम केन्द्र लखनऊ



0522-2436283



<https://imdgeospatial.imd.gov.in/>



mclucknow@gmail.com



Govt. of India/भारत सरकार
Ministry of Earth Sciences/पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
India Meteorological Department/भारत मौसम विज्ञान विभाग
Regional Meteorological Centre Lucknow/प्रादेशिक मौसम केन्द्र लखनऊ



Districtwise Probabilistic Rainfall Forecast and Warning for Uttar Pradesh

उत्तर प्रदेश के लिए जिलावार संभावित वर्षा पूर्वानुमान एवं चेतावनी

District		27-08-2026	28-08-2026	29-08-2026	30-08-2026	31-08-2026
		Thursday	Friday	Saturday	Sunday	Monday
AGRA/आगरा	Distribution	Many Places	Dry	Dry	Dry	Dry
	Intensity	Moderate	-	-	-	-
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
ALIGARH/ अलीगढ़	Distribution	Scattered Places	Dry	Dry	Dry	Dry
	Intensity	Light to Moderate	-	-	-	-
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
AMBEDKAR NAGAR/ अम्बेडकर नगर	Distribution	Isolated Places	Isolated Places	Isolated Places	Isolated Places	Scattered Places
	Intensity	Very Light to Light	Very Light to Light	Very Light to Light	Very Light to Light	Light to Moderate
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	Thunderstorm/Lightning	NIL	NIL	NIL	NIL
AMETHI/ अमेठी	Distribution	Scattered Places	Isolated Places	Isolated Places	Dry	Dry
	Intensity	Light to Moderate	Very Light to Light	Very Light to Light	-	-
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	Thunderstorm/Lightning	NIL	NIL	NIL	NIL
AMROHA/ अमरोहा	Distribution	Many Places	Dry	Dry	Dry	Dry
	Intensity	Moderate	-	-	-	-
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
AURAIYA/ औरैया	Distribution	Many Places	Dry	Dry	Dry	Dry
	Intensity	Moderate	-	-	-	-
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	Heavy-Rain	NIL	NIL	NIL	NIL
AYODHYA/ अयोध्या	Distribution	Scattered Places	Isolated Places	Isolated Places	Dry	Isolated Places
	Intensity	Light to Moderate	Very Light to Light	Very Light to Light	-	Very Light to Light
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	Thunderstorm/Lightning	NIL	NIL	NIL	NIL
AZAMGARH/ आज़मगढ़	Distribution	Isolated Places	Scattered Places	Isolated Places	Isolated Places	Scattered Places
	Intensity	Very Light to Light	Light to Moderate	Very Light to Light	Very Light to Light	Light to Moderate
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	Thunderstorm/Lightning	Thunderstorm/Lightning	NIL	NIL	NIL
BADAYUN/ बदायूं	Distribution	Many Places	Dry	Dry	Dry	Dry
	Intensity	Moderate	-	-	-	-
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
BAGHPAT/ बागपत	Distribution	Scattered Places	Dry	Dry	Dry	Dry
	Intensity	Light to Moderate	-	-	-	-
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
BAHRAICH/ बहराइच	Distribution	Scattered Places	Scattered Places	Scattered Places	Isolated Places	Scattered Places
	Intensity	Light to Moderate	Light to Moderate	Light to Moderate	Very Light to Light	Light to Moderate
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL



Govt. of India/भारत सरकार
Ministry of Earth Sciences/पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
India Meteorological Department/भारत मौसम विज्ञान विभाग
Regional Meteorological Centre Lucknow/प्रादेशिक मौसम केन्द्र लखनऊ



BALLIA/ बलिया	Distribution	Isolated Places	Scattered Places	Isolated Places	Scattered Places	Scattered Places
	Intensity	Very Light to Light	Light to Moderate	Very Light to Light	Light to Moderate	Light to Moderate
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	NIL	Thunderstorm/Lightning	NIL	NIL	Heavy-Rain
BALRAMPUR/ बलरामपुर	Distribution	Isolated Places	Scattered Places	Scattered Places	Isolated Places	Scattered Places
	Intensity	Very Light to Light	Light to Moderate	Light to Moderate	Very Light to Light	Light to Moderate
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	NIL	Thunderstorm/Lightning	NIL	NIL	NIL
BANDA/बाँदा	Distribution	Most Places	Scattered Places	Dry	Dry	Dry
	Intensity	Moderate	Light to Moderate	-	-	-
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	Thunderstorm/Lightning, Heavy-Rain	NIL	NIL	NIL	NIL
BARABANKI/ बाराबंकी	Distribution	Scattered Places	Isolated Places	Isolated Places	Dry	Dry
	Intensity	Light to Moderate	Very Light to Light	Very Light to Light	-	-
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	Thunderstorm/Lightning	NIL	NIL	NIL	NIL
BAREILLY/ बरेली	Distribution	Most Places	Isolated Places	Isolated Places	Isolated Places	Isolated Places
	Intensity	Moderate	Very Light to Light	Very Light to Light	Very Light to Light	Very Light to Light
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	Heavy-Rain	NIL	NIL	NIL	NIL
BASTI/बस्ती	Distribution	Isolated Places	Isolated Places	Isolated Places	Isolated Places	Scattered Places
	Intensity	Very Light to Light	Very Light to Light	Very Light to Light	Very Light to Light	Light to Moderate
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	NIL	Thunderstorm/Lightning	NIL	NIL	NIL
BHADOHI/ भदोही	Distribution	Scattered Places	Scattered Places	Isolated Places	Dry	Dry
	Intensity	Light to Moderate	Light to Moderate	Very Light to Light	-	-
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	Thunderstorm/Lightning	Thunderstorm/Lightning	NIL	NIL	NIL
BIJNORE/ बिजनौर	Distribution	Most Places	Isolated Places	Dry	Dry	Dry
	Intensity	Moderate	Very Light to Light	-	-	-
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	Heavy-Rain	NIL	NIL	NIL	NIL
BULANDSAHAR/ बुलंदशहर	Distribution	Scattered Places	Dry	Dry	Dry	Dry
	Intensity	Light to Moderate	-	-	-	-
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
CHANDAULI/ चंदौली	Distribution	Scattered Places	Many Places	Isolated Places	Isolated Places	Scattered Places
	Intensity	Light to Moderate	Moderate	Very Light to Light	Very Light to Light	Light to Moderate
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	Thunderstorm/Lightning	Thunderstorm/Lightning	NIL	NIL	NIL
CHITRAKOOT/ चित्रकूट	Distribution	Many Places	Scattered Places	Dry	Dry	Dry
	Intensity	Moderate	Light to Moderate	-	-	-
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely



Govt. of India/भारत सरकार
Ministry of Earth Sciences/पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
India Meteorological Department/भारत मौसम विज्ञान विभाग
Regional Meteorological Centre Lucknow/प्रादेशिक मौसम केन्द्र लखनऊ



	Warning	Thunderstorm/Lightning, Heavy-Rain	NIL	NIL	NIL	NIL
DEORIA/ देवरिया	Distribution	Isolated Places	Scattered Places	Isolated Places	Scattered Places	Many Places
	Intensity	Very Light to Light	Light to Moderate	Very Light to Light	Light to Moderate	Moderate
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	NIL	Thunderstorm/Lightning	NIL	NIL	NIL
ETAH/एटा	Distribution	Many Places	Dry	Dry	Dry	Dry
	Intensity	Moderate	-	-	-	-
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
ETAWAH/ इटावा	Distribution	Many Places	Dry	Dry	Dry	Dry
	Intensity	Moderate	-	-	-	-
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
FARUKHABAD/ फर्रुखाबाद	Distribution	Many Places	Dry	Dry	Dry	Dry
	Intensity	Moderate	-	-	-	-
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	Heavy-Rain	NIL	NIL	NIL	NIL
FATEHPUR/ फतेहपुर	Distribution	Most Places	Isolated Places	Dry	Dry	Dry
	Intensity	Moderate	Very Light to Light	-	-	-
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	Thunderstorm/Lightning, Heavy-Rain	NIL	NIL	NIL	NIL
FIROZABAD/ फिरोजाबाद	Distribution	Many Places	Dry	Dry	Dry	Dry
	Intensity	Moderate	-	-	-	-
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
GAUTAMBUDH NAGAR/ गौतम बुद्ध नगर	Distribution	Isolated Places	Dry	Dry	Dry	Dry
	Intensity	Very Light to Light	-	-	-	-
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
GHAZIABAD/ गाजियाबाद	Distribution	Isolated Places	Dry	Dry	Dry	Dry
	Intensity	Very Light to Light	-	-	-	-
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
GHAZIPUR/ गाजीपुर	Distribution	Isolated Places	Scattered Places	Isolated Places	Isolated Places	Scattered Places
	Intensity	Very Light to Light	Light to Moderate	Very Light to Light	Very Light to Light	Light to Moderate
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	Thunderstorm/Lightning	Thunderstorm/Lightning	NIL	NIL	NIL
GONDA/ गोंडा	Distribution	Isolated Places	Isolated Places	Isolated Places	Isolated Places	Isolated Places
	Intensity	Very Light to Light	Very Light to Light	Very Light to Light	Very Light to Light	Very Light to Light
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
GORAKHPUR/ गोरखपुर	Distribution	Isolated Places	Scattered Places	Isolated Places	Scattered Places	Many Places
	Intensity	Very Light to Light	Light to Moderate	Very Light to Light	Light to Moderate	Moderate
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	NIL	Thunderstorm/Lightning	NIL	NIL	NIL
	Distribution	Most Places	Isolated Places	Dry	Dry	Dry



Govt. of India/भारत सरकार
Ministry of Earth Sciences/पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
India Meteorological Department/भारत मौसम विज्ञान विभाग
Regional Meteorological Centre Lucknow/प्रादेशिक मौसम केन्द्र लखनऊ



HAMIRPUR/ हमीरपुर	Intensity	Moderate	Very Light to Light	-	-	-
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	Thunderstorm/Lightning, Heavy-Rain	NIL	NIL	NIL	NIL
HAPUR/ हापुड़	Distribution	Scattered Places	Dry	Dry	Dry	Dry
	Intensity	Light to Moderate	-	-	-	-
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
HARDOI/ हरदोई	Distribution	Many Places	Isolated Places	Dry	Dry	Dry
	Intensity	Moderate	Very Light to Light	-	-	-
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	Thunderstorm/Lightning, Heavy-Rain	NIL	NIL	NIL	NIL
HATHRAS/ हाथरस	Distribution	Scattered Places	Dry	Dry	Dry	Dry
	Intensity	Light to Moderate	-	-	-	-
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
JALAUN/जालौन	Distribution	Most Places	Dry	Dry	Dry	Dry
	Intensity	Moderate	-	-	-	-
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	Heavy-Rain	NIL	NIL	NIL	NIL
JAUNPUR/ जौनपुर	Distribution	Scattered Places	Scattered Places	Isolated Places	Dry	Isolated Places
	Intensity	Light to Moderate	Light to Moderate	Very Light to Light	-	Very Light to Light
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	Thunderstorm/Lightning	Thunderstorm/Lightning	NIL	NIL	NIL
JHANSI/झांसी	Distribution	Most Places	Dry	Dry	Dry	Dry
	Intensity	Moderate	-	-	-	-
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	Heavy-Rain	NIL	NIL	NIL	NIL
KANNAUJ/ कन्नौज	Distribution	Many Places	Dry	Dry	Dry	Dry
	Intensity	Moderate	-	-	-	-
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	Thunderstorm/Lightning, Heavy-Rain	NIL	NIL	NIL	NIL
KANPUR DEHAT/ कानपुर देहात	Distribution	Most Places	Dry	Dry	Dry	Dry
	Intensity	Moderate	-	-	-	-
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	Thunderstorm/Lightning, Heavy-Rain	NIL	NIL	NIL	NIL
KANPUR NAGAR/ कानपुर नगर	Distribution	Most Places	Isolated Places	Dry	Dry	Dry
	Intensity	Moderate	Very Light to Light	-	-	-
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	Thunderstorm/Lightning, Heavy-Rain	NIL	NIL	NIL	NIL
KASGANJ/ कासगंज	Distribution	Many Places	Dry	Dry	Dry	Dry
	Intensity	Moderate	-	-	-	-
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
KAUSHAMBI/ कौशांबी	Distribution	Many Places	Scattered Places	Dry	Dry	Dry
	Intensity	Moderate	Light to Moderate	-	-	-
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	Thunderstorm/Lightning	NIL	NIL	NIL	NIL



Govt. of India/भारत सरकार
Ministry of Earth Sciences/पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
India Meteorological Department/भारत मौसम विज्ञान विभाग
Regional Meteorological Centre Lucknow/प्रादेशिक मौसम केन्द्र लखनऊ



KUSHINAGAR/ कुशीनगर	Distribution	Isolated Places	Scattered Places	Scattered Places	Scattered Places	Many Places
	Intensity	Very Light to Light	Light to Moderate	Light to Moderate	Light to Moderate	Moderate
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	NIL	Thunderstorm/Lightning	NIL	NIL	Heavy-Rain
LAKHIMPUR KHERI/ लखीमपुर खीरी	Distribution	Many Places	Isolated Places	Scattered Places	Isolated Places	Isolated Places
	Intensity	Moderate	Very Light to Light	Light to Moderate	Very Light to Light	Very Light to Light
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	Heavy-Rain	NIL	NIL	NIL	NIL
LALITPUR/ ललितपुर	Distribution	Most Places	Isolated Places	Dry	Dry	Dry
	Intensity	Moderate	Very Light to Light	-	-	-
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	Heavy-Rain	NIL	NIL	NIL	NIL
LUCKNOW/ लखनऊ	Distribution	Scattered Places	Isolated Places	Dry	Dry	Dry
	Intensity	Light to Moderate	Very Light to Light	-	-	-
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	Thunderstorm/Lightning	NIL	NIL	NIL	NIL
MAHOBA/ महोबा	Distribution	Most Places	Isolated Places	Dry	Dry	Dry
	Intensity	Moderate	Very Light to Light	-	-	-
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	Thunderstorm/Lightning, Heavy-Rain	NIL	NIL	NIL	NIL
MAHRAJGANJ/ महाराजगंज	Distribution	Isolated Places	Scattered Places	Scattered Places	Scattered Places	Many Places
	Intensity	Very Light to Light	Light to Moderate	Light to Moderate	Light to Moderate	Moderate
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	NIL	Thunderstorm/Lightning	NIL	NIL	Heavy-Rain
MAINPURI/ मैनपुरी	Distribution	Many Places	Dry	Dry	Dry	Dry
	Intensity	Moderate	-	-	-	-
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
MATHURA/ मथुरा	Distribution	Scattered Places	Dry	Dry	Dry	Dry
	Intensity	Light to Moderate	-	-	-	-
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
MAU/ मऊ	Distribution	Isolated Places	Scattered Places	Isolated Places	Scattered Places	Scattered Places
	Intensity	Very Light to Light	Light to Moderate	Very Light to Light	Light to Moderate	Light to Moderate
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	NIL	Thunderstorm/Lightning	NIL	NIL	NIL
MEERUT/ मेरठ	Distribution	Scattered Places	Dry	Dry	Dry	Dry
	Intensity	Light to Moderate	-	-	-	-
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
MIRZAPUR/ मिर्जापुर	Distribution	Scattered Places	Many Places	Isolated Places	Dry	Isolated Places
	Intensity	Light to Moderate	Moderate	Very Light to Light	-	Very Light to Light
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	Thunderstorm/Lightning	Thunderstorm/Lightning	NIL	NIL	NIL
MORADABAD/	Distribution	Most Places	Isolated Places	Dry	Dry	Dry
	Intensity	Moderate	Very Light to Light	-	-	-



Govt. of India/भारत सरकार
Ministry of Earth Sciences/पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
India Meteorological Department/भारत मौसम विज्ञान विभाग
Regional Meteorological Centre Lucknow/प्रादेशिक मौसम केन्द्र लखनऊ



मुरादाबाद	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	Heavy-Rain	NIL	NIL	NIL	NIL
MUZAFFAR NAGAR/ मुज़फ्फरनगर	Distribution	Many Places	Dry	Dry	Dry	Dry
	Intensity	Moderate	-	-	-	-
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
PILIBHIT/ पीलीभीत	Distribution	Many Places	Isolated Places	Isolated Places	Isolated Places	Isolated Places
	Intensity	Moderate	Very Light to Light	Very Light to Light	Very Light to Light	Very Light to Light
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	Heavy-Rain	NIL	NIL	NIL	NIL
PRATAPGARH/ प्रतापगढ़	Distribution	Scattered Places	Scattered Places	Isolated Places	Dry	Dry
	Intensity	Light to Moderate	Light to Moderate	Very Light to Light	-	-
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	Thunderstorm/Lightning	NIL	NIL	NIL	NIL
PRAYAGRAJ/ प्रयागराज	Distribution	Scattered Places	Scattered Places	Dry	Dry	Dry
	Intensity	Light to Moderate	Light to Moderate	-	-	-
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	Thunderstorm/Lightning	Thunderstorm/Lightning	NIL	NIL	NIL
RAEBARELI/ रायबरेली	Distribution	Many Places	Isolated Places	Dry	Dry	Dry
	Intensity	Moderate	Very Light to Light	-	-	-
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	Thunderstorm/Lightning	NIL	NIL	NIL	NIL
RAMPUR/ रामपुर	Distribution	Most Places	Isolated Places	Dry	Dry	Dry
	Intensity	Moderate	Very Light to Light	-	-	-
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	Heavy-Rain	NIL	NIL	NIL	NIL
SAHARANPUR/ सहारनपुर	Distribution	Most Places	Dry	Dry	Dry	Dry
	Intensity	Moderate	-	-	-	-
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
SAMBHAL/ सम्भल	Distribution	Many Places	Dry	Dry	Dry	Dry
	Intensity	Moderate	-	-	-	-
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
SANTKABIR NAGAR/ संत कबीर नगर	Distribution	Isolated Places	Isolated Places	Isolated Places	Scattered Places	Many Places
	Intensity	Very Light to Light	Very Light to Light	Very Light to Light	Light to Moderate	Moderate
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	NIL	Thunderstorm/Lightning	NIL	NIL	NIL
SHAHJAHANPUR/ शाहजहाँपुर	Distribution	Many Places	Isolated Places	Isolated Places	Dry	Dry
	Intensity	Moderate	Very Light to Light	Very Light to Light	-	-
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	Heavy-Rain	NIL	NIL	NIL	NIL
	Distribution	Many Places	Dry	Dry	Dry	Dry



Govt. of India/भारत सरकार
Ministry of Earth Sciences/पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
India Meteorological Department/भारत मौसम विज्ञान विभाग
Regional Meteorological Centre Lucknow/प्रादेशिक मौसम केन्द्र लखनऊ



SHAMLI/ शामली	Intensity	Moderate	-	-	-	-
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
SHRAWASTI/ श्रावस्ती	Distribution	Isolated Places	Scattered Places	Scattered Places	Isolated Places	Scattered Places
	Intensity	Very Light to Light	Light to Moderate	Light to Moderate	Very Light to Light	Light to Moderate
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
SIDDHARTH NAGAR/ सिद्धार्थ नगर	Distribution	Isolated Places	Scattered Places	Scattered Places	Scattered Places	Many Places
	Intensity	Very Light to Light	Light to Moderate	Light to Moderate	Light to Moderate	Moderate
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	NIL	Thunderstorm/Lightning	NIL	NIL	NIL
SITAPUR/ सीतापुर	Distribution	Scattered Places	Isolated Places	Isolated Places	Dry	Dry
	Intensity	Light to Moderate	Very Light to Light	Very Light to Light	-	-
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	Thunderstorm/Lightning	NIL	NIL	NIL	NIL
SONBHADRA/ सोनभद्र	Distribution	Scattered Places	Many Places	Isolated Places	Isolated Places	Many Places
	Intensity	Light to Moderate	Moderate	Very Light to Light	Very Light to Light	Moderate
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	Thunderstorm/Lightning	Thunderstorm/Lightning	NIL	NIL	Heavy-Rain
SULTANPUR/ सुल्तानपुर	Distribution	Scattered Places	Isolated Places	Isolated Places	Dry	Isolated Places
	Intensity	Light to Moderate	Very Light to Light	Very Light to Light	-	Very Light to Light
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	Thunderstorm/Lightning	NIL	NIL	NIL	NIL
UNNAO/ उन्नाव	Distribution	Many Places	Isolated Places	Dry	Dry	Dry
	Intensity	Moderate	Very Light to Light	-	-	-
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	Thunderstorm/Lightning, Heavy-Rain	NIL	NIL	NIL	NIL
VARANASI/ वाराणसी	Distribution	Scattered Places	Scattered Places	Isolated Places	Dry	Isolated Places
	Intensity	Light to Moderate	Light to Moderate	Very Light to Light	-	Very Light to Light
	Probability	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely	Very Likely
	Warning	Thunderstorm/Lightning	Thunderstorm/Lightning	NIL	NIL	NIL



Govt. of India/भारत सरकार
Ministry of Earth Sciences/पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
India Meteorological Department/भारत मौसम विज्ञान विभाग
Regional Meteorological Centre Lucknow/प्रादेशिक मौसम केन्द्र लखनऊ



Extended Range forecast at Met-Subdivision Level (01.09.2026 to 07.09.2026)

S.No.	Meteorological Sub-Division	T _{max} (Maximum Temperature)	Weekly T _{max} Normal	T _{min} (Minimum Temperature)	Weekly T _{min} Normal	Rainfall Category	Rainfall Weekly Normal
01.	East Uttar Pradesh	Near Normal	-	Near Normal	-	Near Normal	-
02.	West Uttar Pradesh	Above Normal	-	Above Normal	-	Below Normal	-

Agriculture Impact based Forecast

Heavy to Very Heavy Rain			
Crop	Stage	Likely Impact on Crop	Advisory
Sugarcane	Grand Growth Stage	Prolonged waterlogging may cause root rot, lodging and reduced cane growth.	Ensure immediate drainage of excess water and provide propping to lodged canes. Avoid nitrogen fertilizer application during heavy rainfall.
Pigeon Pea (Arhar)	Vegetative Stage	Excess soil moisture may cause wilt, root rot.	Maintain proper drainage and monitor the crop regularly for wilt and stem rot symptoms.
Kharif Maize	Knee High/Tasseling Stage	Waterlogging may reduce nutrient uptake and increase lodging of plants.	Remove excess water immediately and postpone top dressing of fertilizers until the field becomes workable.
Rice/Paddy	Tillering Stage	Heavy rain may submerge seedlings and damage transplanted plants.	Maintain proper drainage in the field and replant damaged plants if seedlings are available.
Groundnut	Flowering/Peg Formation Stage	Waterlogging may adversely affect peg penetration and increase collar rot incidence.	Ensure rapid drainage and avoid field operations in saturated soils.
Sesame	Flowering/Capsule Formation Stage	Heavy rainfall may result in flower shedding and fungal disease incidence.	Ensure proper drainage and monitor the crop for leaf spot and phyllody symptoms.
Black Gram/Green Gram	Flowering/Pod Formation Stage	Excess moisture may cause flower drop, root rot and poor pod development.	Remove excess water from the field and avoid pesticide spraying during rainfall.
Vegetables (Okra, Bottle Gourd, Bitter Gourd, Cucumber, Tomato, Brinjal, Green Chilli, Ridge Gourd, Cowpea/Cluster Beans)	Fruiting Stage	Heavy rainfall significantly increases the likelihood of fruit rot, plant wilting, and the outbreak of pests and diseases.	Ensure proper drainage, strengthen staking systems and harvest marketable produce before heavy rainfall events.
Banana/Papaya	Fruit Development/Maturity Stage	Heavy rainfall may cause fruit drop, stem breakage and lodging of banana plants.	Provide support to banana plants, remove fallen fruits and maintain drainage around the root zone.



0522-2436283



<https://imdgeospatial.imd.gov.in/>



mclucknow@gmail.com



Govt. of India/भारत सरकार
Ministry of Earth Sciences/पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
India Meteorological Department/भारत मौसम विज्ञान विभाग
Regional Meteorological Centre Lucknow/प्रादेशिक मौसम केन्द्र लखनऊ



AMFU/DISTRICT WISE AGRO-METEOROLOGICAL ADVISORIES

ISSUED ON: - 27.08.2026

BULLETIN NO. 69/26

Crops	Crops (Stage)	NODAL OFFICER PRAYAGRAJ: - Districts: Fatehpur, Pratapgarh, Prayagraj, Chitrakoot and Kausambi.
Kharif	Rice (Tillering)	If sheath blight lesions appear on the lower leaf sheaths, spray Trifloxystrobin 25% + Tebuconazole 50% @ 0.5 g/L water. Alternatively, spray Carbendazim 50 WP @ 2 g/L water.
	Pigeon Pea (Flowering)	At flowering, scout for Helicoverpa larvae and damaged flowers. If infestation warrants control, spray Emamectin benzoate 5 SG @ 200 g/ha or Spinosad 45 SC @ 125 ml/ha.
	Sesame (Pod Formation)	Rogue out sesame plants showing phyllody symptoms and destroy them outside the field. For the vector, if leafhopper infestation is observed, spray Imidacloprid 17.8 SL @ 0.3 ml/L water
	Black & Green gram (Flowering)	Remove plants showing clear yellow-mosaic symptoms. If whitefly population is increasing, spray Imidacloprid 17.8 SL @ 250 ml/ha.
	Sorghum (Grand growth)	Inspect the whorl for dead hearts. Remove and destroy affected shoots. Where infestation is severe, spray Emamectin benzoate 5 SG @ 200 g/ha.
	Finger Millet (Tillering)	At active tillering, control remaining broad-leaved weeds by handweeding/interculture. Do not allow weeds to compete during this critical tillering period.
	Soyabean (Pod formation)	Inspect stems for girdling rings. Cut and destroy girdled stems before adult beetles emerge. If infestation is increasing, spray Thiacloprid 21.7 SC @ 750 ml/ha.
	Maize (Grand growth)	Inspect the whorl for larvae and fresh feeding damage. If infestation is established, spray Spinetoram 11.7 SC @ 350 ml/ha or Emamectin benzoate 5 SG @ 200 g/ha, directing the spray into the whorl.
Sugarcane	Grand growth	During grand growth, inspect the crop for red rot. Remove affected clumps and destroy them away from the field; do not use setts from diseased clumps for subsequent planting.
Vegetables	Okra/ Ladyfinger (Flowering)	Rogue out plants showing yellow-vein mosaic symptoms. If whitefly is present, spray Thiamethoxam 25 WG @ 40 g/acre in about 200 L water/acre.
	Brinjal (Fruit Formation)	Remove and destroy bored shoots and infested fruits regularly. If about 4% shoots or 14% fruits are infested, spray Chlorantraniliprole 18.5 SC @ 80 ml/acre.
	Bottle Gourd (Fruit formation)	Collect and destroy infested fruits. Install methyl eugenol traps @ 10–12 traps/ha; where infestation remains high, use a registered fruit-fly bait formulation
	Chilli (Vegetative)	Monitor young leaves and flowers for thrips. If infestation increases, spray Spinetoram 11.7 SC @ 0.5 ml/L water.
Guava	Vegetative	Inspect new shoots for gall formation. Where infestation is observed, spray Thiamethoxam @ 1 g/L + Profenofos @ 2 ml/L + sticker @ 0.5 ml/L water; ICAR-CISH recommends the first spray around the third week of August and a second spray 15 days later.
Livestock	Buffalo	During the humid monsoon period, provide clean and dry bedding and ensure adequate ventilation in animal sheds. Keep feed troughs clean to prevent contamination and digestive problems.



0522-2436283



<https://imdgeospatial.imd.gov.in/>



mclucknow@gmail.com



Govt. of India/भारत सरकार
Ministry of Earth Sciences/पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
India Meteorological Department/भारत मौसम विज्ञान विभाग
Regional Meteorological Centre Lucknow/प्रादेशिक मौसम केन्द्र लखनऊ



ISSUED ON: -27.08.2026

BULLETIN NO. 69/26

Crops	Crops (Stage)	<u>NODAL OFFICER BHARARI:</u> Districts: Jalaun, Jhansi, Lalitpur, Mahoba, Banda and Hamirpur.
Kharif	Groundnut (Vegetative)	Farmers are advised to second weeding should be done at 35-40 days after sowing in groundnut.
	Black Gram (Vegetative)	As per weather forecast, farmers are advised to control weeds in pigeon pea, green gram and black gram.
Vegetable	Lemon (Vegetative)	Farmers are advised to copper oxychloride @ 2.5 gram per liter of water should be used to control the citrus canker disease in lemon.
	Brinjal (Transplanting)	Farmers are advised to tomato, brinjal, chilli, early cauliflower, cabbage and marigold seedlings should be transplanted in the prepared field. Bio-control of insect and pest should be in all vegetable crops.
	Tomato (Fruit formation)	Urea should be applied as per need basis in zaid crops and vegetables. Sowing should be completed as soon as possible of summer season vegetables such as bottle gourd, pumpkin, tomato, brinjal, chilli cucumber, water melon, musk melon etc. Pheromone trap should be used @ 3-4 per acre to control of fruit borer in vegetables of summer season. Spray of neem-based azadirachtin bio-pesticide @ 5-7 ml per liter of water or neem kernel solution should be spraying 4% (40 g powder of neem kernel powder in 1 liter of water) at 10 days interval to control pests like hairy caterpillars, aphids and beetles in vegetable crops.
	Ginger (Sowing)	Farmers can sow Suran, ginger and turmeric throughout the month. Sowing of ginger and turmeric is sufficient @ 15 to 20 quintal seeds per hectare. For sowing of suran @ 70 to 80 quintal seeds per hectare are sufficient.
	Onion (Nursery)	Seed should be sown in nursery at 10th July for kharif onion. Seed rate should be 12-15 kg per hectare for transplanting of kharif onion. Apply recommended fertilizers at the time of plant growth at about 25-30 days after sowing in vegetables.
Fruits	Aonla (Transplanting)	Farmers are advised to this is the suitable time for establishment of new orchards of Mango, Guava, Litchi, Aonla, Jackfruit, Lemon, Jamun, Ber, Papaya etc
	Guava (Transplanting)	Farmers are advised to this is the suitable time for establishment of new orchards of Mango, Guava, Litchi, Aonla, Jackfruit, Lemon, Jamun, Ber, Papaya etc.
Live stock	Cow	As per weather forecast, Farmers are advised to Proper arrangement should be against rain to protect of animals. Keep floors dry of animal shed. Smoke neem leaves near the animal shelter to control of mosquitoes. Cattle sheds should be kept dry as far as possible. Balance diet (green fodder 15-20 kg straw and flour, mustard cake, mineral mixture or rice bran 2-3 kg) per day should be given to the buffaloes and cows so that milk production should not affect. Farmers are advised to use green fodder mixed with wheat straw. Keep animals in shaded place, vaccination against HS, BQ and FMD diseases and provide green fodder, fresh and clean water three times in a day. Deworming should be in cow, buffalo, goats, and sheep's to control of internal parasites. Cattle and poultry shed must be proper ventilated.



0522-2436283



<https://imdgeospatial.imd.gov.in/>



mclucknow@gmail.com



Govt. of India/भारत सरकार
Ministry of Earth Sciences/पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
India Meteorological Department/भारत मौसम विज्ञान विभाग
Regional Meteorological Centre Lucknow/प्रादेशिक मौसम केन्द्र लखनऊ



ISSUED ON: - 27.08.2026

BULLETIN NO. 69/26

Crops	Crops, (Stage)	<u>NODAL OFFICER (AYODHYA):</u> Districts: Barabanki, Sultanpur, Amethi, Ayodhya, Basti, Raebareli, Ambedkar Nagar, Sant Kabir Nagar, Gorakhpur, Deoria, and Ballia.
Rice	Vegetative	Keeping in view of present weather, farmers are advised to monitor crop regularly for leaf folder or Stem borer as paddy crop is in vegetative stage. Farmers are advised to install pest specific pheromone traps @ 3-4/acre in the paddy fields for monitoring of stem borer.
Rice	Elongation	In the paddy field if plants started turning yellow i.e. top leaves turned yellow and bottom leaves remained green, farmers may spray zinc sulphate solution (6.0 kg zinc sulphate dissolved in 300 litres of water/ha.)
Pigeon Pea (Arhar)	Sowing	In case of delay in sowing due to flood or continuous rain in eastern Uttar Pradesh, sowing can be done as pure crop of Bahar and PDA-11 in the first fortnight of September, but keep the distance between rows 30 cm and use seed at the rate of 20 to 25 kg per hectare
Green Gram	Sowing	Sow varieties of moong such as Azad Moong 1, Pant Moong 1, Pant Moong 3, Pusa 1431, Meha 99-125, MH-2.15, TM-9937, Malviya, Jan Kalyani, Malviya, Janchetna, Malviya Janpriya, Malviya Jagriti, Malviya Jyoti, Pant Moong 4, Narendra Moong 1, PDM-11, Asha.
Cowpea/ Lobia	Sowing	15-20 kg seed per hectare is sufficient for cultivating cowpea during Kharif season. Before sowing, the seeds should be treated with Rhizobium bacteria
Finger Millet	Sowing	If sowing has not yet been completed, undertake sowing of the recommended composite sorghum (jowar) varieties such as Varsha, CSB-13, CSV-15, SPV1388 (Bundela), and Vijeta, as well as the recommended hybrid varieties including CSH-16, CSH-9, CSH-14, CSH-18, CSH-13, HTJH-3208, and CSH-23, at the earliest.
Sugarcane	Grand growth	For biological control of borer pests, paste trichocards containing 50 thousand Trichogramma eggs at 8 to 10 places per hectare. Cut the cards into pieces and staple them on the lower surface of the leaves. Repeat this work at an interval of 10 days. Make bunds in the fields affected by red rot disease, so that the healthy crop is not affected by the infected irrigation water. Uproot and destroy the clumps/heads affected by red rot disease and treat the uprooted area with Trichoderma and for prevention, do drenching of methyl 0.2 percent.
Vegetables	Carrot (Sowing)	Sowing of carrot can be done on raised bed. Seed rate- 3.5-4.0 kg/acre for sowing manually by hand and 1.0 kg/ha for sowing by machine. Farmers are advised to do sowing of carrot by machine because it reduces the seed rate, improve the quality of produces and increase the yield. Proper drainage should be done in the fields. Application of FYM and phosphorus fertilizer is recommended. Seed treatment with Captan @ 2 gm per kg is advised.
	Ginger (Tuber Bulby)	Make arrangements for water drainage in turmeric and ginger and use nitrogen as per the recommendation.
Fruits	Mango (Planting)	Make proper arrangements for water drainage in the orchards. Complete the planting of new orchards of improved varieties of mango, guava, amla, litchi and lemon as soon as possible and plant new plants in place of the plants that have died due to some reason in the previously planted orchards. Potato, chilli, tomato, cowpea and gladiolus can be cultivated as intercrops for more profit in the first 10 years of mango orchard.
Live stock	Cow	Presently, vaccination for Foot and Mouth Disease (FMD) and Brucellosis is being done in all veterinary hospitals till 30th August. Ensure vaccination of animals.



0522-2436283



<https://imdgeospatial.imd.gov.in/>



mclucknow@gmail.com



Govt. of India/भारत सरकार
Ministry of Earth Sciences/पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
India Meteorological Department/भारत मौसम विज्ञान विभाग
Regional Meteorological Centre Lucknow/प्रादेशिक मौसम केन्द्र लखनऊ



ISSUED ON: - 27.08.2026

BULLETIN NO.69/26

Crops	Crops (Stage)	<u>NODAL OFFICER KANPUR:</u> Districts: Kannauj, Hathras, Mathura, Agra, Etah, Mainpuri, Firozabad, Etawah, Auraiya, Kanpur-Rural, Kanpur-Urban, Unnao, Lucknow, Sitapur, Hardoi, Kheri and Kanshiram Nagar.
Kharif	Maize (Silking)	In maize crop, there is a possibility of outbreak of stem borer / shoot fly pest, so for its prevention, Emamectin Benzoate 5% Sg 200 g / ha at 500-600 liters of water solution Sprinkle on clean weather.
	Rice (Panicle Initiation)	If infestation of root borer insect is seen in paddy crop, spray CartapHydrochloride 4% granular chemical at the rate of 20 to 25 kg per hectare in three to four centimeters of stagnant water. If infestation of hopper insect is seen in paddy crop, then for its control, spray Imidacloprid 17.8 % SL 125 ml or Chlorpyrifos 20% EC at the rate of 1.50 liter per hectare by mixing it in 500-600 liters of water when sky is clear.
	Sesame (Flowering)	There is a possibility of outbreak of leaf and fruit bollworm in sesame crop, so for its prevention, Emamectin Benzoate 5 % SG at the rate of 200 g / hectare 500-600 liters make a solution in water and spray on clear weather
	Groundnut (Flower Initiation)	Groundnut crop is likely to show white girdler / termite pest infestation, hence fipronil 0.3% GR at the rate of 20 kg / ha topdressing of clear sky.
	Black gram (Vegetative)	For the control of weeds in the black gram crop, Imazethapyr 10 SL at the rate of 1.0 liter / hectare, spray the solution in 500-600 liters of water after 15-20 days of sowing and spray it on clear sky.
	Green gram (Vegetative)	For the control of weeds in the green gram crop, Imazethapyr 10 SL at the rate of 1.0 liter / hectare, spray the solution in 500-800 liters of water after 15-20 days of sowing and spray it on clear sky. The recommended varieties of green gram sown in Kharif - Narendra Moong-1, Pant Moong-1, Pant Moong-3, Pant Moong-4, Samrat, Malaviya Janchetna, Malaviya Janapriya, Malaviya Jagriti Shweta, Swati, Virat and IPM -2-14 etc For the sowing of any one variety. The sowing work at the rate of 12 -15 kg seed / hectare and try to complete it soon the event of no rain.
Sugarcane	(Grand Growth)	If the length of sugarcane has become five feet, then do the first tying at a height of two and half feet. For the first tying, tie two bunches of sugarcane in a line together with the dry leaves below. Destroy the plants affected by red rot disease by removing them along with the roots and spray the plants with a solution of thiophanate methyl 0.2 percent. Infestation of mite insect is being seen in sugarcane, for its control, mix 750 ml of Profenophos 40 percent + Cyper 4 percent insecticide in 625 liters of water and spray at the rate of per hectare.
Fruits	Mango (Planting)	Plant new plants in pits already filled with mango, guava, amla, lemon etc. Plant new plants in place of the destroyed plants in the new bag. Make a stand of 25-30 meters high soil around the stem by folding banana / papaya bags. For prevention of mango leaf moth, apply 2% carbaryl 1.5% dust on the clear sky.
Vegetables	Cauliflower (Transplanting)	Transplanting of saplings planted in kharif crops like brinjal, chilli, tomato and early cauliflower. If there is a possibility of water stagnation in the field, then plant the early cauliflower, brinjal, tomato, chilli etc. on the ridges. If there is an outbreak of fruit borer / leaf borer in vegetable crops, make a solution of neem oil in 1.5 ml / liter of water to control it and spray it 3-4 times after clearing the sky at intervals of 6-10 days.
Live stock	Buffalo	Farmers are advised to During the rainy season, the possibility of lice infestation in animals increases. To prevent this, spray lime in the animal shed so that the eggs and larvae of lice are destroyed. Do not tie animals in open spaces/under trees during rains. Tie animals in the open only when the sky is clear at night. Tie animals in a shady place during the day. Vaccinate animals with FMD vaccine to prevent foot and mouth disease and VQ vaccine to prevent dengue fever. Give sufficient amount of grains to animals along with green and dry fodder. Make sure to give clean and fresh water to animals 3-4 times a day. Do not tie pregnant animals at a sloping place. This is the right time to give deworming medicine to animals to prevent stomach worms.



0522-2436283



<https://imdgeospatial.imd.gov.in/>



mclucknow@gmail.com



Govt. of India/भारत सरकार
Ministry of Earth Sciences/पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
India Meteorological Department/भारत मौसम विज्ञान विभाग
Regional Meteorological Centre Lucknow/प्रादेशिक मौसम केन्द्र लखनऊ



ISSUED ON: - 27.08.2026

BULLETIN NO. 69/26

Crops	Crops (Stage)	<u>NODAL OFFICER MODIPURAM:</u> Districts: Meerut, Pilibhit, Saharanpur, Muzaffarnagar, Baghpat, Ghaziabad, Gautam budhnagar, Aligarh, Bulandshahar, Moradabad, Jyotiba phule Nagar, Bijnore, Badaun, Bareilly, Rampur, Shahjahanpur, Farrukhabad, Shamali, Sambhal and Hapur
Rice	Vegetative	For the prevention of stem borer in paddy, a parasite called Trichoderma should be applied at an interval of 8 to 10 days. Use 20 kg kortephydrochloride 4G medicine per hectare with 4 to 5 cm water or sprinkle phipronil 5 SC 1.0 liter per hectare mixed with 600 liters of water.
Groundnut	Vegetative	After the second weeding and hoeing in Groundnut, 30 to 40 days after earthing up, for the prevention of tikka disease in peanuts, spray 5 kg of mancozeb in 1000 liters of water and spraying 2 to 3 at 10 days interval per hectare.
Pigeon Pea	General	Make proper arrangements for drainage of water in pigeon pea crop.
Green Gram	Sowing	Sow improved green gram varieties such as Malviya Jankranti, IPM-404-4, Surya (IPMS-12-1), Azad Moong-1 (KM-2342), Pusa-1431, Kanika (IPM-302-2), Varsha (IPM-2-4-9), Meha 99-125, IPM-2-14, Virat (IPM-205-7), and Swati (KM-2195) when adequate soil moisture is available. • Seed Treatment for Green Gram If the seed has not been treated, treat 1 kg of seed with 2 g Thiram + 1 g Carbendazim. Then inoculate 10 kg of seed with one packet of Rhizobium culture before sowing.
Black Gram	Sowing	Sow improved black gram varieties such as Mash-1190, PU-11, Pant Urd-12, KPU-12-1735 (Kota Urd-1), Pant Urd-8, Pant Urd-9, IPU-13-1, IPU-11-02, Vallabh Urd, and IPU-2-43 when sufficient soil moisture is available. • Seed Treatment for Black Gram If the seed has not been treated, treat 1 kg of seed with 1 g Carbendazim or 4 g Trichoderma. Then inoculate 10 kg of seed with Rhizobium culture before sowing. • Whitefly Management To control whitefly in black gram and green gram, spray either: • Dimethoate 30 EC @ 1 litre per hectare, or • Oxydemeton-methyl 25 EC @ 1 litre per hectare.
Radish		Asian radish variety of radish like Japanese white, Pusa Chetki, sowing can be done earlier this month. Radish requires 6 to 8 kg of seeds per hectare.
Sugarcane	Vegetative	Uproot and destroy sugarcane plants infected with Red Rot Disease, including their roots. After removal, apply 0.2% Thiophanate Methyl solution as a soil drench. Mite infestation has been observed in sugarcane. To control it, spray Propargite at the rate of 1.5 ml per litre of water. To obtain higher yields from the ratoon sugarcane crop, spray water-soluble NPK (19:19:19) at the rate of 2 kg per acre as a foliar application. Farmers who have kept their fields vacant for autumn sugarcane planting should sow Dhaincha (Sesbania) and incorporate it into the soil after 50–55 days as green manure. For vigorous growth of the spring-planted sugarcane crop, spray Nano Urea (2.5 ml) and Nano DAP (2.5 ml per litre of water) on the leaves when adequate soil moisture is available. After sufficient tillers have developed in the autumn-planted crop, carry out earthing-up to suppress unwanted tillers and support healthy crop growth. Remove the dry leaves from the lower one-third of the sugarcane plants to prevent insect pests from finding shelter. Ensure that all your information is entered correctly in the Sugarcane Survey (Satta Pradarshan Survey). Information about the Farmer Social Welfare Scheme is also being provided through this survey, and farmers are encouraged to take advantage of it.
Vegetables	Bottle gourd	Making scaffolding in bottle gourd vegetables. Provide proper drainage in all vegetables
	Pumpkin (Flowering)	During the Kharif season, grow cucurbit vegetables on 6–8 feet high trellises (machan system). Use bamboo or iron poles to construct the trellis.
Live Stock	Buffalo	To prevent reproductive disorders and related diseases in livestock, farmers are advised to provide mineral mixture regularly in addition to green fodder, dry fodder, and balanced cattle feed. The Animal Husbandry Department is implementing a scheme to provide free fodder seed mini-kits and hybrid Napier grass root slips for increasing fodder production. Farmers can avail themselves of this benefit by contacting the District Chief Veterinary Officer's office or the nearest veterinary hospital. The department is operating a Mobile Veterinary Unit (MVU) to provide veterinary services at the doorstep of farmers and livestock owners.



0522-2436283



<https://imdgeospatial.imd.gov.in/>



mclucknow@gmail.com



Govt. of India/भारत सरकार
Ministry of Earth Sciences/पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
India Meteorological Department/भारत मौसम विज्ञान विभाग
Regional Meteorological Centre Lucknow/प्रादेशिक मौसम केन्द्र लखनऊ



ISSUED ON: -27.08.2026

BULLETIN NO. 69/26

Crops	Crops (Stage)	<u>NODAL OFFICER VARANASI (B.H.U.):</u> Districts: Varanasi, Azamgarh, Ghazipur, Chandauli, Sonbhadra, Mirzapur, SantRavidasnagar, Jaunpur and Mau
Rice	Vegetative	Apply urea based on leaf colour. Avoid extra urea on dark green leaves. Closerat burrows on field bunds after rainfall.
Pigeon Pea	Vegetative	Prevent waterlogging, carry out light weeding, and monitor for stem rot andinsect pests.
Sesame (Til)	Flowering	Maintain field drainage and watch for leaf disease symptoms.
Maize	Vegetative	Drain excess rainwater promptly and minimize the duration of waterlogging. Monitor regularly for fall armyworm and stem borer. Avoid field operations when the soil is excessively wet to prevent soil compaction.
Green Gram	Vegetative	Maintain proper drainage and prevent water stagnation. Monitor for yellowing, root rot and stem rot symptoms. Avoid irrigation and unnecessary field operations during rainy conditions.
Okra/ Ladyfinger	Fruit Maturity	After rainfall, perform light hoeing, install yellow sticky traps, and removeinfected leaves.
Bottle Gourd	Fruit Maturity	Keep fruits away from wet soil by placing dry straw, mulch, or plastic beneath them.
Live Stocks	Cow	Do not feed wet green fodder immediately after rain; dry it in the shade first.Clean and dry hooves daily.

*Next bulletin will be issued on 01.09.2026.

Regional Meteorological Center, Lucknow



0522-2436283



<https://imdgeospatial.imd.gov.in/>



mclucknow@gmail.com



Govt. of India/भारत सरकार
Ministry of Earth Sciences/पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
India Meteorological Department/भारत मौसम विज्ञान विभाग
Regional Meteorological Centre Lucknow/प्रादेशिक मौसम केन्द्र लखनऊ



LEGENDS

WARNING

WARNING (TAKE ACTION)
ALERT (BE PREPARED)
WATCH (BE UPDATED)
NO WARNING (NO ACTION)

Probabilistic Forecast

Terms	Probability of Occurrence (%)
Unlikely	< 25
Likely	25 - 50
Very Likely	50 - 75
Most Likely	> 75



Heavy: 64.5 to 115.5 mm/cm *
Very Heavy: 115.6 to 204.4 mm/cm *
Extremely Heavy: > 204.4 mm/cm *



When maximum temperature of a station reaches $\geq 40^{\circ}\text{C}$ for plains and $\geq 30^{\circ}\text{C}$ for hilly regions

(a) Based on Departure from normal

Heat Wave: Maximum Temperature Departure from normal 4.5°C to 6.4°C .

Severe Heat Wave: Maximum Temperature Departure from normal $\geq 6.5^{\circ}\text{C}$

(b). Based on Actual maximum temperature

Heat Wave: When actual maximum temperature $\geq 45^{\circ}\text{C}$.

Severe Heat Wave: When actual maximum temperature $\geq 47^{\circ}\text{C}$

(c). Criteria for heat wave for coastal stations

When maximum temperature departure is $> 4.5^{\circ}\text{C}$ from normal. Heat Wave may be described provided maximum temperature $\geq 37^{\circ}\text{C}$



When maximum temperature remains 40°C

Warm Night: When minimum temperature departure 4.5°C to 6.4°C .

Severe Warm Night: When minimum temperature departure $> 6.4^{\circ}\text{C}$.



When minimum temperature of a station $\leq 10^{\circ}\text{C}$ for plains and $\leq 0^{\circ}\text{C}$ for hilly regions.

(a). Based on departure

Cold Wave: Minimum Temperature Departure from normal -4.5°C to -6.4°C .

Severe Cold Wave: Minimum Temperature Departure from normal $\leq -6.5^{\circ}\text{C}$

(b) Based on actual Minimum Temperature (for Plains only)

Cold Wave: When Minimum Temperature is $\leq 4.0^{\circ}\text{C}$

Severe Cold Wave: When Minimum Temperature is $\leq 2.0^{\circ}\text{C}$

(c) For Coastal Stations

When Minimum Temperature departure is $\leq -4.5^{\circ}\text{C}$ & actual Minimum Temperature is $\leq 15^{\circ}\text{C}$



When minimum temperature of a station $\leq 10^{\circ}\text{C}$ for plains and $\leq 0^{\circ}\text{C}$ for hilly regions

Based on departure

Cold Day: Maximum Temperature Departure from normal -4.5°C to -6.4°C .

Severe Cold Day: Maximum Temperature Departure from normal $\leq -6.5^{\circ}\text{C}$



Phenomenon of small droplets suspended in air and the horizontal visibility $< 1\text{km}$

Moderate Fog: When the visibility between 500-200 metres

Dense Fog: when the visibility between 50-200 metres

Very Dense Fog: when the visibility < 50 metres



Sudden electrical discharges manifested by a flash of light (Lightning) and a sharp rumbling sound (thunder)



An ensemble of particles of dust or sand energetically lifted to great heights by a strong and turbulent wind.



Ice deposits on ground

Air temperature $\leq 4^{\circ}\text{C}$ (over Plains)



A strong wind that rises suddenly, lasts for atleast 1 minute.

Moderate: Wind speed 52-61 kmph

Severe: Wind speed 62-87 kmph

Very Severe: Wind speed > 87 kmph



Effect of various waves in the sea over specific area

Rough to very rough: Wind speed 41-62 kmph (22-33 knots) & Wave height 2.5-6 metre

High to very high: Wind speed 63-117 kmph (34-63 knots) & Wave height 6-14 metre

Phenomenal: Wind speed > 117 kmph (> 63 knots) & Wave height > 14 metre



Cyclonic Storm: Wind speed 62-87 kmph (34-47 knots)

Severe Cyclonic Storm: Wind speed 88-117 kmph (48-63 knots)

Very Severe Cyclonic Storm: Wind speed 118-165 kmph (64 - 89 knots)

Extremely Severe Cyclonic Storm: Wind speed 166-220 kmph (90 -119 knots)

Super Cyclone Storm: Wind speed > 220 kmph (> 119 knots)

For More Updates



<https://mausam.imd.gov.in/lucknow/>



[@CentreLucknow](https://twitter.com/CentreLucknow)



<https://www.facebook.com/mclucknow>



0522-2436283



<https://imdgeospatial.imd.gov.in/>



mclucknow@gmail.com