

Mathématique - Corrigé Devoir Maison n°17

Exercice 1

1. (a) Montrons par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$ que : $\sum_{k=0}^n \binom{k+2}{2} = \binom{n+3}{3}$

• *initialisation*

Pour $n = 0$, on vérifie l'égalité : $\sum_{k=0}^0 \binom{k+2}{2} = 1 = \binom{0+3}{3}$

• *hérédité*

En supposant la proposition établie au rang n , on a au rang $n+1$:

$$\sum_{k=0}^{n+1} \binom{k+2}{2} = \sum_{k=0}^n \binom{k+2}{2} + \binom{n+3}{2} = \binom{n+3}{3} + \binom{n+3}{2} = \binom{(n+1)+3}{3}$$

D'après la formule de Pascal $\binom{n}{p-1} + \binom{n}{p} = \binom{n+1}{p}$

On a donc montré par récurrence que pour tout n : $\sum_{k=0}^n \binom{k+2}{2} = \binom{n+3}{3}$

- (b) Sachant que $\binom{k+2}{2} = \frac{(k+2)(k+1)}{2}$ et $\binom{n+3}{3} = \frac{(n+3)(n+2)(n+1)}{6}$, on vient de montrer que :

$$\sum_{k=0}^n \frac{(k+2)(k+1)}{2} = \frac{(n+3)(n+2)(n+1)}{6} \text{ ce qui donne la réponse suivante :}$$

$$\boxed{\sum_{k=0}^n (k+1)(k+2) = \frac{(n+3)(n+2)(n+1)}{3}}$$

2. (a) L'expérience consiste à extraire une boule dans l'urne \mathcal{U} contenant deux boules blanches et une boule noire. Il y a équiprobabilité et $P(B_1) = \frac{2}{3}$

- (b) $P(B_1 \cap B_2) = P(B_1)P_{B_1}(B_2) = \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{2}$ d'après la formule des probabilités composées.

En effet, sachant qu'on a pris une blanche au premier tirage, l'urne \mathcal{U} contient alors trois blanches et une noire pour le deuxième tirage. On a donc $P_{B_1}(B_2) = \frac{3}{4}$.

$$\text{De même } P(N_1 \cap B_2) = P(N_1)P_{N_1}(B_2) = (1 - P(B_1))P_{N_1}(B_2) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}.$$

En effet, sachant qu'on a pris une noire au premier tirage, l'urne \mathcal{U} contient alors deux blanches et deux noires pour le deuxième tirage. On a donc $P_{N_1}(B_2) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

En appliquant la formule des probabilités totales, avec $\{B_1, N_1\}$ système complet d'événements :

$$P(B_2) = P(B_1 \cap B_2) + P(N_1 \cap B_2) = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$$

- (c) En appliquant la définition d'une probabilité conditionnelle :

$$P_{B_2}(B_1) = \frac{P(B_1 \cap B_2)}{P(B_2)} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{2}{3}} = \frac{3}{4}$$

3. (a) $P(A_1) = P(N_1) = \frac{1}{3}$ est un cas particulier.

$$P(A_2) = P(B_1 \cap N_2) = P(B_1)P_{B_1}(N_2) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{6}$$

D'une manière plus générale, obtenir une première boule noire au k tirage se décompose en :

- obtenir une blanche au premier tirage, de probabilité $P(B_1) = \frac{2}{3}$
- puis, obtenir une blanche au deuxième tirage, de probabilité $P_{B_1}(B_2) = \frac{3}{4}$
- \vdots
- puis obtenir une blanche au $(k-1)$ -ème tirage, de probabilité $P_{B_1 \cap \dots \cap B_{k-2}}(B_{k-1}) = \frac{k}{k+1}$
- Pour finir, obtenir une première noire au k -ième tirage, de probabilité $P_{B_1 \cap \dots \cap B_{k-1}}(N_k) = \frac{1}{k+2}$

On applique la formule des probabilités composées

$$\begin{aligned} P(A_k) &= P(B_1 \cap B_2 \cap \dots \cap N_k) \\ &= P(B_1) \cdot P_{B_1}(B_2) \cdot P_{B_1 \cap B_2}(B_3) \cdot \dots \cdot P_{B_1 \cap \dots \cap B_{k-2}}(B_{k-1}) \cdot P_{B_1 \cap \dots \cap B_{k-1}}(N_k) \\ &= \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \dots \times \frac{k}{k+1} \times \frac{1}{k+2} = \frac{2}{(k+1)(k+2)} \end{aligned}$$

Donc $\boxed{P(A_k) = \frac{2}{(k+1)(k+2)}} \quad (\text{valable y compris pour } k=1)$

(b) $M_n = \bigcup_{k=1}^n A_k$ et la réunion est disjointe. On trouve donc :

$$P(M_n) = \sum_{k=1}^n P(A_k) = \sum_{k=1}^n \frac{2}{(k+1)(k+2)}$$

Pour simplifier cette somme, on décompose en éléments simples :

$$\begin{aligned} \frac{2}{(k+1)(k+2)} &= \frac{a}{k+1} + \frac{b}{k+2} = \frac{(a+b)k + 2a + b}{(k+1)(k+2)} = \frac{2}{(k+1)(k+2)} \\ \iff \begin{cases} a+b=0 \\ 2a+b=2 \end{cases} &\iff \begin{cases} a=2 \\ b=-2 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\text{On en déduit que } \sum_{k=1}^n \frac{2}{(k+1)(k+2)} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{2}{k+1} - \frac{2}{k+2} \right) = 1 - \frac{2}{n+2} = \frac{n}{n+2}$$

car il s'agit d'une somme télescopique.

Donc $\boxed{P(\text{"obtenir au moins une boule noire lors des } n \text{ premiers tirages"}) = \frac{n}{n+2}}$

$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(M_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n+2} = 1$ ce qui s'interprète par « on est quasi-sûr d'avoir une noire un moment ou à un autre ».

Remarque : On aurait pu calculer $P(\overline{M_n})$ car $\overline{M_n} = B_1 \cap B_2 \cap \dots \cap B_n$ ce qui donne $P(\overline{M_n}) = \frac{2}{n+2}$ avec la formule des probabilités composées.

4. (a) Obtenir successivement k boules blanches puis $n-k$ boules noires se décompose en :

- obtenir une blanche au premier tirage, de probabilité $P(B_1) = \frac{2}{3}$
- puis, obtenir une blanche au deuxième tirage, de probabilité $P_{B_1}(B_2) = \frac{3}{4}$
- \vdots
- puis obtenir une blanche au k ème tirage, de probabilité $P_{B_1 \cap \dots \cap B_{k-1}}(B_k) = \frac{k+1}{k+2}$

- obtenir une première noire au $(k+1)$ -ième tirage, de probabilité

$$P_{B_1 \cap \dots \cap B_k}(N_{k+1}) = \frac{1}{k+3}$$

- obtenir une deuxième noire au $(k+2)$ -ième tirage, de probabilité

$$P_{B_1 \cap \dots \cap B_k \cap N_{k+1}}(N_{k+2}) = \frac{2}{k+4}$$

⋮

- obtenir une $(n-k)$ ième noire au n -ième tirage, de probabilité

$$P_{B_1 \cap \dots \cap B_k \cap N_{k+1} \cap \dots \cap N_{n-1}}(N_n) = \frac{n-k}{n+2}$$

On applique la formule des probabilités composées et cela donne :

$$P(\text{"on tire successivement } k \text{ boules blanches puis } n-k \text{ boules noires"}) \\ = \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \dots \times \frac{k+1}{k+2} \times \frac{1}{k+3} \times \frac{2}{k+4} \times \dots \times \frac{n-k}{n+2} = \frac{2(k+1)!(n-k)!}{(n+2)!}$$

- (b) Cette probabilité vaut la précédente, car le produit des numérateurs (aux permutations près dues aux ordres d'apparitions successifs de s blanches et/ou noires) fera $2 \times 3 \times \dots \times (k+1) \times 1 \times 2 \times \dots \times (n-k)$ et le produit des dénominateurs donnera $3 \times \dots \times (n+2)$.

$$P(\text{"lors des } n \text{ premiers tirages, on a } k \text{ blanches en tout dans un ordre choisi"}) \\ = \frac{2(k+1)!(n-k)!}{(n+2)!}.$$

- (c) Il y a $\binom{n}{k}$ façons de sélectionner k rangs parmi n . Il y a donc $\binom{n}{k}$ façons de choisir un ordre d'apparition de k blanches et de $n-k$ noires.

C_k est la réunion disjointe des $\binom{n}{k}$ événements du type de la question précédente. Chacun de ces événements à une probabilité de $\frac{2(k+1)!(n-k)!}{(n+2)!}$.

$$\text{Donc } P(C_k) = \binom{n}{k} \times \frac{2(k+1)!(n-k)!}{(n+2)!} = \frac{2(k+1)}{(n+1)(n+2)}$$

5. (a) • Pour tout k compris entre 0 et n , on a $C_k \neq \emptyset$ (car sa probabilité est non nulle par exemple)
 • Pour tout $(i, j) \in [[0, n]]^2$ avec $i \neq j$, on a $C_i \cap C_j = \emptyset$: il n'y a qu'un seul nombre de blanches obtenues lors des n tirages.

- On a $\bigcup_{k=0}^n C_k = \Omega$: tous les résultats de l'expérience sont dans un des C_k (celui qui correspond au nombre de blanches obtenues).

Donc les événements C_k (pour $0 \leq k \leq n$) forment un système complet.

- (b) On remarque que, sachant C_k , l'urne contient $k+2$ blanches et $n-k+1$ noires pour le $(n+1)$ -ième tirage.

$$\text{Dans ces conditions } P_{C_k}(A_{n+1}) = \frac{k+2}{n+3}$$

On utilise la formule des probabilités totales :

$$P(B_{n+1}) = \sum_{k=0}^n P(C_k)P_{C_k}(A_{n+1}) = \sum_{k=0}^n \frac{2(k+1)(k+2)}{(n+1)(n+2)(n+3)} = \frac{2}{3}$$

Donc $P(B_{n+1}) = \frac{2}{3}$ et on constate que cette probabilité ne dépend pas de n ...

Exercice 2

Question préliminaire :

Il s'agit de l'espérance d'une V.A.R. suivant une loi $\mathcal{B}(n, p)$:
$$\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = np$$

1. On définit les événements :

- A "on joue avec la pièce A ",
- $B = \bar{A}$ "on joue avec la pièce A "
- pour $k \geq 1$, H_k "obtenir "pile" au k -ième lancer.

On applique la formule des probabilités totales avec le système complet d'événements $\{A, B\}$.

$$P(H_1) = P(A)P_A(H_1) + P(B)P_B(H_1) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} + \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{11}{18}$$

2. Par la définition d'une probabilité conditionnelle :

$$P_{H_1}(A) = \frac{P(A \cap H_1)}{P(H_1)} = \frac{\frac{1}{3} \times \frac{1}{2}}{\frac{11}{18}} = \frac{3}{11}$$

3. (a) Sachant que l'on joue avec la pièce A , X compte le nombre de succès dans une suite de n expériences identiques et indépendantes à deux issues (avec la probabilité de succès qui vaut $\frac{1}{2}$).

On en déduit que $X|_A$ suit une loi binomiale. Plus précisément $X|_A \hookrightarrow \mathcal{B}(n, \frac{1}{2})$

- (b) • L'ensemble des valeurs prises par X est $X(\Omega) = [[0, n]]$
- $\forall k \in [[0, n]]$, en appliquant la formule des probabilités totales avec le système complet d'événements $\{A, B\}$:

$$P(X = k) = P(A)P_A(X = k) + P(B)P_B(X = k) = \frac{1}{3} \binom{n}{k} \frac{1}{2^n} + \frac{2}{3} \binom{n}{k} \left(\frac{2}{3}\right)^k \left(\frac{1}{3}\right)^{n-k}$$

$$\text{D'où } P(X = k) = \frac{\binom{n}{k}}{3} \left(\frac{1}{2^n} + \frac{2^{k+1}}{3^n} \right)$$

(c) Par définition $P_{X=0}(A) = \frac{P(A \cap (X=0))}{P(X=0)} = \frac{\frac{1}{3} \frac{1}{2^n}}{\frac{1}{3} \frac{1}{2^n} + \frac{2}{3} \left(\frac{1}{3}\right)^n}$

$$\text{D'où } P_{X=0}(A) = \frac{3^n}{3^n + 2^{n+1}}$$

(d) Par définition

$$E(X) = \sum_{k=0}^n k P(X = k) = \frac{1}{3} \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} \frac{1}{2^n} + \frac{2}{3} \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} \left(\frac{2}{3}\right)^k \left(\frac{1}{3}\right)^{n-k} = \frac{1}{3} \times \frac{n}{2} + \frac{2}{3} \times \frac{2n}{3}$$

$$\text{D'où } E(X) = \frac{11n}{18}$$