Thuật toán Kruskal



$MST = \emptyset$

$d(MST) = 0$

$n = 8$; $n - 1 = 7$

STT	Sắp xếp	Cây khung cực tiểu MST	d
1	(2, 5) : 1	(2,5)	1
2	(1, 5) : 2	(2, 5) ; (1, 5)	3
3	(2,3) : 2	(2,5) ; (1,5) ; (2,3)	5
4	(5,6) : 2	(2, 5) ; (1,5) ; (2,3) ; (5,6)	7
5	(2,6) : 3		
6	(0,1) : 4	(2, 5) ; (1,5) ; (2,3) ; (5,6) ; (0,1)	11
7	(0,3) : 5		
8	(4,7) : 6	(2, 5) ; (1, 5) ; (2,3) ; (5,6) ; 0,1) ; (4,7)	17
9	(3,6) : 7		
10	(6,7) : 7	(2,5) ; (1,5) ; (2,3) ; (5,6) : (0,1) ; (4,7), (6,7)	24
11	(0,2) : 9	Dừng vòng lặp (break) vì	
12	(5,7) : 12	$\lvert MST \rvert = n - 1 = 7$ (cạnh)	
13	(1,4) : 15		

Cây khung cực tiểu là:



$d = 24.$

Dijst Dijkstra : tìm đường đi ngắn nhất.



Bước	Đỉnh đã duyệt	1	2	3	4	5
1	0	4,0	5,0	∞,-	∞,-	∞,-
2	0,1		5,0	6,1	11,1	∞,-
3	0,1,2			6,1	8,2	∞,-
4	0,1,2,3				8,2	14,3
5	0,1,2,3,4					12,4
6	0,1,2,3,4,5	4,0	5,0	6,1	8,2	$\boxed{12,4}$

0 → 2 → 4 → 5 : đường đi ngắn nhất.