

DECISION TREE PEMILIHAN UJI HIPOTESIS FK

Panduan Pemilihan Uji Statistik Bivariat & Multivariat Penelitian Kedokteran

1. Dua Pertanyaan Kunci Penentuan Uji Hipotesis

Sebelum memilih uji statistik, peneliti wajib menetapkan dua parameter dasar secara presisi: (1) Skala variabel (kategorik vs numerik) dan (2) Hubungan antarkelompok sampel (bebas vs berpasangan).

2. Matriks Komprehensif Uji Hipotesis Bivariat Kedokteran

Jenis Variabel Bebas & Terikat	Hubungan Kelompok	Uji Parametrik (Normal)	Uji Non-Parametrik (Miring)
Numerik vs Numerik	Korelasi / Asosiasi	Pearson Correlation	Spearman / Kendall's Tau
Numerik vs Kategorik (2 Kelompok)	Bebas (Independen)	Independent T-Test	Mann-Whitney U Test
Numerik vs Kategorik (2 Kelompok)	Berpasangan (Paired)	Paired T-Test	Wilcoxon Signed-Rank
Numerik vs Kategorik (>2 Kelompok)	Bebas (Independen)	One-Way ANOVA	Kruskal-Wallis Test
Numerik vs Kategorik (>2 Kelompok)	Berpasangan (Paired)	Repeated Measures ANOVA	Friedman Test
Kategorik vs Kategorik	Bebas (Tabel 2x2 / RxC)	Chi-Square Test (Syarat $E \geq 5$)	Fisher's Exact / Kolmogorov

3. Protokol Uji Normalitas Data Klinis

- Sampel < 50 subjek: Wajib menggunakan uji Shapiro-Wilk (Distribusi normal jika $p > 0.05$).
- Sampel ≥ 50 subjek: Gunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau rasio Skewness/Kurtosis.
- Data tidak normal: Lakukan transformasi data atau gunakan uji non-parametrik yang ekuivalen.