





SINERGIA AGRÍCOLA
CAPACITACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL



MANUAL COMPLETO DEL CURSO

Cultivo y Manejo de Gerberas


Guía técnica para producción comercial
de flor de corte y planta en maceta



IMPARTIDO POR

Dr. Marco Antonio Villegas Olguín

Doctor en Agricultura Protegida





Contenido del manual

- 01 Introducción al cultivo de la gerbera
- 02 Establecimiento del cultivo
- 03 Riego, nutrición y manejo
- 04 Plagas, enfermedades y manejo preventivo
- 05 Cosecha, postcosecha e hidratación
- 06 Producción rentable y comercialización
- Glosario técnico

Cómo aprovechar este manual

Este documento acompaña los 5 módulos en video del curso. Te recomendamos leer cada capítulo antes de ver el módulo correspondiente y volver a él cuando estés aplicando lo aprendido en campo. Las tablas de referencia rápida y los recuadros de **consejo del experto** están pensados para consultarse directamente en tu invernadero.

MÓDULO 01

Introducción al cultivo de la gerbera

La gerbera (*Gerbera jamesonii*) es una de las flores de corte más rentables y demandadas del mercado ornamental mexicano. Su amplia gama de colores, su larga vida en florero y su producción continua durante buena parte del año la convierten en un cultivo ideal tanto para el productor que inicia como para el que busca diversificar su invernadero.

¿Por qué producir gerbera?

- **Alta rotación comercial:** es una de las flores más solicitadas en arreglos, eventos y floristerías.
- **Producción sostenida:** una planta bien manejada produce tallos comerciales durante 2 a 3 años.
- **Diversidad de mercado:** se comercializa como flor de corte y como planta en maceta.
- **Rentabilidad por m²:** con densidad y manejo adecuados, ofrece uno de los mejores retornos por superficie.

Requerimientos generales del cultivo

Antes de establecer tu cultivo conviene tener claras las condiciones que la gerbera necesita para expresar todo su potencial productivo. La siguiente tabla resume los parámetros de referencia:

Parámetro	Rango óptimo	Observación
Temperatura día	20 – 24 °C	Sobre 30 °C se frena la floración
Temperatura noche	12 – 16 °C	Debajo de 8 °C hay riesgo de daño
Humedad relativa	70 – 75 %	Alta HR favorece enfermedades foliares
pH del sustrato	5.5 – 6.5	Fuera de rango bloquea nutrientes
CE del sustrato	1.5 – 2.0 mS/cm	Ajustar según etapa del cultivo
Luminosidad	Alta, difusa	Evitar sol directo intenso de mediodía

Consejo del experto — Dr. Marco Antonio Villegas

La gerbera es muy sensible al exceso de humedad en la corona de la planta. Desde el diseño del cultivo, prioriza un buen drenaje y evita enterrar el cuello de la planta: el 80 % de los problemas sanitarios que veo en campo empiezan por una plantación demasiado profunda.

Establecimiento del cultivo

Selección de variedades

La elección de la variedad determina buena parte de tu éxito comercial. Existen dos grandes grupos según el destino de la producción:

- **Gerbera estándar (flor grande):** capítulos de 10 a 12 cm, ideal para flor de corte premium.
- **Gerbera mini (germini):** capítulos de 7 a 9 cm, muy usada en arreglos y con gran vida en florero.
- **Gerbera para maceta:** variedades compactas seleccionadas para punto de venta y vivero.

Preparación del terreno y camas

La gerbera se cultiva preferentemente en camas elevadas o en contenedores, lo que mejora el drenaje y facilita el manejo sanitario. Los pasos clave del establecimiento son:

- Nivelación y desinfección previa del terreno o sustrato.
- Construcción de camas elevadas de 30–40 cm de altura para asegurar drenaje.
- Preparación del sustrato: mezcla aireada con buena retención (fibra de coco, perlita, composta).
- Instalación del sistema de riego por goteo antes del trasplante.

Densidad y trasplante

Sistema	Densidad recomendada	Distancia entre plantas
Flor de corte (suelo)	6 – 7 plantas/m ²	30 × 30 cm
Flor de corte (camas)	7 – 8 plantas/m ²	25 × 30 cm
Producción en maceta	Según calibre de maceta	1 planta por maceta

Punto crítico — Profundidad de plantación

Al trasplantar, la corona de la planta debe quedar 1–2 cm POR ENCIMA del nivel del sustrato. Enterrar la corona es la causa número uno de pudriciones tempranas en gerbera.

MÓDULO 03

Riego, nutrición y manejo

Manejo del riego

El riego en gerbera busca un equilibrio delicado: la planta necesita humedad constante pero no tolera encharcamientos. El riego por goteo es el sistema de elección porque permite dosificar agua y nutrientes con precisión sin mojar el follaje ni la corona.

Nutrición por etapa fenológica

Los requerimientos nutricionales cambian según la etapa del cultivo. Esta tabla es una referencia general que deberás ajustar según tu análisis de agua y sustrato:

Etapa	Enfoque nutricional	CE objetivo
Establecimiento	Enraizamiento (P y Ca)	1.2 – 1.5 mS/cm
Desarrollo vegetativo	Crecimiento (N y K)	1.5 – 1.8 mS/cm
Inducción floral	Balance (K, Ca, micros)	1.8 – 2.0 mS/cm
Floración plena	Sostenimiento (K alto)	1.8 – 2.2 mS/cm

Micronutrientes esenciales

El hierro (Fe), el manganeso (Mn) y el boro (B) son especialmente importantes en gerbera. Las deficiencias se manifiestan primero en las hojas jóvenes (clorosis internerval) y en la calidad del tallo floral. Mantener el pH en rango asegura que estos elementos estén disponibles.

Consejo del experto — Lectura diaria de CE y pH

Acostúmbrate a medir la CE y el pH del drenaje todos los días, a la misma hora. Ese hábito simple te avisa de un desajuste nutricional dos o tres días antes de que aparezca en la planta. La gerbera premia al productor observador.

MÓDULO 04

Plagas, enfermedades y manejo preventivo

Principales plagas

Plaga	Daño característico	Manejo preventivo
Trips	Raspado y deformación de pétalos	Trampas azules, monitoreo semanal
Mosca blanca	Debilita planta, transmite virus	Trampas amarillas, control biológico
Pulgón	Deforma brotes tiernos	Revisión de brotes, enemigos naturales
Ácaros (araña roja)	Punteado y bronceado foliar	Elevar HR, acaricidas específicos
Minador	Galerías en hojas	Retiro de hojas afectadas

Principales enfermedades

Enfermedad	Agente	Condición que la favorece
Oídio (cenicilla)	Hongo (Erysiphe)	Baja HR nocturna, cambios térmicos
Botrytis	Hongo (B. cinerea)	Alta HR, mala ventilación
Fusarium	Hongo de suelo	Exceso de humedad, corona enterrada
Phytophthora	Hongo de suelo	Encharcamiento, mal drenaje

Filosofía del manejo integrado (MIP)

El mejor tratamiento es el que no tienes que aplicar. Prioriza siempre: 1) monitoreo constante, 2) manejo del ambiente (HR, ventilación, drenaje), 3) control biológico y cultural, y sólo como último recurso 4) control químico responsable y rotando modos de acción.

MÓDULO 05

Cosecha, postcosecha e hidratación

Punto óptimo de corte

La gerbera se cosecha cuando la flor está completamente abierta y las dos o tres hileras externas de estambres han liberado polen. Cortar antes de tiempo provoca que el tallo se doble ("cuello de cisne") y la flor no abra bien en florero.

- **Corte:** se realiza jalando el tallo desde la base con un giro suave, no cortando con tijera, para evitar dejar tocones que pudren.
- **Hora ideal:** temprano en la mañana o al atardecer, con la planta turgente.
- **Manejo inmediato:** colocar los tallos en agua limpia con solución hidratante lo antes posible.

Soluciones de postcosecha

Etapa	Solución	Función
Hidratación inicial	Agua + acidificante (pH 3.5)	Facilita absorción, evita tapones
Acondicionamiento	Solución con azúcar + biocida	Nutre y controla bacterias
Transporte	Seco o húmedo según distancia	Mantener cadena de frío

Clasificación comercial

La flor se clasifica por diámetro del capítulo, longitud y grosor del tallo, y ausencia de defectos. Una clasificación honesta y consistente construye tu reputación con el comprador y te permite negociar mejores precios.

Consejo del experto — La vida en florero se decide en tu invernadero

Un cliente satisfecho vuelve. La diferencia entre una gerbera que dura 5 días y una que dura 12 no está en el florero del comprador, sino en cómo la cortaste, hidrataste y enfriaste tú. La postcosecha es parte de tu producción, no un trámite final.

MÓDULO 06

Producción rentable y comercialización

Programación de la producción

La rentabilidad de la gerbera depende de producir de forma constante y de concentrar volumen en las fechas de mayor demanda (San Valentín, Día de las Madres, Día de Muertos, temporada de bodas). Planificar el cultivo hacia esas fechas puede duplicar el precio de venta del tallo.

Indicadores clave a controlar

- **Tallos comerciales por m² por mes:** tu principal indicador de productividad.
- **Porcentaje de flor de primera calidad:** mide la eficiencia de tu manejo.
- **Costo de producción por tallo:** base para fijar precio y margen.
- **Merma de postcosecha:** cada flor perdida es dinero invertido que no se recupera.

Canales de comercialización

Canal	Ventaja	A considerar
Floristerías locales	Precio justo, relación directa	Requiere constancia y calidad
Mercado de abasto	Volumen alto	Precio variable, competencia
Eventos y bodas	Precio premium	Demanda por temporada
Venta directa	Mejor margen	Requiere esfuerzo comercial

Cierre — De productor a empresario

Producir buena flor es la mitad del negocio; la otra mitad es venderla bien. Conoce tus costos, clasifica con honestidad, cumple tus entregas y construye relaciones de largo plazo con tus compradores. Ahí está la verdadera rentabilidad de la gerbera.

Glosario técnico

Capítulo	La "flor" de la gerbera; en realidad es una inflorescencia compuesta por muchas flores pequeñas.
CE (Conductividad Eléctrica)	Medida de la concentración de sales/nutrientes en la solución. Se expresa en mS/cm.
Corona	Zona de unión entre raíz y follaje. Punto sensible: nunca debe enterrarse.
Etapas fenológicas	Cada fase del desarrollo de la planta (establecimiento, vegetativo, floración).
Fertirriego	Aplicación de fertilizantes disueltos junto con el agua de riego.
MIP	Manejo Integrado de Plagas: estrategia que combina monitoreo, control biológico, cultural y químico.
Postcosecha	Conjunto de manejos después del corte para preservar la calidad y vida de la flor.
Turgente	Estado de la planta bien hidratada, con células llenas de agua.
Vida en florero	Días que la flor se mantiene comercialmente atractiva después del corte.