Banderas Rojas en Fisioterapia

Señales de alarma que requieren derivación médica inmediata

⚠ Si identificas alguna de estas señales, suspende el tratamiento fisioterapéutico y deriva al médico de inmediato.

Región	Sospecha	Signos y síntomas clave	Acción
Lumbar	**Síndrome de cauda equina**	Pérdida de control de esfínteres, anestesia en silla de montar, debilidad bilateral en piernas	**Derivar de inmediato**
	Fractura vertebral	Trauma significativo, osteoporosis conocida, uso prolongado de corticoides, dolor intenso súbito	**Derivar de inmediato**
	Infección espinal	Fiebre, pérdida de peso inexplicable, inmunosupresión, uso de drogas intravenosas, infección reciente	**Derivar de inmediato**
	Tumor / Neoplasia	Antecedente de cáncer, dolor nocturno que no cede con reposo, pérdida de peso inexplicable, edad >50 años	**Derivar de inmediato**
Cervical	**Mielopatía cervical**	Torpeza en manos, alteración de la marcha, hiperreflexia, signo de Babinski positivo	**Derivar de inmediato**
	Insuficiencia vertebrobasilar	Mareo, diplopía, disfagia, disartria, náuseas con movimientos cervicales	**Derivar de inmediato**
	Fractura cervical	Trauma (accidente vehicular, caída de altura), dolor intenso, espasmo severo	**Derivar de inmediato**
Extremidades	**Trombosis venosa profunda**	Pantorrilla hinchada, caliente, roja y dolorosa; signo de Homans positivo; inmovilización reciente	**Derivar de inmediato**
	Síndrome compartimental	Dolor desproporcionado, parestesias, palidez, ausencia de pulso distal, tensión del compartimento	**Derivar de inmediato**
	Fractura no diagnosticada	Dolor puntual intenso, deformidad, crepitación, incapacidad funcional tras trauma	**Derivar de inmediato**
Neurológica	**Déficit neurológico progresivo**	Debilidad que avanza, pérdida sensitiva creciente, alteración de reflejos en patrón	**Derivar de inmediato**
	Cefalea súbita intensa	"La peor cefalea de mi vida", rigidez de nuca, alteración del estado de conciencia	**Derivar de inmediato**

Nota: *Esta guía no es exhaustiva. Ante cualquier presentación clínica atípica o que genere duda, es preferible derivar al médico para evaluación.*

Material educativo. No sustituye el criterio clínico ni los protocolos de tu institución.