Ley de Gay-Lussac: cómo despejar cada magnitud

Quiero despejar p_2

1. Escribe la ley. $$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$$
2. Las **T** están **dividiendo**: cada una pasa al otro lado **multiplicando** (multiplicar en cruz). $$p_1 \cdot T_2 = p_2 \cdot T_1$$
3. T_1 está **multiplicando** a p_2: divide **los dos lados** entre T_1. $$\frac{p_1 \cdot T_2}{T_1} = \frac{p_2 \cdot \cancel{T_1}}{\cancel{T_1}}$$

✓ Resultado:

$$\boxed{p_2 = \frac{p_1 \cdot T_2}{T_1}}$$

Quiero despejar T_2

1. Escribe la ley. $$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$$
2. Las **T** están **dividiendo**: cada una pasa al otro lado **multiplicando** (multiplicar en cruz). $$p_1 \cdot T_2 = p_2 \cdot T_1$$
3. p_1 está **multiplicando** a T_2: divide **los dos lados** entre p_1. $$\frac{\cancel{p_1} \cdot T_2}{\cancel{p_1}} = \frac{p_2 \cdot T_1}{p_1}$$

✓ Resultado:

$$\boxed{T_2 = \frac{p_2 \cdot T_1}{p_1}}$$

Quiero despejar p_1

1. Escribe la ley. $$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$$
2. Las **T** están **dividiendo**: cada una pasa al otro lado **multiplicando** (multiplicar en cruz). $$p_1 \cdot T_2 = p_2 \cdot T_1$$
3. T_2 está **multiplicando** a p_1: divide **los dos lados** entre T_2. $$\frac{p_1 \cdot \cancel{T_2}}{\cancel{T_2}} = \frac{p_2 \cdot T_1}{T_2}$$

✓ Resultado:

$$\boxed{p_1 = \frac{p_2 \cdot T_1}{T_2}}$$

Quiero despejar T_1

1. Escribe la ley. $$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$$
2. Las **T** están **dividiendo**: cada una pasa al otro lado **multiplicando** (multiplicar en cruz). $$p_1 \cdot T_2 = p_2 \cdot T_1$$
3. p_2 está **multiplicando** a T_1: divide **los dos lados** entre p_2. $$\frac{p_1 \cdot T_2}{p_2} = \frac{\cancel{p_2} \cdot T_1}{\cancel{p_2}}$$

✓ Resultado:

$$\boxed{T_1 = \frac{p_1 \cdot T_2}{p_2}}$$

Truco: lo que está **dividiendo** en un lado pasa al otro lado **multiplicando**, y lo que está **multiplicando** pasa al otro lado **dividiendo**.