

MMPI-2

다면적 인성검사 II 결과표

· 개인정보번호 :

· 이름 : 김상철


· 나이 : 48

· 성별 : 남자

· 소속기관 1 : 거제

· 소속기관 2 :

타당도 척도와 임상 척도



* Mf 척도의 T점수는 성별기준에 의한 것임.

재구성 임상 척도와 성격병리 5요인 척도

척도	RCd	RC1	RC2	RC3	RC4	RC6	RC7	RC8	RC9	AGGR	PSYC	DISC	NEGE	INTR
원점수	4	2	4	3	5	0	1	0	10	9	1	13	3	12
전체기준 T	40	37	42	38	47	36	34	35	45	52	33	52	33	43

내용 척도

척도	ANX	FRS	OBS	DEP	HEA	BIZ	ANG	CYN	ASP	TPA	LSE	SOD	FAM	WRK	TRT
원점수	5	6	2	3	2	0	3	7	5	5	0	3	3	5	2
전체기준 T	42	42	38	35	34	34	40	42	39	41	33	35	39	38	34

보충 척도

척도	A	R	Es	Do	Re	Mt	PK	MDS	Ho	O-H	MAC-R	AAS	APS	GM	GF
원점수	6	18	36	15	22	8	3	3	13	17	20	2	20	35	33
전체기준 T	36	49	59	54	60	35	33	42	40	62	49	43	48	63	57

MMPI-2

다면적 인성검사 II 결과표

· 개인정보번호 :

· 이름 : 김상철

· 나이 : 48


· 성별 : 남자

· 소속기관 1 : 거제

· 소속기관 2 :

1. MMPI-2 타당도 척도와 임상 척도 (Validity & Clinical Scales)

* 전체기준 T점수가 실선 그래프로 표시되었음.



척도	VRIN	TRIN	F	F(B)	F(P)	FBS	L	K	S	Hs +.5K	D	Hy	Pd +.4K	Mf	Pa	Pt +1K	Sc +1K	Ma +.2K	Si
원점수	7	8	3	0	0	13	5	21	36	7	24	28	17	26	8	5	5	17	18
K교정점수										18			25			26	26	21	
전체기준 T	43	53F	37	36	36	43	47	61	66	47	44	51	44		41	38	38	45	31
전체기준 T (K교정안함)										43			41			33	33	44	
성별기준 T	42	54F	37	36	36	45	47	62	66	49	47	53	44	50	42	39	39	44	32
성별기준 T (K교정안함)										45			41			34	34	43	
반응%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

* Mf 척도의 T점수는 성별기준에 의한 것임.

무응답(원점수):0	「그렇다」 응답비율:31%	「아니다」 응답비율:69%
------------	----------------	----------------

* 각 척도별 T점수의 최대값과 최소값은 "—"로 표시되었음.

2. MMPI-2 재구성 임상 척도와 성격병리 5요인 척도 (RC & PSY-5 Scales)

* 전체기준 T점수가 실선 그래프로 표시되었음.




* 각 척도별 T점수의 최대값과 최소값은 "—"로 표시되었음.

RCd	Demoralization (의기소침)	AGGR	Aggressiveness (공격성)
RC1	Somatic Complaints (신체증상 호소)	PSYC	Psychoticism (정신증)
RC2	Low Positive Emotions (낮은 긍정 정서)	DISC	Disconstraint (통제 결여)
RC3	Cynicism (냉소적 태도)	NEGE	Negative Emotionality/Neuroticism (부정적 정서성/신경증)
RC4	Antisocial Behavior (반사회적 행동)		
RC6	Ideas of Persecution (피해의식)	INTR	Introversion/Low Positive Emotionality (내향성/낮은 긍정적 정서성)
RC7	Dysfunctional Negative Emotions (역기능적 부정 정서)		
RC8	Aberrant Experiences (기태적 경험)		
RC9	Hypomanic Activation (경조증적 상태)		

3. MMPI-2 내용 척도 (Content Scales)

* 전체기준 T점수가 실선 그래프로 표시되었음.




* 각 척도별 T점수의 최대값과 최소값은 "—"로 표시되었음.

ANX	Anxiety (불안)	ASP	Antisocial Practices (반사회적 특성)
FRS	Fears (공포)	TPA	Type A (A 유형 행동)
OBS	Obsessiveness (강박성)	LSE	Low Self-Esteem (낮은 자존감)
DEP	Depression (우울)	SOD	Social Discomfort (사회적 불편감)
HEA	Health Concerns (건강염려)	FAM	Family Problems (가정 문제)
BIZ	Bizarre Mentation (기태적 정신상태)	WRK	Work Interference (직업적 곤란)
ANG	Anger (분노)	TRT	Negative Treatment Indicators (부정적 치료 지표)
CYN	Cynicism (냉소적 태도)		

4. MMPI-2 보충 척도 (Supplementary Scales)

* 전체규준 T점수가 실선 그래프로 표시되었음.



* 각 척도별 T점수의 최대값과 최소값은 "—"로 표시되었음.

A	Anxiety (불안)	Ho	Hostility (적대감)
R	Repression (억압)	O-H	Overcontrolled-Hostility (적대감 과잉통제)
Es	Ego Strength (자아강도)	MAC-R	MacAndrew Alcoholism-Revised (MacAndrew의 알코올 중독)
Do	Dominance (지배성)		
Re	Social Responsibility (사회적 책임감)	AAS	Addiction Admission (중독 인정)
Mt	College Maladjustment (대학생활 부적응)	APS	Addiction Potential (중독 가능성)
PK	Post-Traumatic Stress Disorder (외상후 스트레스 장애)	GM	Masculine Gender Role (남성적 성역할)
MDS	Marital Distress (결혼생활 부적응)	GF	Feminine Gender Role (여성적 성역할)

5. MMPI-2 임상 소척도 (Clinical Subscales)

* 전체기준 T점수가 그래프로 표시되었음

[Harris-Lingoes 소척도]

	원점수	전체기준 T점수	성별기준 T점수	그래프
				102030405060708090100110120
D	24	44	47	
D1 (주관적 우울감)	9	38	41	
D2 (정신운동 지체)	7	50	52	
D3 (신체적 기능 장애)	3	42	44	
D4 (둔감성)	3	40	41	
D5 (깊은 근심)	2	38	39	
Hy	28	51	53	
Hy1 (사회적 불안의 부인)	6	66	66	
Hy2 (애정 욕구)	8	61	61	
Hy3 (권태-무기력)	5	47	49	
Hy4 (신체증상 호소)	2	37	39	
Hy5 (공격성의 억제)	6	64	65	
Pd	17	44	44	
Pd1 (가정 불화)	2	43	43	
Pd2 (권위 불화)	4	53	52	
Pd3 (사회적 침착성)	5	59	59	
Pd4 (사회적 소외)	3	40	41	
Pd5 (내적 소외)	1	31	31	
Pa	8	41	42	
Pa1 (피해의식)	0	38	38	
Pa2 (예민성)	1	38	38	
Pa3 (순진성)	6	61	61	
Sc	5	38	39	
Sc1 (사회적 소외)	1	35	36	
Sc2 (정서적 소외)	0	34	35	
Sc3 (자아통합결여-인지적)	1	41	42	
Sc4 (자아통합결여-동기적)	1	36	37	
Sc5 (자아통합결여-억제부전)	0	37	37	
Sc6 (기태적 감각 경험)	1	35	36	
Ma	17	45	44	
Ma1 (비도덕성)	2	45	44	
Ma2 (심신운동 항진)	4	43	43	
Ma3 (냉정함)	5	58	57	
Ma4 (자아팽창)	4	51	50	

[Si 소척도]

	원점수	전체기준 T점수	성별기준 T점수	그래프
				102030405060708090100110120
Si	18	31	32	
Si1 (수줍음/자의식)	2	35	35	
Si2 (사회적 회피)	2	41	40	
Si3 (내적/외적 소외)	3	36	36	

6. MMPI-2 내용 소척도 (Content Component Scales)

* 전체기준 T점수가 그래프로 표시되었음

	원점수	전체기준 T점수	성별기준 T점수	그래프												
				10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	
FRS	6	42	45													
FRS1 (일반화된 공포)	2	45	48													
FRS2 (특정 공포)	4	43	46													
DEP	3	35	36													
DEP1 (동기 결여)	1	38	39													
DEP2 (기분 부전)	2	44	45													
DEP3 (자기 비하)	0	37	37													
DEP4 (자살 사고)	0	41	42													
HEA	2	34	35													
HEA1 (소화기 증상)	0	39	41													
HEA2 (신경학적 증상)	0	35	35													
HEA3 (일반적인 건강염려)	1	42	44													
BIZ	0	34	35													
BIZ1 (정신증적 증상)	0	39	40													
BIZ2 (조현형 성격특성)	0	39	39													
ANG	3	40	40													
ANG1 (폭발적 행동)	1	42	41													
ANG2 (성마름)	1	39	39													
CYN	7	42	41													
CYN1 (염세적 신념)	3	38	38													
CYN2 (대인 의심)	4	54	53													
ASP	5	39	39													
ASP1 (반사회적 태도)	4	40	39													
ASP2 (반사회적 행동)	1	49	47													
TPA	5	41	41													
TPA1 (조급함)	1	40	40													
TPA2 (경쟁 욕구)	2	42	41													
LSE	0	33	34													
LSE1 (자기 회의)	0	34	35													
LSE2 (순종성)	0	39	40													
SOD	3	35	35													
SOD1 (내향성)	2	36	36													
SOD2 (수줍음)	1	39	39													
FAM	3	39	39													
FAM1 (가정 불화)	3	46	46													
FAM2 (가족내 소외)	0	37	38													
TRT	2	34	35													
TRT1 (낮은 동기)	1	40	41													
TRT2 (낮은 자기개방)	0	36	37													

9. 결정적 문항 (Critical Items)

MMPI-2는 명백한 심리적 문제가 존재하는지를 나타내주는 많은 문항들을 포함하고 있습니다. 임상 장면에서 사용되도록 개발된 이러한 문항들이 '결정적 문항'이며, 이는 수검자에 대한 추가적인 정보를 제공합니다. 그러나 단일한 문항에 대한 수검자의 반응은 신뢰롭지 않을 수 있으므로 결정적 문항의 해석은 주의 깊게 이루어져야 하며, 검사 결과의 비밀유지도 매우 엄격하게 이루어져야 합니다. 특히 비임상 장면에서 결정적 문항을 해석할 때에는 더욱 많은 주의가 요구됩니다.

• 급성 불안(Acute Anxiety State) 결정적 문항

[그렇다]에 응답한 문항

039. 잠을 깊이 들지 못하고 설친다.

[아니다]에 응답한 문항

003. 아침에 일어나면 대개 상쾌하고 밤새 잘 쉬었다는 기분이 든다.

208. 심장이 두근거리거나 숨이 찰 때가 거의 없다.

• 우울 및 자살 사고(Depressed Suicidal Ideation) 결정적 문항

[그렇다]에 응답한 문항

215. 고민을 털어버리지 못하고 계속 집착한다.

[아니다]에 응답한 문항

388. 갑자기 우울해지는 적이 거의 없다.

• 위협적인 행동(Threatened Assault) 결정적 문항

[그렇다]에 응답한 문항

• 알코올 문제(Situational Stress Due to Alcoholism) 결정적 문항

[그렇다]에 응답한 문항

[아니다]에 응답한 문항

• 정신적 혼란(Mental Confusion) 결정적 문항

[그렇다]에 응답한 문항

031. 한가지 과제나 일에 정신을 집중하기가 어렵다.

• 편집적 사고(Persecutory Ideas) 결정적 문항

[그렇다]에 응답한 문항

124. 누군가 내게 잘해 줄 때는 뭔가 숨은 의도가 있을 것이라고 종종 생각한다.

[아니다]에 응답한 문항

9. 결정적 문항 (Critical Items)

MMPI-2는 명백한 심리적 문제가 존재하는지를 나타내주는 많은 문항들을 포함하고 있습니다. 임상 장면에서 사용되도록 개발된 이러한 문항들이 '결정적 문항'이며, 이는 수검자에 대한 추가적인 정보를 제공합니다. 그러나 단일한 문항에 대한 수검자의 반응은 신뢰롭지 않을 수 있으므로 결정적 문항의 해석은 주의 깊게 이루어져야 하며, 검사 결과의 비밀유지도 매우 엄격하게 이루어져야 합니다. 특히 비임상 장면에서 결정적 문항을 해석할 때에는 더욱 많은 주의가 요구됩니다.

• 반사회적 태도(Antisocial Attitude) 결정적 문항

[그렇다]에 응답한 문항

- 035. 어렸을 때 가끔 물건을 훔쳤다.
- 254. 사람들은 대개 자신에게 도움이 될 것 같으니까 친구를 사귈다.

[아니다]에 응답한 문항

• 가족 갈등(Family Conflict) 결정적 문항

[그렇다]에 응답한 문항

- 021. 이따금 집을 몹시 떠나고 싶다.

[아니다]에 응답한 문항

- 083. 집안 식구들과 거의 말다툼을 하지 않는다.

• 신체 증상(Somatic Symptoms) 결정적 문항

[그렇다]에 응답한 문항

[아니다]에 응답한 문항

- 033. 건강에 대해 거의 염려하지 않는다.

• 성적인 관심 및 편향(Sexual Concern and Deviation) 결정적 문항

[그렇다]에 응답한 문항

[아니다]에 응답한 문항

• 불안 및 긴장(Anxiety and Tension) 결정적 문항

[그렇다]에 응답한 문항

[아니다]에 응답한 문항

- 261. 내 친구들에 비해 나는 겁이 거의 없는 편이다.

• 수면 장애(Sleep Disturbance) 결정적 문항

[그렇다]에 응답한 문항

- 039. 잠을 깊이 들지 못하고 설친다.

[아니다]에 응답한 문항

• 기이한 사고 및 경험(Deviant Thinking and Experience) 결정적 문항

[그렇다]에 응답한 문항

[아니다]에 응답한 문항

9. 결정적 문항 (Critical Items)

MMPI-2는 명백한 심리적 문제가 존재하는지를 나타내주는 많은 문항들을 포함하고 있습니다. 임상 장면에서 사용되도록 개발된 이러한 문항들이 '결정적 문항'이며, 이는 수검자에 대한 추가적인 정보를 제공합니다. 그러나 단일한 문항에 대한 수검자의 반응은 신뢰롭지 않을 수 있으므로 결정적 문항의 해석은 주의 깊게 이루어져야 하며, 검사 결과의 비밀유지도 매우 엄격하게 이루어져야 합니다. 특히 비임상 장면에서 결정적 문항을 해석할 때에는 더욱 많은 주의가 요구됩니다.

• 우울 및 걱정(Depression and Worry) 결정적 문항

[그렇다]에 응답한 문항

[아니다]에 응답한 문항

003. 아침에 일어나면 대개 상쾌하고 밤새 잘 쉬었다는 기분이 든다.

• 기이한 신념(Deviant Beliefs) 결정적 문항

[그렇다]에 응답한 문항

[아니다]에 응답한 문항

106. 내 말투는 항상 같다 (더 빠르거나 느리지도 않고, 발음이 흐리거나 쉼 목소리가 나지도 않는다).

• 약물 남용(Substance Abuse) 결정적 문항

[그렇다]에 응답한 문항

[아니다]에 응답한 문항

429. 의사의 처방이 없는 한 약이나 수면제를 먹지 않는다.

• 분노(Problematic Anger) 결정적 문항

[그렇다]에 응답한 문항

