Pegel's classification



The models used in these situations described above are

Trend/ Seasonality	None	Additive	Multiplicative
None	$L_t = \alpha\, Y_t + (1\text{-}\alpha)\, L_{t-1}$	$L_t = \alpha(Y_t - S_{t-s}) + (1\text{-}\alpha)\, L_{t-1}$	$L_t = \alpha Y_t/S_{t-s} + (1\text{-}\alpha)\, L_{t-1}$
		$S_t = \Upsilon(Y_t - L_t) + (1 - \Upsilon)S_{t-s}$	$S_t = \Upsilon Y_t/L_t + (1 - \Upsilon)S_{t-s}$
	$F_{t+m} = L_t$	$F_{t+m} = L_t + S_{t+m-s}$	$F_{t+m} = L_t\, S_{t+m-s}$
Additive	$L_t = \alpha\, Y_t + (1\text{-}\alpha)(L_{t-1} + b_{t-1})$	$L_t = \alpha(Y_t - S_{t-s}) + (1\text{-}\alpha)(L_{t-1} + b_{t-1})$	$L_t = \alpha Y_t/S_{t-s} + (1\text{-}\alpha)(L_{t-1} + b_{t-1})$
	$b_t = \beta(L_t - L_{t-1}) + (1 - \beta)b_{t-1}$	$b_t = \beta(L_t - L_{t-1}) + (1 - \beta)b_{t-1}$	$b_t = \beta(L_t - L_{t-1}) + (1 - \beta)b_{t-1}$
		$S_t = \Upsilon(Y_t - L_t) + (1 - \Upsilon)S_{t-s}$	$S_t = \Upsilon Y_t/L_t + (1 - \Upsilon)S_{t-s}$
	$F_{t+m} = L_t + mb_t$	$F_{t+m} = L_t + mb_t + S_{t+m-s}$	$F_{t+m} = (L_t + mb_t)\, S_{t+m-s}$
Multiplicative	$L_t = \alpha\, Y_t + (1\text{-}\alpha)(L_{t-1}b_{t-1})$	$L_t = \alpha(Y_t - S_{t-s}) + (1\text{-}\alpha)L_{t-1}\, b_{t-1}$	$L_t = \alpha Y_t/S_{t-s} + (1\text{-}\alpha)\, L_{t-1}b_{t-1}$
	$b_t = \beta\, L_t/L_{t-1} + (1 - \beta)b_{t-1}$	$b_t = \beta L_t/L_{t-1} + (1 - \beta)b_{t-1}$	$b_t = \beta L_t/L_{t-1} + (1 - \beta)b_{t-1}$
		$S_t = \Upsilon(Y_t - L_t) + (1 - \Upsilon)S_{t-s}$	$S_t = \Upsilon Y_t/L_t + (1 - \Upsilon)S_{t-s}$
	$F_{t+m} = L_t\, b_t^m$	$F_{t+m} = L_t\, b_t^m + S_{t+m-s}$	$F_{t+m} = L_t\, b_t^m\, S_{t+m-s}$