Convolvulus roseatus (Brummitt) J.M.Tison

Liseron des haies balte — Convolvulaceae



DESCRIPTION MORPHOLOGIQUE

Arbre, terrestre, vivace, chaméphyte, qui peut atteindre jusqu'à 10





La tige aérienne est visible, dressée, prostrée à la base puis dressée, ramifiée, à section circulaire-pleine.

Sa surface est fortement pubescente au moins quand elle est jeune.

L'écorce est cannelée et brun-orangée.



Feuilles des rameaux stériles 2



Les feuilles sont disposées de façon alterne spiralée et elles sont simples.

Le limbe est lancéolé-linéaire, à marge foliaire pubescente et à nervation peltée et non visible en apparence.

Le pétiole est absent. Le feuillage est persistant.


Inflorescence



Fruits 4

Le fruit est un akène.

Les fleurs sont organisées en inflorescences. L'inflorescence est une grappe.



Fleur actinomorphe ; périanthe composé de 3 tépales ; androcée composé de 3 étamine(s) ; gynécée composé de 2 carpelle(s) ; ovaire supère. La couleur principale de la fleur est le jaune pâle.





PÉRIODE DE FLORAISON ET DE FRUCTIFICATION













RÉFÉRENCE(S):

AUTEUR(E-S) : arthur

DATE DE CRÉATION : 10/2022

CRÉDITS PHOTOS:

- 1 par Valérie Bruneau-Querey 2 par Valérie Bruneau-Querey 3 Hugues Tinguy 4 Jean-Claude-Echardour