
1. Первичный скрининг и отбор на обследование

Кого вообще смотреть. Скрининг — обследование людей без жалоб, по формальному признаку. Прежде чем кого-то лечить, кто-то решает, кого вообще посмотреть.

По порядку: **Шведский скрининг с моделью: кому достаётся второе чтение · Пример 1: чат-бот первой линии вместо звонка в практику · Пример 2: глазное дно снимают на приёме, а не у офтальмолога**



Первичный скрининг: что это за стадия



Четыре входа, ни один не следует из другого

- Известно скудно: возраст · пол · интервал
- Вопрос один: звать ли смотреть. Дальше — обследование либо ничего

Почему стадия первая. Непозванного не видит никто; порог назначен документом раньше замера точности.

Без модели порядка три: звать по возрасту · ждать жалобу · сортировать по тяжести. Классических режимов из них два.

Семь действий стадии скрининга — и три, на которых включается модель

Без модели

Назначить порог → Позвать по списку → Снять снимок → Прочесть двоим

…и дальше


Арбитраж → Сообщить исход → Отсортировать поток

Где включается модель

Прочесть двоим шведская программа

Сообщить исход глазное дно без офтальмолога

Отсортировать поток чат-бот первой линии



Target population

In England, breast screening is currently offered to women aged 50 up to their 71st birthday.

The AgeX research trial has been looking at the effectiveness of offering some women one extra screen between the ages of 47 and 49, and one between the ages of 71 and 73.

If you are visiting from overseas and are registered with a GP practice, you may be invited for NHS screening services. Screening is normally free, but if it leads to further tests or treatments not provided by the GP practice, you may be charged for that additional care.

Condition screened for

Breast cancer is a general term for cancer that begins in the breast. It is the most common type of cancer in the UK, where about 1 in 7 women are diagnosed with breast cancer during their lifetime. NHS.UK has more information on the:

- symptoms of breast cancer
- causes of breast cancer
- treatment for breast cancer

Семь действий стадии — и три шага, на которых включается модель

Письмо, с которого началась лекция, вышло отсюда: программа берёт список жителей, отбирает по возрасту и полу и рассылает приглашения. Человек не обращался — его позвали.

Порог, приглашение, съёмка и арбитраж остались людям. Новый шаг — добыть годный снимок.

У кого в рабочем контуре стоит автоматический фильтр — и кто разбирает отфильтрованное?

Программа скрининга NHS England, GOV.UK, снято 13 октября 2026

Шведский скрининг без модели: зовут по возрасту — и что из этого выходит

ЗОВУТ ПО ВОЗРАСТУ: НАШЛИ НА ОБСЛЕДОВАНИИ

5,1 случая на 1000

Швеция, 80 033 женщины: снимок читают двое людей, модели нет

ПРОПУСТИЛА ПРОГРАММА, НАШЁЛ СИМПТОМ

1,76 на 1000 за два года

итоговый анализ, контрольное плечо: 52 872 женщины, наблюдение два года

ПОЗВАЛИ ЗРЯ: ВЕРНУЛИ НА ВТОРОЙ СНИМОК

2,0 из ста обследованных

повторный снимок, иногда биопсия и недели с открытым вопросом

ЖДУТ ЖАЛОБУ → ЗОВУТ ПО СПИСКУ: ПОЗДНЯЯ СТАДИЯ У НАЙДЕННЫХ

57 → 39 из ста

Мальмё, 1976–1986: приглашение распределяли жребием; 91 из 159 случаев против 62 из 160

Зовут всех по возрасту и интервалу. Шведская программа шлёт приглашение, снимок читают двое людей, расхождение разбирает третий. Никакой модели в этом порядке нет.

Ждут жалобу — второй порядок, и он шире распространён. Нулём он не работает: тот, кого не позвали, однажды придёт сам — позже и стадией крупнее. Измерили его один раз, когда скрининг только вводили.


Порог — это документ: возраст приглашения и интервал назначены раньше, чем кто-нибудь измерил точность прибора.

Женщину с письмом позвал первый порядок: только возраст и интервал, ни одного её собственного признака.

• Два числа взяты с разных программ и разных эпох: это две стороны цены, а не одна шкала

Шведская программа скрининга, контрольное плечо, 2023 и 2026 · Мальмёское испытание, 1976–1986

Скрининговые программы по странам и участие ИИ



Модель встроена в архитектуру программы там, где классический охват ещё не отлажен — лёгкое (тёмный) и колоректальный (бирюзовый), а не шейка матки (синий). Простата вне диаграммы: организованная программа есть только в России (по регистру), но доля не раскрыта.

Обзор по странам · глава, подраздел «Скрининговые программы по странам и участие ИИ» · источники по России — в заметках лектора

Скрининг как практика: откуда он взялся

США, 1920-Е ГОДЫ

1 врач на ≈800 человек

поголовный осмотр населения физически невозможен

ПРИЗЫВ, ПЕРВАЯ МИРОВАЯ

47% из 2,7 млн

скрытые болезни у годных на вид к службе

ГЛАЗГО, 1957

715 тыс. за 5 недель

76% взрослых города, 37 передвижных рентген-установок

ВОЗ, 1968

10 критериев Уилсона–Юнгнера

когда скрининг вообще оправдан как практика

- Рост числа врачей, лабораторий и статистического учёта населения в XX веке впервые сделал осмотр **всех**, а не только обратившихся, технически возможным

- Призыв и труд первыми показали национальным масштабом: у здорового на вид человека массово находят скрытую болезнь
- К 1968 году ВОЗ формализовала, когда такой осмотр вообще оправдан как практика — критерии действуют до сих пор, без какой-либо модели внутри

Wilson–Jungner, WHO 1968 · *Reiser, Milbank Quarterly 1978* · *Глазго 1957, PLOS Medicine* · *research #278*

Шведский скрининг с моделью: кому достаётся второе чтение

ИЗ СТА ЖЕНЩИН, У КОТОРЫХ РАК БЫЛ: НАШЛИ НА ОБСЛЕДОВАНИИ

74 → 81

105 934 женщины, жребием на два плеча; различие устойчиво

НАШЛИ НА 1000 ОБСЛЕДОВАННЫХ

5,1 → 6,1

80 033 женщины — другая, меньшая выборка той же программы; значимости не достигла

ПОЗВАЛИ ЗРЯ: ВЕРНУЛИ НА ВТОРОЙ СНИМОК

2,0 → 2,2 из ста

те же 80 033 женщины

ВТОРОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЧТЕНИЯ МЕНЬШЕ

на 44,3 процента

те же 80 033 женщины

Без модели

Радиолог читает первым → Второй читает всегда → Расхождение → арбитраж

С моделью

Радиолог читает первым → **Модель: оценка риска 1–10** → Порог 10 → второе чтение

Та же программа, что на кадре перед этим — устройство второго чтения на схеме ниже. Женщин распределяли жребием. **Это механика отбора:** заключение выдаёт человек, модель отбирает, кого прочтут дважды.

Устроено: вход — маммограмма, выход — риск и очередь. **Имени нет**; режим — Transpara, Lunit INSIGHT MMG, iCAD ProFound. *Распознавание на изображении.*

Второго независимого человека большинство не получает — цена в устройстве процедуры, не в точности прибора.

Германия сохранила двойное чтение, добавила модель — 6,7 против 5,7 на 1000 у 463 094 женщин, без жребия. «Внедрили модель» — разные процедуры. **Арбитраж и доверие находке — кадром следом.**

Шведская программа, итоговый анализ · *PRAIM, Nature Medicine 2025*

Маммографический скрининг, продолжение: арбитраж и доверие находке модели

ДОЛЯ ЧТЕНИЙ НА АРБИТРАЖ

+142% / +22%

центр 1: 3,9→9,4%; центр 2: 11,3→13,8%; 50 000 женщин, 2 центра NHS

ОДИН АРБИТРАЖ ПО ВРЕМЕНИ

≈5 чтений

48 с чтение против 2 мин 12 с арбитраж; 441 276 случаев, Норвегия

PPV: ОДИН РАДИОЛОГ → ОДНА МОДЕЛЬ

3,4% → 22%

в разбор уходит 14,2% находок радиолога против 4,6% находок модели

ЗАМЕНА ЧТЕНИЙ МОДЕЛЬЮ (ГЕРМАНИЯ)

0%

гипотетических 56,7% без замены; профинансировал производитель (Vara)

Без модели

Два радиолога читают → Расхождение на отзыве → Арбитраж: третий читатель

С моделью

Радиолог и модель читают → Расхождений больше → Арбитраж: дольше, чаще

Британское испытание (2 центра NHS Англии) посчитало цену нового шага — устройство арбитража на схеме ниже. Один разбор расхождения по времени стоит заметно больше, чем первичное чтение.

Доверие находке разведено не в ту сторону. Находка радиолога уходит в разбор чаще находки модели — хотя модель точнее в разы. Другое измерение, не чувствительность с кадра перед этим.

Германия второго читателя не заменила вовсе — модель работала внутри прежнего двойного чтения; пересчёт без замены дало исследование, которое профинансировал производитель.

Обучение, обновление и дрейф — источники не раскрывают ни для одной из двух моделей.

Warren и соавт., Nature Cancer 2026 (арбитраж NHS) · *Dembrower и соавт., ScreenTrustCAD, Radiology 2025*

Пример 1: чат-бот первой линии вместо звонка в практику

ОБРАЩЕНИЙ НА ЧЕЛОВЕКА В ГОД: ДО СЕРВИСА → В СЕРВИСЕ

4,0 → 4,3

возраст 25–44; частоту обращений подсчитал независимый отчёт по 12 месяцам данных

ПЛАТЯТ ПРАКТИКЕ ЗА ЧЕЛОВЕКА В ГОД

155 фунтов

сумма от числа обращений не зависит

ДОПЛАТИЛ ЗАКАЗЧИК ЗА ОДИН ГОД, ФУНТОВ

10,5 млн

список около 49 тысяч человек; весь подушевой платёж за него — около 7,6 млн

ОЦЕНКА ПРИ СЛИЯНИИ → АКТИВЫ ПРИ БАНКРОТСТВЕ

4,2 млрд долларов → 500 тысяч фунтов

разные величины в двух валютах, не одна в двух точках

Без модели	Жалоба — звонок в практику	Решение — внутри практики	Запись: сегодня или позже
С моделью	Жалоба в приложении	**Модель решает маршрут**	«Куда вам сейчас»

Что за случай. Сервис первой линии в Англии — устройство на схеме ниже. Второй порядок — линия сортировки: **названа, без счёта**.

Цена обеих ошибок: пропустить срочное · занять приём зря · и цена канала.

Экзамен: 81 у приложения, 72 у врачей — обосновали выход в поток; качество сортировки не измерил никто.

Устроено. Babylon, **«GP at Hand»**: **обучать нечему — дерево «если — то»**, слова участника, не аудит. **Публикация — кадром следом.** *Поиск с генерацией на тексте.*

дало сортировку круглосуточно · **потребовало** минус на пациенте · **хуже**: банкротство 2023. **Итог:** сортировка словами с тех пор на месте

Тест 2017 · коллегия врачей 2018 · оценка сервиса 2019 · банкротство 2023

Пример 1, Babylon «GP at Hand»: граф вероятностей и правила для красных флагов

ВЫХОД РЕШЕНИЯ — ОДИН ИЗ

6 вариантов

скорая · неотложная помощь · срочный визит к врачу · визит без срочности · аптека · самопомощь



Красный флаг обходит граф целиком; нейросеть внутри графа только считает быстрее

Чат-бот триажа первой линии Babylon («GP at Hand»): что опубликовала сама компания. Публикация 2016 года — разряд выше слов участника, но не аудит: граф строят врачи-эксперты, поверх — правила для красных флагов (устройство на схеме ниже).

Системного дизайна обученной модели, принимающей решение, не было вовсе — нейросеть лишь считает быстрее по графу.

Контур обратной связи назван пробелом. Кто и как часто переписывает правила после ошибки, источники не называют.

Middleton, Butt, Hammerla, Hamblin, Mehta, Parsa — arXiv:1606.02041, 2016 (техническая публикация компании)

Пример 2: целевой скрининг осложнения у диабетиков, не у офтальмолога

ДОШЛИ ДО ТЕСТА: НАПРАВЛЕНИЕ К СПЕЦИАЛИСТУ → СЪЁМКА НА ПРИЁМЕ


22 → 100 из ста

81 человек против 83, приглашение распределяли жребием

ДОШЛИ ДО ОФТАЛЬМОЛОГА ПОСЛЕ ОТКЛОНЕНИЯ

22 → 64 из ста

из 25 человек с отклонением дошли 16 — второй шаг того же пути



Одним снимала медсестра на приёме, остальных отправляли к офтальмологу

Что за случай. Подростки 8–21 года с уже поставленным диабетом: раз в год — целевой скрининг осложнения (ретинопатии), не скрининг диабета у здоровых; сами авторы называют протокол screening. **Выигрыш измерен явкой, а не точностью чтения, — поэтому это отбор.**

Цена обеих ошибок: пропустить — бессимптомно до потери зрения · позвать зря — визит к специалисту, которого в районе может не быть · и теряют на неявке.

Устроено: вход — два снимка глазного дна, выход — один из трёх исходов: направить к офтальмологу; отрицательный результат с повтором через 12 месяцев; снимок недостаточного качества — отдельный отказ судить, не находка и не её отсутствие. **Прибор испытания не назван**; режим допущен первым в 2018-м — IDx-DR, ныне LumineticsCore. *Классификация на изображении.*

Что это стоило — на кадре следом.

Wolf и соавторы, Nature Communications 2024 — рандомизированное испытание явки · *Решение регулятора США DEN180001, 2018*

Пример 2, цена: отказной поток и новый шаг

НЕГОДНЫ ПО КАЧЕСТВУ

5 снимков из ста

зрелый поток: 101 710 визитов в 404 клиниках, прибор другого производителя, взрослые

ПОТОК, КОТОРОГО СПЕЦИАЛИСТ НЕ ВИДИТ ВОВСЕ

75,7 из ста

тот же зрелый поток; прежде нормальное к нему приходило и он мог его проверить

Съёмка на приёме дала явку. Теперь — чего это стоило и кому.

Сменился исполнитель. Решение «направить или нет» перешло от офтальмолога к допущенному регулятором устройству целиком, и вместе с решением переехала ответственность за пропуск. Единственный случай лекции, где исполнитель сменился по документу.

Появился шаг, которого не было: добыть годный снимок. У офтальмолога такой операции не существовало — условия съёмки он поправлял сам, на месте.

Оба числа — с другой программы и другого прибора, на взрослых. С явкой 22 против ста в одну бухгалтерию они не складываются.

дало доступ на месте, без визита · **потребовало** новый шаг и поток, которого никто не смотрит · **по этой паре**: доступ ценой отказного потока. **Чему обучена сама система и что показало отдельное измерение на новой выборке — кадром следом.**

Ретроспективный поток автономного чтения, прибор EyeArt — 101 710 визитов, 404 клиники · решение регулятора США DEN180001, 2018

Пример 2, глазное дно (IDx-DR): обучение, обновление и другая популяция

НЕПРИГОДНЫХ СНИМКОВ (ГЕРМАНСКИЙ СТАЦИОНАР)

26,1 из ста

875 пациентов, 2026, тот же прибор — другая популяция, не целевое первичное звено США

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ: ТЯЖЁЛАЯ → УМЕРЕННАЯ ФОРМА

94,4% → 60,9%

тот же прибор, что дал пивотальные 87,2/90,7%; падает с тяжестью болезни, не с возрастом прибора

НЕПРИГОДНЫХ СНИМКОВ: ДЕНЬ 1 → ДЕНЬ 4 ПРАКТИКИ

46,9% → 0%

один и тот же оператор, та же германская выборка — эффект обучения, не изменение алгоритма

До допуска

Выборка — кадром раньше → **Обучение модели** → Допуск FDA, 2018

После допуска

Другая популяция и оператор → Чувствительность и брак меняются → Обновление протокола

Диабетическая ретинопатия, IDx-DR — продолжение разбора глазного дна. Германская выборка — другая популяция, не дрейф во времени; путь к допуску и после — на схеме.

Чувствительность и брак снимков — два разных эффекта, не один: тяжесть болезни против навыка держать камеру.

Scientific Reports / PMC12864748, германское исследование IDx-DR, 2026 · *FDA 510(k) K213037, accessdata.fda.gov*

Вывод раздела: выигрыш в доступе, точности модель не прибавила

Получается: дотянуться до тех, кто иначе не придёт — **22 → 100 из ста** · снять объём чтения там, где процедура плотная — **второго чтения на 44,3 процента меньше**.

Не получается: назначить порог — за ним подпись · открытый поток — единственная состоявшаяся попытка кончилась банкротством · отвечать за годность снимка.

С работой: нагрузка переехала с сортировки на приём, и платить за неё стало некому · сменился исполнитель, производной формой появился шаг — добыть годный снимок.

Держат это порог-документ и двойное чтение с арбитражем там, где второго читателя не сняли.
Отсеянное фильтром не проверяет ни одна процедура.

В скрининге человек прочёл каждое исследование. Где решала модель — её «норма» до него не дошла.