

痛みの地図 早見表

理学療法士 藤井翔悟
筋膜リリースで痛みをサヨナラ

痛い場所は、**結果が出ている場所**であって、原因の場所とはかぎりません。体は一枚の膜（筋膜）で足の裏から頭までつながっていて、どこかが動きにくくなると、離れた場所が引っばられて痛みが出ることがあります。この表は「まずどこから見るか」の順番をまとめたものです。**痛いところから揉まない**、それだけでも変わることがあります。

腰 かがむと痛い／朝がつらい／マッサージしても戻る	こんな訴え 前かがみで腰が突っばる。朝起きたときがいちばんつらい。揉んでもらった直後は軽いのに翌朝には戻っている。	まず見る場所 足の裏 → ふくらはぎ → もも裏 体の後ろを縦に通る一本のつながり。腰はその途中で引っばられている側があります。お腹の奥（股関節の前）も関係します。	ゆるめる順番 1 足の裏をテニスボールで30秒（左右） 2 もも裏を座ったまま30秒ずつさする 3 股関節の前を立て膝で20秒のばす 4 最後に腰まわり。ここは最後でいい
---	---	---	--

3つの原則（どの症状でも共通）

- **痛いところから触らない**。上流（離れた場所）から順に。痛い場所は最後でいい。
- **痛みが出るまで伸ばさない**。「痛気持ちいい」の一步手前で止める。強く押すほど効くわけではありません。
- **やる前とやった後で、同じ動きを試す**。前屈でも、腕を上げるでもいい。変わったかどうか、つながっているかどうかの答えです。

この表を使わず、受診してほしいサイン

- ▲ 足に力が入らない、つまづく
- ▲ しびれる範囲が広がってきた
- ▲ 排尿・排便がいつもと違う
- ▲ 安静にしているでも痛い
- ▲ 夜、痛みで目が覚める
- ▲ 発熱、原因のない体重減少
- ▲ がんの既往がある
- ▲ 転倒・事故のあとから痛む

ひとつでも当てはまるときは、セルフケアより先に医療機関へ。

