

Galantamine (Razadyne®)

Información educacional de medicamento para la demencia



¿Para que se usa este medicamento?	<ul style="list-style-type: none">• Tratamiento para las etapas de leve a moderada de la enfermedad de Alzheimer.		
Dosis normal:	<p>Tableta o líquido, liberación inmediata:</p> <ul style="list-style-type: none">• Comience con 4 mg dos veces al día.• Puede aumentar la dosis en intervalos de 4 semanas si no hay efectos secundarios significativos. 4 mg → 8 mg → 12 mg, dos veces al día (4 semanas = →) <p>Cápsula, liberación prolongada:</p> <ul style="list-style-type: none">• Comience con 8 mg al día.• Puede aumentar la dosis en intervalos de 4 semanas si no hay efectos secundarios significativos. 8 mg → 16 mg → 24 mg, una vez al día (4 - semanas = →)• Si su medicamento se suspende por 3 o más días, reinicie con la dosis más baja y aumente la dosis cada 4 semanas hasta la dosis actual.		
Formulaciones Disponibles y Costo Estimado:	<p>1. Tableta, liberación inmediata (de marca y genéricas): <u>Potencia:</u> 4 mg, 8 mg, 12 mg <u>Costo (cantidad para 30 días):</u> Genérico \$190; Marca \$320</p> <p>2. Cápsula de liberación prolongada (de marca y genéricos): <u>Potencia:</u> 8 mg, 16 mg, 24 mg <u>Costo (cantidad para 30 días):</u> Genérico \$190; Marca \$320</p> <p>3. Líquida, de liberación inmediata (marca y genéricos): <u>Potencia:</u> 4 mg / ml <u>Costo (cantidad para 30 días):</u> Genérico \$290; Marca \$350</p>		
Contraindicaciones y Precauciones para este medicamento:	<ul style="list-style-type: none">• Hipersensibilidad a galantamine. Puede incluir: hinchazón, erupción externa, irritación		
Efectos Secundarios Comunes:	Mareos Dolor de cabeza Malestar estomacal	Vómitos Diarrea Pérdida de peso	Temblores Latido cardíaco lento

Manejo de este medicamento:

1. Tome este medicamento a la misma hora todos los días.
2. Tomarlo con alimentos puede minimizar los efectos secundarios.
3. **Informe a su médico DE INMEDIATO si experimenta:** mareos muy fuertes, ritmo cardíaco lento, defecación negra o con sangre, vomitando sangre o vómito que parece café molido, convulsiones, fuerte malestar estomacal, una pérdida de peso grande, temblores, diarrea u otros efectos secundarios.



Referencias:

1. Lexicomp – galantamine, Razadyne®
2. Red Book Average Wholesale Price of Drugs 2013
3. Kirby Lee, PharmD, MA, MAS and Ron Finley, RPh, UCSF Memory and Aging Center