

# Donepezil (Aricept®)



## Folleto de Educación sobre Droga para Demencia

<b>¿Para qué se usa este medicamento?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esta medicina es tratamiento para las diferentes etapas de la demencia.</li> </ul>		
<b>Dosis normal:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comience con 2.5 mg - 5 mg al día durante 4 - 6 semanas</li> <li>Puede aumentar lentamente la dosis si no hay efectos secundarios significativos.</li> <li>La dosis máxima diaria es de 23 mg. Sin embargo, los efectos secundarios pueden limitar la dosis de 23 mg.</li> </ul>		
<b>Formulaciones y Costo Estimado:</b>	<p><b>1. Tabletas (de marca y genéricas):</b>  <u>Potencia:</u> 5 mg, 10 mg, 23 mg (liberación sostenida, no machacar o cortar, no hay genéricas disponible)  <u>Costo (cantidad para 30 días):</u> Genérica \$260 \$ - \$340; Marca \$410 - \$460</p> <p><b>2. Tableta, se desintegra por vía oral (de marca y genérica):</b>  <u>Potencia:</u> 5 mg, 10 mg  <u>Costo (cantidad para 30 días):</u> Genérica \$235; Marca \$460</p>		
<b>Precauciones para este medicamento:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hipersensibilidad a donepezil: Puede incluir: hinchazón, erupción cutánea, urticaria.</li> <li>Disfunción cardíaca: bloqueo cardíaco o trastornos de la conducción cardíaca, ritmo cardíaco lento.</li> </ul>		
<b>Efectos Secundarios Comunes:</b>	<p><u>Efectos Secundarios Más Comunes</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Náuseas</li> <li>Vómitos</li> <li>Diarrea</li> <li>Pérdida de Appetito</li> <li>Mareos</li> <li>Dolor de Cabeza</li> <li>Pérdida de Peso</li> </ul>	<p><u>Menos Comunes</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Moretones</li> <li>Ritmo cardiaco bajo</li> <li>Insomnio</li> <li>Desmayos</li> <li>Deseos frecuentes de orinar</li> </ul>	<p><u>Efectos Secundarios Raros</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Empeoramiento del asma</li> <li>Convulsiones</li> <li>Calambres musculares</li> </ul>



<b>Manejando de este medicamento</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se puede tomar con o sin alimentos.</li> <li>2. Informe a su médico si experimenta: náuseas, vómitos, diarrea, sueños vívidos o pesadillas, u otros efectos secundarios</li> <li>3. <b>Informe a su médico DE INMEDIATO si experimenta:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desmayos</li> <li>• Acidez o dolor de estómago que es nuevo o no se quita</li> <li>• Náuseas o vómitos, sangre en el vómito, vómito oscuro que parece como café molido</li> <li>• Defecación de color negro y consistencia irregular</li> <li>• Ataque nuevos o empeorados de asma o problemas respiratorios</li> <li>• Convulsiones</li> <li>• Dificultad para orinar</li> </ul> </li> </ol>
--------------------------------------	--



#### Referencias:

1. Lexicomp – donepezil, Aricept®
2. Red Book Average Wholesale Price of Drugs 2013  
Libro Rojo de Precio Promedio al Por Mayor de Drogas 2013
3. Kirby Lee, PharmD, MA, MAS and Ron Finley, RPh, UCSF Memory and Aging Center  
Kirby Lee, Dr.Farm, MA, MAS y Ron Finley, RPh, UCSF Centro de Memoria y Envejecimiento