

szendo véletlenszámok generálása: általános módszerrel, kongruenciális generátorok, tulajdonságai.

Neumann → middle square: $675248 \xrightarrow{1^2} 455959861504 \rightarrow 959861$

Wichmann-Hill: $x_{n+1} \equiv 171x_n \pmod{30269}$

- 2 byte-ban elfér

$y_{n+1} \equiv 172y_n \pmod{30307}$

- x_n, y_n, z_n óra alapján random

$z_{n+1} \equiv 170z_n \pmod{30323}$

$r = \left(\frac{x_{n+1}}{30269} + \frac{y_{n+1}}{30307} + \frac{z_{n+1}}{30323} \right) \pmod{1}$

Linedris kongruenciális generátor:

$x_{n+1} \equiv (ax_n + c) \pmod{m}$

$c=0 \rightarrow$ multiplikatív

$c \neq 0 \rightarrow$ kevert

3 paraméterező típus:

① m prím, $c=0$

- max periódusa: $m-1$ (pl. $2^{31}-1$)

- x_0 : 1 és $m-1$ között;
- fassan számítható

② $m = 2^k$, $c=0$

- max periódusa: $\frac{m}{4}$ $a \equiv (3 \text{ vagy } 5) \pmod{8}$ esetén

- x_0 páratlan

- gyors, de az utolsó 3 bitre érzékeny (elacsony bites periódusa rövidebb)

③ $c \neq 0$

- max periódusa: m , ha

- m és c relatív prímek ($\text{lcm}(c) = 1$)

- m minden prímtegyezője osztója $(a-1)$ -nek

- ha $4|m$, akkor $4|a-1$

Randu (IBM)

$x_{n+1} \equiv 65539x_n \pmod{2^{31}} \rightarrow$ spektrál próbaival lúthatók a hipersíkai

életlenszámok transzformációja, inverzfüggvény módszer, elfogadás és elvetés módszere.
gyakran alkalmazásuk. Monte Carlo módszerek. Hibaanalízis.

Transzformációk:

o Centrális határelosztás tételevel \rightarrow std. norm bármiből

ξ_1, \dots, ξ_n független, azonos eloszlású valószínűségi változók

Ha $S_n = \xi_1 + \dots + \xi_n$, akkor (S_n std. normalizálás után viselkedik)

$$\frac{S_n - E(S_n)}{D(S_n)} \sim \text{Norm}(0, 1)$$

Ox-Müller \rightarrow 2 eggyentekesből $(\xi_1, \xi_2) \rightarrow$ 2^{std.} normalizat (η_1, η_2)

$$\eta_1 = \sqrt{2 \ln \xi_1} \cdot \cos(2\pi \xi_2)$$

$$\eta_2 = \sqrt{2 \ln \xi_1} \cdot \sin(2\pi \xi_2)$$

Inverz függvény módszer:

η tetszőleges eloszlású v.v. $F_\eta(x)$ eloszlásfüggvényel és $\exists F_\eta^{-1}(x)$ (van inverze)

Elkhor: $F_\eta(\eta) \sim U[0, 1]$

$$F_\eta^{-1}(U) \sim \eta$$

fogadás és elvetés módszerei: (megfelel-e $f(x)$ eloszlásnak)

-veszünk egy v_1 véletlenszámot $f(x)$ értelmezési tartományából $v_1 \sim U[a, b]$

-veszünk egy v_2 véletlen számot $v_2 \sim U[0, c]$

-ha $v_2 < f(v_1)$ $\rightarrow v_1$ -et elfogadjuk, f sürűségfüggvényű

Monte-Carlo módszerek:

-matematikai feladatok megoldásához véletlen mennyiségek modelllezését felhasználó numerikus módszerek

Hibaanalízis: nagy számú törvényre szerint (Csobisev-egyenlöttség)

Exponenciális eloszlás és generalása. Gamma eloszlás, Poisson-folyamat.

Exponenciális eloszlás:

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & \text{ha } x \geq 0 \\ 0, & \text{másik esetben} \end{cases}$$

$$E(X) = \frac{1}{\lambda}$$

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & \text{ha } x \geq 0 \\ 0, & \text{másik esetben} \end{cases}$$

$$D^2(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

Generalás: inverz fv. módszerrel

$$F^{-1} = -\frac{1}{\lambda} \ln(1-y)$$

u

Gamma eloszlás: λ paraméterű, λ -adrendű gamma- ∞ :

$$f(x) = \frac{1}{\Gamma(\lambda)} x^{\lambda-1} \lambda^x e^{-\lambda x} \quad E(X) = \frac{\lambda}{\lambda}$$

$$\Gamma(\lambda) = \int_0^\infty x^{\lambda-1} \cdot e^{-x} dx \quad D^2(X) = \frac{\lambda}{\lambda^2}$$

Generalás: exponenciálisak összege Γ

$$\sum_i -\frac{1}{\lambda} \ln(1-x_i)$$

u

- két Γ összege is Γ

Poisson-folyamat: események számát és időhazeit modellezik (pl. biztosítás → hárak)

- a behövethető események függetlenek egymástól

- a behövethető események száma csak az időintervallum hosszától függ

- egy időpillanatban legfeljebb egyszer következik be

$$P(\text{pontosan } k \text{ db behövethető hosszú intervalluman}) = \frac{(\lambda h)^k}{k!} \cdot e^{-\lambda h}$$

◦ Várható idő a következő eseményre exp. előt követ

◦ bármely időhözben az előfordulás egyenletes elő-ú

◦ behövethető események száma poisson elő-ú. λt paraméterrel

Optimalizálás és modellillesztés. Regresszió, faktoranalízis.

Regresszió számítás célja: két vagy több véletlen változó között fennálló kapcsolatot modellezzük.

Modellillesztés: azt a modellt keressük, amire a hiba minimális $\sum (y_i - \hat{y}_i)^2 \rightarrow \min$

Lineáris regresszió: két változó közti kapcsolat magyarázata (y -függő, x -magyarázó változó)

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_m x_m + \varepsilon \quad (\text{hibantag})$$

Kétváltozós eset:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1$$

\uparrow Lengyelmetszor $\underbrace{}$ mérédekléség

Cél: β_0, β_1 becslése pl. leghisebb négyzetek módszerével

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum x_i \cdot y_i - m \bar{x} \cdot \bar{y}}{\sum x_i^2 - m (\bar{x})^2}$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \cdot \bar{x}$$

Nemlin. regr: ha a modell nem lineáris pl. exp, log

pl. $y = a e^{bx}$

↓ linearizálás

$$\ln y = \ln(a e^{bx}) = \underbrace{\ln a}_{\beta_0} + \underbrace{bx}_{\beta_1 x} \quad \text{linearizált problémát oldjuh meg}$$

Faktoranalízis: többváltozós statisztikai módszer, célja: a változók számnak redukálása

$$\vec{z}_1, \dots, \vec{z}_N$$

$$f_1, \dots, f_n$$

$$\eta = a + \sum_{i=1}^n c_i f_i$$

alkalmazás: - intelligencia mintáján
- mi befolyásolja egy részvénny árat?

$$\text{Normális (Gauss) eloszlás, Gauss-papír}$$

$$f(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

- generáldás:
- CHT
 - Box-Müller
 - inverz fv.

$$\left. \begin{array}{l} E(x) = \mu \\ D^2(x) = \sigma^2 \end{array} \right\} \text{ha } \begin{array}{l} \mu=0 \\ \sigma^2=1 \end{array} \rightarrow \text{std. norm}$$

Többdimenziós eset: legyen $m \in \mathbb{R}^n$, A $n \times n$ -es mátrix és $z \sim N(0, I)$. Ekkor $\eta = Az + m$ -et n -dimenziós normális eloszlásúnak nevezzük.

- tul.:
- η elemeinek lineáris kombinációi is norm. eloszlásúak
 - η bármely részhalmaza is normális eloszlású
 - ha $\text{cov} = 0$ \rightarrow az összetevők függetlenek

Kovariancia: megadja két ögymodstól különböző változó ögyütlmozgását


Pt. 2 ~~$X = (X_1, X_2)$~~ Két dim. normális

$$\text{cov}(X, Y) = E((X - E(X))(Y - E(Y)))$$

többdim. eset \rightarrow kovariancia-mátrix $\text{cov}(\eta_i, \eta_j) = c_{ij}$

ebből kipezünk mátrixat
(szimmetrikus, pozitív szemidefinít lesz)

Gauss-papír: normális Q-Q plot (normalitás tesztelése adataink normális eloszlásra követne-e?)



- ha közel egy egyenesre esnek a pontok, akkor a minta normális eloszlásra származik

Paraméterbelejtés: loglikelihooddal

Weibull - el.

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\left(\frac{x-c}{b}\right)^a}, & \text{ha } x \geq 0 \\ 0, & \text{hülben} \end{cases}$$

c - eltolás
 b - shála
 a - alak

Spec. esetek:

$c=0$ ~~(a=1)~~ $b=1$ standard Weibull

$c=0$ $a=1$ $b=1/\lambda$ $\text{Exp}(\lambda)$

$c=0$ $a=2$ $b=\lambda$ Rayleigh

$c=0$ $a=3,7$ $b=1$ normálishez hasonló, szimmetrikus


Alkalmazás: tülelést-analízis

hibaanalízis

megbízhatóság -számítás

Weibull - papír: Q-Q plot-hoz hasonlít, az eloszlásfv. értékeit ábrázoljuk rajta
→ ha egy egyenesre esnek, amint a Weibull-el. n

az egyenes meredeksége az alakparaméter



hasznossági függvények

cél: egy x érték hasznosságának számszerűsítésére szolgál.

alkalmazás: fogyasztáselmélet, portfólió-elmélet

n-változós alakja: $U(x_1, \dots, x_n)$

$x, y \in \mathbb{R}$ ~~positív~~ ~~negatív~~

$x \leq y \Leftrightarrow U(x) \leq U(y)$ (magyarul nagyobb hasznossághoz nagyobb értéket rendel)

↑ gyengén preferált

(preferenciarendezés: -transzitív
-reflexív
-teljes
-folytonos)

jel: \sim 2-szer deriválható

-monoton

-hankúr

Spec. esetek:

1) lineáris: $(x_1, \dots, x_n) \rightarrow \sum a_i x_i$

2) $\sum x_i^{a_i}$

3) $\prod x_i^{a_i}$ (\sim geom közép)

4) Exp: $U(x) = 1 - e^{-bx}$

5) Log: $U(x) = \ln x$

6) Hálvány: $U(x) = x^b$

7) Kvadratikus: $U(x) = x - bx^2$

maximum likelihoođ, opt. modell, hely-skála-alakparaméter. Előszöris típus.

Legyen x_1, \dots, x_m független minta $f(x_i, \theta)$ sűrűségfv-el (azonos elasztípus).

θ : tartalmazza az elasztás paramétereit, tehát ezt heressük

minta együttes sűrűségfv-e:

$$L(x_1, \dots, x_n, \theta) = \prod f(x_i, \theta) \text{ Likelihood fv.}$$

$$\hat{\theta} = \max \{ L(x_1, \dots, x_n; \theta) \} \quad (\hat{\theta} = ? \text{ ez a becsült})$$

könnyebb számíthatóság miatt vesszük a logaritmusát:

$$\ln L(x_1, \dots, x_n; \theta) = \ln(\prod f(x_i, \theta)) = \sum \ln f(x_i, \theta) \text{ Log-likelihood fv.}$$

$$\hat{\theta} = \max \{ \ln L(x_1, \dots, x_n; \theta) \} \quad (\hat{\theta} = ?)$$

Iz optimalizálá eljárások minimumkeresésre vannak \rightarrow a log likelihood fv. (-1)-szerezet vesszük:

$$-\ln L(x_1, \dots, x_n, \theta) = -\sum \ln f(x_i, \theta)$$

$$\hat{\theta} = \min \{ -\ln L(x_1, \dots, x_n; \theta) \}$$

opt. modellek:

- Nelineáris minimalizálás (R-ben NLM, Newton-féle algoritmust használ)
- Általános céhi optimalizálás (OPTIM)

Elasztás típusai:

$$F(x) = G\left(\frac{x-b}{a}\right) \quad \exists a > 0, b \in \mathbb{R}, \text{ akkor } F \text{ és } G \text{ azonos típusú}$$

Cauchy, norm \rightarrow típus

nem típus: exp - nincs elfogás paramétere

$t \quad \} \text{ alakparaméterenként 1-1 típus} \Rightarrow \text{véglegén típus}$
 $w \quad \}$

Biztosítási modellek, véletlen tagszámú összeg, Poisson összetétel

$$S = x_1 + \dots + x_n \quad \text{egyedi hozzájárulás}$$

$$\eta = \sum_{i=1}^N \xi_i \quad \text{kollektív hozzájárulás}$$

$$E(\eta) = E(N) \cdot E(\xi_i)$$

$$D^2(\eta) = E(N) \cdot D^2(\xi_i) + E^2(\xi_i) \cdot D^2(N)$$

ξ_i	N
hártnagyság	küszőszám
lognorm	geom
gamma	Poisson
exp-ell keveréke	negatív bin
pareto	bin.

Biztosítási pénze:

$$U(t) = U + c \cdot t - S(t)$$

\nearrow kezdeti \uparrow \nwarrow $\eta(t)$ hár hifizetés
tőke biztosítási díj

Véletlen tagszámú összeg

N valószínű változó (tagszám)

ξ_1, \dots, ξ_N független, azonos eo-ú v.vál. (tagok)

$S = \sum \xi_i$ a véletlen tagszámú összeg, egy összetett eo.

Ha a tagszám Poisson-eloszlást követ, akkor az összeg összetett Poisson eo. lesz.

$$E(S) = E(N) \cdot E(\xi) \rightarrow E(\xi_1) = E(\xi_2) \dots \text{mert azonos eo!}$$

$$D^2(S) = E(N) \cdot D^2(\xi) + E^2(\xi) \cdot D^2(N)$$

Ha $N \sim \text{Poisson}$, akkor $E(N) = \lambda$ és $D^2(N) = \lambda$

Karakterisztikus fv.:

$$\Phi_\eta(t) = g_N(\Phi_\xi(t))$$

↓
N generátor fv-e

Díjvállalációs elvek, kárszám, kárnagyság

Elvek:

- 1) $\Pi(\xi) \geq E(\xi)$ nemnegatív terhelés ($dij > várható kár$)
- 2) $\xi \leq m \Rightarrow \Pi(\xi) \leq m$ maximális veszteség (ne hárjunk nagyobb összeget, mint a maximális kár)
- 3) $\xi_1 \leq \xi_2 \Rightarrow \Pi(\xi_1) \leq \Pi(\xi_2)$ monotonitás (hisebb értelemben többet károlt a várható kár is)
- 4) $\Pi(\xi_1 + \xi_2) \leq \Pi(\xi_1) + \Pi(\xi_2)$ szubadditivitás (hét külön biztosítás drágább, mint egy kombinált)

Modellek:

1) Várható értelek

$$\Pi(\xi) = (1+\alpha)E(\xi)$$

2) Szórás

$$\Pi(\xi) = E(\xi) \cdot \alpha \cdot D(\xi)$$

3) Szórásnégyzet

$$\Pi(\xi) = E(\xi) + \alpha \cdot D^2(\xi)$$

4) Exp

$$\Pi(\xi) = \frac{1}{\alpha} \cdot \ln E(e^{\alpha\xi})$$

5) Esscher

$$\Pi(\xi) = E\left(\xi \cdot \frac{e^{\alpha\xi}}{E(e^{\alpha\xi})}\right)$$

6) Kvantilis elv

$$\Pi(\xi) = \min \{m \mid P(\xi \geq m) \leq \alpha\}$$

Alkalmazott elv-h:

Kárszám (N)

$$\text{Binomialis } P(\xi=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

$$\text{Negatív bin. } P(\xi=k) = \binom{k+r-1}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^r$$

$$\text{Poisson } P(\xi=k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

$$\text{Geom. } P(\xi=k) = pq^{k-1}$$

Kárnagyságok (ξ_i)

$$\text{Exp: } f(x) = \lambda x^{-\lambda x}$$

$$\text{Exp. haveréke: } f(x) = \sum p_i \cdot \lambda_i x^{-\lambda_i x}$$

Pareto

Lognorm

leírtam modellek

T - elírtam (születéskor)

$$F(t) = P(T \leq t) \quad \text{es. f.v.}$$

$$t^q_0 = F(t)$$

$$\bar{F}(t) = P(T > t) \quad \text{(ülelés f.v. ~t után megeljük)}$$

$$t^p_0 = \bar{F}(t)$$

bételes valósgá

$$P(T \leq x+t | T > x) = t^q_x \quad \text{~t éven belül meghalunk-e, ha x-ig éltünk}$$

$$P(T > x+t | T > x) = t^p_x \quad \text{~valószínűsége, hogy megéljük x+t utat, ha x után elérjük}$$

halászati intenzitás

$$\mu(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0+0} \frac{1}{\Delta t} \cdot P(T < t + \Delta t | T > t) = -\frac{d}{dt} (\ln \bar{F}(t))$$

$$\bar{F}(t) = e^{-\int_0^t \mu(s) ds}$$

$$t^p_x = e^{-\int_0^t \mu(x+s) ds}$$

halandósági modellek:

$$\text{Exp.: } \mu(t) = \lambda, \quad \bar{F}(t) = e^{-\lambda t}$$

$$\text{Weibull: } \mu(t) = \beta \omega^{-\beta} t^{\beta-1}$$

$$\bar{F}(t) = e^{-(\frac{t}{\omega})^\beta}$$

Gompertz-Makeham:

$$\mu(t) = \alpha + \beta e^{\gamma t}$$

$$\bar{F}(t) = e^{-\alpha t - \beta \cdot \frac{e^{\gamma t} - 1}{\gamma}}$$

aláírású táblák

Díjhalkulációhoz → néphalandósági (teljes lehetségek)
→ szellemiségi (foglalkozás/tárhely/népcsoport stb. alapján)

Jelölések

l_0 a populáció nagysága

l_x az x kort tüleltők száma

d_x az x korban elhaladtak száma

e_x az adott korban várható élettartam

$t p_x$ t évig életben maradunk-e még, ha x kort megéltek?

$t q_x$ meghalunk-e t éven belül, ha x -et már megéltek?

x	l_x	d_x	q_x	e_x
0				
1				
2				
...				
119				

$$t p_x = \frac{l_{x+t}}{l_x}$$

$$t q_x = \frac{l_x - l_{x+t}}{l_x}$$

$$e_x = \int_0^{w-x} t p_x dt = \frac{l_{x+1} + l_{x+2} + \dots}{l_x}$$

Paraméterbecslés:

halandósági modell paramétereit becsülhetők loglikelihooddal (Exp, Weibull, Gompertz)

Jarhowitz portfólió elmélet

R_1, \dots, R_n valószínűségi változók, $r_i = E(R_i)$ várható hozamok. Cél: olyan kombinációt találni a befektetési lehetőségek között, hogy hozárat $\rightarrow \min$ és hozam $\rightarrow \max$

Feltevések: - magasabb hozamút választjuk ha' ugyandán hozáratú befektetésnél
- a hozamok pontos adatok
- a befektetések logikusan cselekednek

Portfólió várható hozama: $E(R) = \sum x_i r_i$

Hozárat: $D^2(R) = \sum \sum x_i c_{ij} x_j$

$$c_{ij} = \text{cov}(R_i, R_j)$$


befektetési súlyok ~ melyik részvénybe mekkora

részét fektetjük az egységes pénzükhöz

$$\sum x_i = 1, x_i \geq 0, \sum r_i x_i = \bar{r}$$
 (elvárt hozam)

2 feladat - kitüöött hozamhoz súlyokat keresni

- adott hozárathoz megkeresni a legjobb hozamot



Arbitrázs tétele

Arbitrázs - lehetőségeknek nevezük azokat a valamelyen piaci félreárazásból adódó lehetőségeket, amelyek a hozájárásmentes hozamhoz képest azonnal és hozájárásmentesen nyújtanak magasabb hozamot.

Primál feladat: $Ax = b$, $\min\{c^T b\}$

Dual: $y^T A \leq c$, $\max\{y^T b\}$

Tétel: x optimális a primál feladatban, akkor y is optimális a dualban és $\min\{c^T b\} = \max\{y^T b\}$

Tétel: pontosan 1 igaz:

1) $\exists y^T = (y_1, \dots, y_m)$ eloszlás, amelyre $\sum y_j r_{ij} = 0$

Vagy

2) \exists fogadási stratégia $x^T = (x_1, \dots, x_n)$, amelyre $\sum x_i r_{ij} > 0 \rightarrow$ ehhez van arbitrázs-lehetőség (x_i a tét az i-edikre, r_{ij} a megtérülés, ha egységnél többünk i-re és j-jön ki)


kochúzatás és nem kochúzatás befektetések, CAPM

CAPM: capital assets pricing model ~ tökepiaci árfolyamok modellje

A modell segítségével a befektetők számára kiszámíthatóvá válik a befektetések elvárt hozama. A módszer alapgondolata, hogy a befektetéshez felvállalt kochúzathoz mértén elérhető-e az a minimalis mértékű hozam, amelyet egy hasonló befektetésből is meghapnának.

A részvény elvárt hozama = kochúzatmentes hozam + $\beta \cdot$ részvénypiaci kochúzati prémium
 $\beta \sim$ részvény hozama és a részvénypiaci hozam közti összefüggést fejezi ki

ML: capital market line ~ tökepiaci egyenes: a kochúzat abszolút meghozolításében írja le a hozamok alakulását.




1 kochúzatos és 1 nem kochúzatos eszhöz esete

K.e.: r_p, σ_p, x N.k.e.: r_0, x (fix hamar, nincs szórás)

$$E(R) = x \cdot r_p + (1-x) r_0$$

$$D^2(R) = x^2 \sigma_p^2$$



$$E(U(R)) \rightarrow \max \left\{ x r_p + (1-x) r_0 - \frac{1}{2} b \cdot x^2 \sigma_p^2 \right\}$$

stabil eloszlások, stabilitás generálása, becslese, alkalmazása

$\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ független, azonos eloszlású valószínűségi változók.

ξ stabilis es-ú, ha $\forall n$ -re $\exists a_n > 0$ és $b_n \in \mathbb{R}$, úgy, hogy

$\frac{\sum \xi_i - b_n}{a_n}$ eloszlása meggyezik ξ eloszlásával

paraméterei: hely, shálá, szimmetria, karakterisztikus "iterő" (alakparaméter)

$$0 < \alpha < 2$$

$$\alpha = 2 \sim \text{norm}$$

$$\alpha = 1 \sim \text{cauchy}$$

Generálás:

Zolotarev:

$$\xi = \frac{\sin(\alpha \cdot \xi_1)}{(\cos \xi_1)^{\frac{1-\alpha}{\alpha}}} \left(\frac{\cos((1-\alpha) \cdot \xi)}{n} \right)^{\frac{1-\alpha}{\alpha}}$$

$$\alpha \neq 1$$

$$\xi_1 \sim U\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

$$\eta \sim \text{Exp}(\lambda=1)$$

Inverz fv-el nehéz ($F^{-1}(x)$ bonyolult)

Becslese: - Max likelihooed (nehéz a sűrűségfv. felírása)



- alakparamétre Fogyverneli - módszer

$$\beta_1(a) = D_a^2 \left(\frac{1}{\pi} \arctg \xi \right)$$

$$1 \leq a \leq 2$$

Cauchy norm

$$\beta_2(a) = D_a^2 \left(\Phi(\xi) - \frac{1}{2} \right)$$

Alkalmazás: hamatvállozás becslese törzsdén

tőkepiacra jellemző pl. BUX-ra alakparaméter


Brown mozgás

$\{w(t), t \in [0, \infty]\}$ folyamat Brown-mozgás, ha:

- 1) $w(0) = 0$
- 2) $w(t)$ folytonos
- 3) w független növekményű ($w(t_1), w(t_2) - w(t_1), \dots$ függetlenek)
- 4) $w(t+s) - w(s) \sim N(0, \sigma^2 t)$

Alkalmazás: pl. részecskeszimuláció

generalizás: véletlenszerű bolyangással



geometriai Brown, Black-Scholes-Merton

Geometriai Brown \rightarrow tőzsden az árak változásának modelllezésére

X Brown mozgás

M sodrású paraméter

σ^2 szórásnégyzet (diffúziós egyenlítés)

$$Y(t) = e^{X(t)} = Y(0) e^{X(t)-X(0)}$$

$$E(Y(t) | Y(0)=y) = y e^{t(M + \frac{1}{2}\sigma^2)}$$

$$D^2(Y(t) | Y(0)=y) = y^2 e^{2t(M + \frac{1}{2}\sigma^2)} \cdot (e^{t\sigma^2} - 1)$$



P1. tőhellekes piacán részvénny ár modelllezése

\hookrightarrow árak ≥ 0

oszcilláló növekedés

nincs arbitrázs

$\frac{Y(t_1)}{Y(t_0)}, \dots, \frac{Y(t_n)}{Y(t_{n+1})}$ független VR-h

részvénny értéke várhatóan $L = M + \frac{1}{2}\sigma^2$ -el növekszik időegységenként,
(a várható érték miatt!)

Merton:

s_0, s_t

$$\frac{dS_t}{S_t} = rdt + \sigma dW_t + dZ_t$$

W_t Brown mozgás

Z_t összetett Poisson-folyamat

Z_1, Z_2, \dots VR. sorozat

$\{Z(t), t \in [0, T]\}$ - Kolmogorov-féle kompatibilitási feltételek megfelel

futételek, kamat, logreturn, folytonos kamatozás. Lognormalis eloszlás

Felcérteki: az az összeg, amelyet most kell befektetnünk ahhoz (egy bizonyos kamatláb mellett), hogy később azzal meggyező pénzünk legyen. jele: PV (present value)

$$PV = \frac{C}{1+r_t} \rightarrow \text{kifizetés a jövőben}$$

→ kamatláb adott periódusra

$$\text{fix kamatláb esetén: } PV = \frac{C}{(1+r)^t}$$

ogreturn: a megtérülés logaritmusa

$$R = \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right) \rightarrow \begin{array}{l} \text{value final} \\ \text{value initial} \end{array}$$

folytonos kamatozás: egy befektetés jövőbeli értéke folytonos kamatozás esetén:

$$FV = PV \cdot e^{rt} \rightarrow \begin{array}{l} \text{eltelt idő} \\ \text{kamatláb} \end{array}$$

$$\text{változó kamtnál: } v(t) = V(0) \cdot e^{\int_0^t r(s) ds} \rightarrow \text{az s időpillanatban a kamatláb}$$

ognormalis eloszlás: folytonos valószínűségi eloszlás, a valószínűségi változó logaritmusa

normális eloszlású. Az x valószínűségi változó μ várható értékkel

és σ szórással:

$$X = e^{\mu + \sigma Z} \rightarrow \begin{array}{l} z \text{ standard normális} \\ \text{változó} \end{array}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{ha } x \leq 0 \\ \Phi\left(\frac{\ln x - \mu}{\sigma}\right) & \text{különben} \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{ha } x \leq 0 \\ \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{\sigma} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}} & \text{különben} \end{cases}$$

$$E(x) = e^{\mu + \frac{\sigma^2}{2}}$$

$$D^2(x) = e^{2\cdot(\mu + \frac{\sigma^2}{2})} \cdot (e^{\sigma^2} - 1)$$

Alkalmazás: töreden a részvények folytonosan változnak, értékük lognormalis eloszlást követ
-vezetéknélküli tárkörözés jelvezetése.

Generalizás: normális generalizáció (CHT-val, invz fv.-el), majd vesszők a logaritmusa!