



DANDERYDS SJUKHUS

Namn på dokument Generella läkemedelsordinationer hjärtakuten		Dnr DS Version 2
Enhet: VO Akutkliniken		Urspr. version 2013-02-04
Fastställt/Gäller från: 2014-02-03	Fastställt av: Anna Färg Hagansbo Verksamhetschef	
Översyn/revision: 2015-02-02	Ansvarig: Henrik Blåeldh-Löfmark sektionsansvarig läkare hjärtakuten	

Generella läkemedelsordinationer hjärtakuten

Enligt SOSFS 2001:17, 3kap 9§ får läkemedel utdelas av leg sjuksköterska enligt **generella skriftliga direktiv**. Detta måste ske med stor restriktivitet och läkare skall ta ställning till eventuellt fortsatt medicinering. Given dos skall registreras på läkemedelsunderlaget med signum av sjuksköterskan.

Gäller vuxna, ej gravida patienter med hänsyn tagen till: kontraindikationer, interaktioner och biverkningar enligt FASS.

Övergripande regler:

- Kontrollera överkänslighet. Generell samt specifikt angående aktuellt preparat
- Kontrollera alltid om patienten redan har fått analgetika, hur mycket, när och vad. Om patienten redan erhållit smärtlindring konsultera läkare innan generella läkemedel ges.
- VAS – skattning ska göras före och efter administration av analgetika för att utvärdera effekten

Vid tveksamhet – fråga alltid ansvarig läkare

ANALGETIKA

Läkemedel	Indikation	Styrka	Läkemedelsform	Dosering	Adm.sätt	Kontraind.	Anmärkning
Alvedon	smärta/feber	500mg	tablett	1-2 st	p.o	leverskador	Maxdos: 4000 mg/dygn
Alvedon	smärta/feber	500mg	brustablett	1 st	p.o	leverskador	Maxdos: 4000 mg/dygn
Alvedon	smärta/feber	1g	suppositorier	1-2 st	per rectum	leverskador	Maxdos: 4000 mg/dygn
Citodon	smärta	500mg/30mg	tablett	1-2 st	p.o	leverskador, gallväggsspasm	Maxdos: 8 st/dygn

ANTIEMETIKA

Läkemedel	Indikation	Styrka	Läkemedelsform	Dosering	Adm.sätt	Kontraind.	Anmärkning
Primperan	illamående	5 mg/ml	injektion	1-2 ml	i.v	Försiktighet vid nedsatt njurfunktion, hypertoni	Maxdos: 6 ml/dygn

KÄRLKRAMP

Läkemedel	Indikation	Styrka	Läkemedelsform	Dosering	Adm.sätt	Kontraind.	Anmärkning
Glytrin	kärlkramp	0,4 mg/dos	sublingualspary	1-2 doser	sublingualt	Konstriktiv pericardit, pericardiell tamponad, systoliskt bltr under 100 mmHg	Maxdos: 2 doser

VÄTSKEDRIVANDE

Läkemedel	Indikation	Styrka	Läkemedelsform	Dosering	Adm.sätt	Kontraind.	Anmärkning
Furix	vätskedrivande	10 mg/ml	injektion	1-2 ml	i.v	grav njur- eller hjärtsvikt	Maxdos: 2 ml Dehydrering måste uteslutas innan Furix ges. Kontrollera BT + urinmängd före och efter given dos.

ANDNING

Läkemedel	Indikation	Styrka	Läkemedelsform	Dosering	Adm.sätt	Kontraind.	Anmärkning
Syrgas	låg SaO ₂ , bröstsmärta	100 %	gas	se riktlinje	inhalation	Patienter med avancerad KOL, nedsatt andningsförmåga på grund av grav fetma, neuro-logisk sjukdom eller förgiftning kan ha koldioxidretention	Låg SaO₂-se riktlinje ”Syrgasbehandling - generell ordination sjuksköterskor” Bröstsmärta - se riktlinje ”DETOX-studie”