



DANDERYDS SJUKHUS

Namn på dokument Läkemedel larm/akutrummen		Dnr DS Version 5
Enhet: VO Akutkliniken		Urspr. version 2013-02-20
Fastställt/Gäller från: 2014-09-08	Fastställt av: Richard Fletcher	
Översyn/revision: 2015-09-07	Ansvarig: Richard Fletcher, Ulrika Norrbom	

Läkemedel:	Vad och när:	Administrering:
Aciclovir 25 mg/ml	behandling vid viral meningit	LÅNGSAM infusion (se separat spädningsschema)
Adenosin 5mg/ml	behandling och diagnostik vid arytm	SNABB i.v (1-2 sek), följs av NaCl-flush 5 ml (se separat riktlinje)
Adrenalin 0,1mg/ml eller 1mg/ml (kylskåp)	sympatikusstimulerare vid astma, hjärtstillestånd, anafylaxi	10 ml 0,1 mg/ml i.v vid hjärtstillestånd, 1 mg/ml s.c.
Brilique 90 mg	trombocyttaggregationshämmande medel vid AMI	tabletter
Akineton 5mg/ml	medel vid parkinsonism	LÅNGSAMT i.v, i.m
Atropin 0,5 mg/ml	antikolinergika vid bradykardi	i.v
Atrovent 0,25 mg/ml	bronkdilaterande vid astma, KOL	inhalation sidestream
Bensylpenicillin 3g	penicillin vid meningit, endokardit	se separat spädningsschema
Betapred 4 mg/ml eller 0,5 mg/tab	glukokortikoid vid anafylaxi, hjärnödem	LÅNGSAMT (2 ml/min) i.v, tabletter löses i vatten
Bricanyl 0,5 mg/ml	bronkdilaterande vid astma, KOL	LÅNGSAMT (1 ml/5min) i.v, s.c
Calcium Sandoz 9mg/ml	kalciumsalter vid tetanus, spasmofili	LÅNGSAMT (10 ml/5 min) i.v, djup i.m
Cefotaxim/Claforan 1g	antibakteriell cefalosporin vid allvarlig infektion	se separat spädningsschema
Cefuroxim/Zinacef 1,5g	antibiotika vid pneumoni	se separat spädningsschema
Cordarone 50 mg/ml	retbarhetsnedsättande vid arytm	LÅNGSAMT (3 min) i.v. 300 mg (6 ml) i 14 ml 5% glukos. Flusha med glukos efter
Cyklokapron 100 mg/ml	fibrinolyshämmare vid blödning	LÅNGSAMT (1 ml/min) i.v
Cloxacillin/Ekvacillin 1g	penicillin vid stafylokockinfektion	se separat spädningsschema
Diazepam 5 mg eller 10 mg (kylskåp)	muskelavslappnande, lugnande, kramplösande vid epilepsi	rektal lösning
diTeBooster 0,5 mg/dos	vaccin mot difteri och stelkramp	i.m
Digoxin 0,25 mg/ml	hjärtglykosid vid hjärtinsuff, flimmer	LÅNGSAMT (0,1 mg/min)
Doktacillin	behandling vid bakteriell meningit	se separat spädningsschema
Ergenyl (Valproat) 400 mg	behandling vid status epilepticus	se administreringsschema
Flumazenil/Lanexat 0,1 mg/ml	andidot bensodiazepin	i.v 0,2 mg under 15 sekunder Kan upprepas var 60:e sek
Furix 10 mg/ml	snabbverkande diuretika vid ödem	i.v, i.m
Gensumycin 40 mg/ml	antibakteriell aminoglykosid vid allvarlig infektion	se separat spädningsschema
Glukagon 1 mg	Medel vid allvarlig hypoglykemi	i.m pulver blandas med 1-2 ml NaCl
Glukos 300 mg/ml 30 %	hyperton glukoslösning vid hypoglykemi	i.v, flusha efter med NaCl
Glytrin 0,4 mg/dos	snabbverkande kärlvidgande medel vid angina	spray sublinguallt
Keppra 100 mg/ml	status epilepticus	koncentrat späds med 100 ml Ringeracetat alt NaCl 0,9%. Ges i.v under 15 min (bolus 2000-4000 mg)
Ketogan 5 mg/ml	analgetika vid smärttillstånd	i.v, i.m, s.c
Magnecyl 500 mg	analgetika, antiflogistikum	brustablett i vatten

Morfin 10 mg/ml	analgetika vid smärttillstånd	i.v, i.m, s.c
Naloxon 0,4 mg/ml	antidot vid opiatöverdosering	0,4 mg i.v. Kan upprepas med 2 min intervall
Nexium 40 mg	syrahämmande medel vid ventrikelsår	LÅNGSAMT (40 mg/3 min) i.v
Novorapid 100E/ml	insulin, används vid hyperglykemi	s.c. alt i.v. enl. läk ordination
Octostim 15 µg/ml	faktor 8-frisättare: förkortning eller normalisering vid förlängd blödningstid	0,3 µg/kg utspädd i NaCl till 10 ml som i.v injektion under 10 minuter
Ondansetron 2 mg/ml	antiemetika, mot illamående	i.v. i maxdos 8 mg under 30 sek
Perfalgan 10mg/ml	analgetika vid smärttillstånd	i.v infusion (100 ml) under 15 min
Plavix 300 mg	trombocytageragationshämmande medel vid AMI	tabletter
Primperan 5 mg/ml	antiemetika vid illamående och kräkning	LÅNGSAMT i.v under minst 3 min
Promiten 150 mg/ml	profylax mot anafylaxi dextran	LÅNGSAMT 20 ml i.v 1–2 minuter före infusion av dextranlösningar
Seloken 1 mg/ml	beta-receptorblockerare vid flimmer	LÅNGSAMT i.v (1-2 mg/min). Kan upprepas med 5 min intervall
SoluCortef 100 mg/2 ml	hydrocortison vid chock, anafylaxi, allergi, astma	i.v, i.m
SoluMedrol 1g	glukokortikoid vid chock, anafylaxi, allergi, astma	LÅNGSAMT i.v (minimum 10 min), i.m
Stesolid 5 mg/ml	muskelavslappnande, lugnande, kramplösande vid epilepsi	i.v
Tavegyl 1 mg/ml	antihistamin vid allergi	LÅNGSAMT i.v (2 ml/3 min) – kan spädas med NaCl 1:5, i.m
Teofyllamin 23 mg/ml	bronkdilaterande vid astma, lungödem	LÅNGSAMT (20-30 min) i.v
Toradol 30 mg/ml	NSAID vid smärttillstånd	i.m alt. i.v (10-30 mg)
Trandate 5mg/ml	Blodtryckssänkande betablockare, används vid hypertensiva kriser	50mg ges under 3-5 minuter i.v.
Ventoline 5 mg/ml	bronkdilaterande vid astma, KOL	inhalation sidestream
Xylocard 20 mg/ml	retbarhetsnedsättande vid arytm	Individuell dosering efter läkarordination

Infusioner

Macrodex 60 mg/ml	kolloidosmotisk dextranlösning vid volymersättning	i.v OBS! 1–2 minuter (högst 15 minuter) före infusion av den första enheten ges en injektion PROMITEN, 20 ml (se ovan)
Mannitol 150 mg/ml	osmotisk diuretika vid ökat intrakraniellt tryck, akut njursvikt	i.v Akut - maximal infusionshastighet 200 mg/kg infunderat under 5 minuter
Natriumbikarbonat 50 mg/ml	hyperton elektrolytlösning vid acidosis	i.v
Tribonat 100 ml	hyperton elektrolytlösning vid acidosis	i.v

Nedanstående läkemedel administreras på akuten av personal anställda vid narkosen alternativt på ordination av narkosläkare närvarande på akutrummet:

Atracurium 10 mg/ml	muskelavslappnande
Celokurin 50mg/ml	muskelavslappnande
Efedrin 50 mg/ml	blodtryckshöjande, bronkdilaterande vid astma
Fentanyl 50 mg/ml	analgetika vid smärttillstånd
Ketalar 10 mg/ml	snabbverkande anestetikum
Propofol 10 mg/ml	anestesimedel
Rapifen	analgetika vid smärttillstånd