



DANDERYDS SJUKHUS

Namn på dokument: <b>Wells score för DVT</b>			
Enhet: <b>Akutkliniken</b>		Urspr. Version (datum) 2012-11-09	
Fastställt/Gäller från:	2012-12-03	Fastställt av: Anna Färg Hagansbo	
Översyn/revision:	2015-12-03	Ansvarig: Magnus Bager	

### A. Exklusionskriterier för användning av D-dimer vid misstanke om DVT i nedre extremitet

- Graviditet ☐
- Pågående antikoagulantibehandling ☐
- Inneliggande patienter ☐
- Patienter < 18 år ☐
- Patienter > 75 år ☐
- Symptom mer än en vecka ☐
- Åter inom en vecka p.g.a. misstänkt DVT ☐

**Om något av ovanstående kriterier markerats – ta ej D-dimer utan skriv remiss till ultraljud!**

### B. Poängbaserat diagnosstöd för sannolikhetsbedömning vid DVT (utföres om inget markerats under A)

- Malignitet** (under behandling senaste 6 mån eller palliation) ☐ **1**
- Paralys/pares/gipsbehandling av benen** ☐ **1**
- Immobilisering >3 dagar eller kirurgi inom 4 veckor**  
(som krävt narkos/regional anestesi) ☐ **1**
- Ömhet/smärta längs djupa vener** ☐ **1**
- Helbenssvullnad** ☐ **1**
- Vadsvullnad >3cm jfr med andra benet** ☐ **1**
- Pitting ödem i det symptomatiska benet** ☐ **1**
- Ytliga kollateralvener (ej varicer)** ☐ **1**
- Alternativ diagnos minst lika sannolik** ☐ **-2**

**Låg klinisk sannolikhet ≤1**  
**Hög klinisk sannolikhet ≥2**

### C. Beroende på poäng:

