



DANDERYDS SJUKHUS

Namn på dokument <b>Generella läkemedelsordinationer kirurg/urologakuten</b>		Dnr DS Version 2
Enhet: <b>VO Akutkliniken</b>		Urspr. version 2013-02-04
Fastställt/Gäller från: <b>2014-01-29</b>	Fastställt av: <b>Anna Färg Hagansbo Verksamhetschef</b>	
Översyn/revision: <b>2015-01-28</b>	Ansvarig: <b>Mahmood Mahmood sektionsansvarig läkare kirurg/urologakuten</b>	

## Generella läkemedelsordinationer kirurg/urologakuten

Enligt SOSFS 2001:17, 3kap 9§ får läkemedel utdelas av leg sjuksköterska enligt **generella skriftliga direktiv**. Detta måste ske med stor restriktivitet och läkare skall ta ställning till eventuellt fortsatt medicinering. Given dos skall registreras på läkemedelsunderlaget med signum av sjuksköterskan.

**Gäller vuxna, ej gravida patienter med hänsyn tagen till: kontraindikationer, interaktioner och biverkningar enligt FASS.**

**Behandling av smärta vid akut buksmärt:**

### Övergripande regler:

- Kontrollera överkänslighet. Generell samt specifikt angående aktuellt preparat
  - Kontrollera alltid om patienten redan har fått analgetika, hur mycket, när och vad. Om patienten redan fått smärtlindring konsultera läkare innan generella läkemedel ges.
  - VAS – skattning ska göras före och efter administration av analgetika för att utvärdera effekten
  - Morfinpreparat ska i första hand ges intravenöst, användas med stor försiktighet till patient >70 år. Skall ej ges till medvetandesänkta patienter samt till patient som misstänks vara påverkad av alkohol och/eller droger eller har drabbats av en skallskada.
  - Intravenös injektion av opioidpreparat ska ges långsamt och effekten kontrolleras noggrant
- Vid tveksamhet – fråga alltid ansvarig läkare

**ANALGETIKA**

Läkemedel	Indikation	Styrka	Läkemedelsform	Dosering	Adm.sätt	Kontraind.	Anmärkning
Alvedon	lätt-måttlig smärta, feber	500mg	tablett	1-2 st	p.o	leverskador	<b>Maxdos:</b> 8 st/dygn OBS! ej till fastande patienter
Alvedon	lätt-måttlig smärta, feber	1g	suppositorier	1 st	per rectum	leverskador	<b>Maxdos:</b> 4 st/dygn
Citodon	medelsvår smärta	500mg/30mg	tablett	1-2 st	p.o	leverskador, gallväggsspasm	<b>Maxdos:</b> 2 st/dygn OBS! ej till fastande patienter
Morfin	svår smärta	1 mg/ml	injektion	1-5 ml	i.v	andningsdepression, medvetandesänkta	<b>Maxdos:</b> 5 mg Späds med NaCl till styrkan 1mg/ml. Ges långsamt. Andningsdeprimerande
Toradol	flanksmärta	30 mg/ml	injektion	1 ml	i.m, i.v	astma, Waran-beh, njur- eller hjärtsvikt	<b>Maxdos:</b> 2 ml/dygn OBS! endast ges till pat av oss kända njurstenar med blod i urinen
Ranitidin	refluxbesvär	150 mg	brustablett	1 st	p.o	allergi	<b>Maxdos:</b> 1 st Ges i kombination med Xylocain Viskös
Xylocain Viskös	refluxbesvär	20 mg/ml	oral lösning	10-15 ml	p.o	allergi	<b>Max:</b> 15 ml Ges i kombination med Ranitidin

**ANTIEMETIKA**

Läkemedel	Indikation	Styrka	Läkemedelsform	Dosering	Adm.sätt	Kontraind.	Anmärkning
Primperan	illamående	5 mg/ml	injektion	1-2 ml	i.v	Leverskador, ileus, GI-blödning	<b>Maxdos:</b> 10 mg/dygn

**INFUSION**

Läkemedel	Indikation	Styrka	Läkemedelsform	Dosering	Adm.sätt	Kontraind.	Anmärkning
Glukos buffrad	fastande patient	50 mg/ml	infusion	1000 ml/ 2-12 h	i.v	grav njur- eller hjärtsvikt	<b>Maxdos:</b> 1000ml/dygn Läkarkonsult vid diabetes
Ringeracetat	dehydrering	-	infusion	1000 ml	i.v	försiktighet vid njur- eller hjärtsvikt	<b>Maxdos:</b> 1000 ml

**ANDNING**

Läkemedel	Indikation	Styrka	Läkemedelsform	Dosering	Adm.sätt	Kontraind.	Anmärkning
Syrgas	Låg SaO2	100 %	gas	se riktlinje	inhalation	Patienter med avancerad KOL, nedsatt andningsförmåga på grund av grav fetma, neurologisk sjukdom eller förgiftning kan ha koldioxidretention	se riktlinje ”Syrgasbehandling - generell ordination sjuksköterskor”

**OBS! Vid överdosering eller läkemedelsbiverkan kontakta omedelbart läkare**