

## Influensavaccinering av personer som har svår allergi mot ägg eller andra ämnen

Det influensavaccin som är upphandlat och används i Stockholms läns landsting (Fluarix®) är odlat på hönsägg och det färdiga vaccinet innehåller små mängder av "ägg-protein".

Personer med lindrig äggallergi – som kan äta mat med ägg i, som sockerkaka eller pannkakor, utan att reagera allergiskt - kan i regel vaccineras med Fluarix, om de kan observeras 30 min efter vaccinationen med beredskap för att kunna behandla en allergisk reaktion.

För personer med mer uttalad äggallergi hade SLL upphandlat **Inflexal V®** (Crucell), där halten av äggprotein är så lågt att de flesta äggallergiker, med undantag av de som reagerat med anafylaxi, kan ges vaccinet under sedvanlig övervakning. Tyvärr har det visat sig att företaget inte kan leverera vaccinet till denna säsong p g a en inte närmare specificerad "kvalitetsbrist" i några av tillverkningssatserna utanför Sverige. Det finns tyvärr inget annat influensavaccin på marknaden som kan ges till personer med uttalad äggallergi.

Personer som har uttalad äggallergi och som tillhör en riskgrupp för att få svår influensa bör därför få möjlighet att diskutera med en allergolog - eller när det gäller barn en allergikunnig barnläkare som vid behov kan remittera vidare till Specialistmottagningen för barnvacciner på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset - om det ändå kan gå att vaccinera under speciell uppsikt.

Personer som tillhör de grupper som riskerar att få en svår eller komplicerad influensa och som inte kan vaccineras p g a äggallergi bör få information om att de ska kontakta sin läkare vid misstanke på att de drabbats av influensa för ställningstagande till behandling med antiviral terapi.