



DANDERYDS SJUKHUS

Namn på dokument Generella läkemedelsordinationer medicinakuten		Dnr DS Version 2
Enhet: VO Akutkliniken		Urspr. version 2013-02-04
Fastställt/Gäller från: 2014-02-03	Fastställt av: Anna Färg Hagansbo Verksamhetschef	
Översyn/revision: 2015-02-02	Ansvarig: Magnus Bager sektionsansvarig läkare medicinakuten	

Generella läkemedelsordinationer medicinakuten

Enligt SOSFS 2001:17, 3kap 9§ får läkemedel utdelas av leg sjuksköterska enligt **generella skriftliga direktiv**. Detta måste ske med stor restriktivitet och läkare skall ta ställning till eventuellt fortsatt medicinering. Given dos skall registreras på läkemedelsunderlaget med signum av sjuksköterskan.

Gäller vuxna, ej gravida patienter med hänsyn tagen till: kontraindikationer, interaktioner och biverkningar enligt FASS.

Övergripande regler:

- Kontrollera överkänslighet. Generell samt specifikt angående aktuellt preparat
- Kontrollera alltid om patienten redan har fått analgetika, hur mycket, när och vad. Om patienten redan erhållit smärtlindring konsultera läkare innan generella läkemedel ges.
- VAS – skattning ska göras före och efter administration av analgetika för att utvärdera effekten

Vid tveksamhet – fråga alltid ansvarig läkare

ANALGETIKA

Läkemedel	Indikation	Styrka	Läkemedelsform	Dosering	Adm.sätt	Kontraind.	Anmärkning
Alvedon	smärta/feber	500mg	tablett	1-2 st	p.o	leverskador	Maxdos: 4000 mg/dygn
Alvedon	smärta/feber	500mg	brustablett	1-2 st	p.o	leverskador	Maxdos: 4000 mg/dygn
Alvedon	smärta/feber	1g	suppositorier	1-2 st	per rectum	leverskador	Maxdos: 4000 mg/dygn

VÄTSKEDRIVANDE

Läkemedel	Indikation	Styrka	Läkemedelsform	Dosering	Adm.sätt	Kontraind.	Anmärkning
Furix	vätskedrivande	10 mg/ml	injektion	1-2 ml	i.v	grav njur- eller hjärtsvikt	Maxdos: 40 mg Dehydrering måste uteslutas innan Furix ges. Kontrollera BT + urinmängd före och efter given dos. Dosen får högst upprepas 1 gång, enligt generella direktiv

ANTIEMETIKA

Läkemedel	Indikation	Styrka	Läkemedelsform	Dosering	Adm.sätt	Kontraind.	Anmärkning
Primperan	illamående	20 mg	suppositorier	1 st	per rectum	Försiktighet vid nedsatt njurfunktion, hypertoni	Maxdos: 1-3/dygn

KÄRLKRAMP

Läkemedel	Indikation	Styrka	Läkemedelsform	Dosering	Adm.sätt	Kontraind.	Anmärkning
Glytrin	kärlkramp	0,4 mg/dos	sublingualspary	1-2 doser	sublingualt	Konstriktiv pericardit, pericardiell tamponad, systoliskt bltr under 100 mmHg	Maxdos: 2 doser

INFUSIONER

Läkemedel	Indikation	Styrka	Läkemedelsform	Dosering	Adm.sätt	Kontraind.	Anmärkning
Natriumklorid	natriumbrist, kräkning eller annan vätskeförlust	9 mg/ml	infusion	500-1000 ml	i.v	försiktighet vid uttalad hjärtsvikt	Maxdos: 3000ml/dygn
Ringeracetat	hypovolemi	-	infusion	1000 ml	i.v	försiktighet vid uttalad hjärtsvikt	Maxdos: 3000 ml/dygn

ANDNING

Läkemedel	Indikation	Styrka	Läkemedelsform	Dosering	Adm.sätt	Kontraind.	Anmärkning
Atrovent	KOL, astma	0,25 mg/ml	lösning för nebulisator	2 ml	inhalation	Kontraindikationer: Överkänslighet mot Atropin eller Atropinliknande substanser	Maxdos: 2 ml Kan upprepas max 4ggr/dygn. Vid andningsbesvär hos pat med känd KOL se riktlinje "KOL generell ordination till ansvarig sjuksköterska"
Ventoline	KOL, astma	5 mg/ml	lösning för nebulisator	0,5 ml	inhalation	Överkänslighet mot Ventoline eller hjälpämne	Maxdos: 0,5ml Kan upprepas 4ggr/dygn. Vid andningsbesvär hos pat med känd KOL se riktlinje "KOL generell ordination till ansvarig sjuksköterska"
Syrgas	låg SaO2	100 %	gas	se riktlinje	inhalation	Patienter med avancerad KOL, nedsatt andningsförmåga på grund av grav fetma, neurologisk sjukdom eller förgiftning kan ha koldioxidretention	se riktlinje "Syrgasbehandling - generell ordination sjuksköterskor"

HOSTA

Läkemedel	Indikation	Styrka	Läkemedelsform	Dosering	Adm.sätt	Kontraind.	Anmärkning
Acetylcystein	slemlösande	200 mg	brustablett	1 st	p.o	överkänslighet mot läkemedlet eller hjälpämne	Maxdos: 3 ggr/dygn

HYPOGLUKEMI

Läkemedel	Indikation	Styrka	Läkemedelsform	Dosering	Adm.sätt	Kontraind.	Anmärkning
Glukos	hypoglykemiska symtom och blodsocker <3mmol/l	300 mg/ml	injektion	30-50 ml	i.v		Maxdos: Kan upprepas 1-2 ggr (sammanlagt 3 ggr) tills patienten är vaken och klar

HYPERGLUKEMI

Läkemedel	Indikation	Styrka	Läkemedelsform	Dosering	Adm.sätt	Kontraind.	Anmärkning
Novorapid	hyperglykemi med reflo > 25	100 E/ml	injektion	4E	s.c		Se riktlinje "Hyperglykemi"

OBS! Vid överdosering eller läkemedelsbiverkan kontakta omedelbart läkare